

FICHE DE SURVEILLANCE TRANSFUSIONNELLE

UNE FICHE PAR DÉLIVRANCE DE PRODUITS SANGUINS LABILES (P.S.L.)

ETIQUETTE PATIENT

Hôpital: Nord 🗆 C	onception Timone Ad.	Timone Enf. Sud	Réception P.S.L. (da	ate et heure) :
Unité de soins :		. UF:		à h.
Type de P.S.L. Concentrés de globules rouges ou plasma ou plaquettes.	0	2	8	
Étiquette P.S.L.				
Personne qui réalise l'acte Nom et Fonction				
	VERIFIER dès récep	otion de la commande		
 Aspect, intégrité et pérent Concordance entre Fiche Si non conformité de la concordance 		P.S.L. et identité du receveur) e les consignes de l'EFS		
	, prénom, date de naissance)			
Le contrôle de compatibil	ité uniquement pour les C.G.F	L:		
•	ate de péremption de la carte le tr		•	
	patibles entre receveur et don compatibles ou vous avez un dout Dans ce dernier cas, appel	e 🕏 JE N	JE TRANSFUSE E TRANSFUSE PAS	
	Nom du Médecin appelé :			
	Heure d'appel:			
Décisions prises :				



FICHE DE SURVEILLANCE TRANSFUSIONNELLE

UNE FICHE PAR DÉLIVRANCE DE PRODUITS SANGUINS LABILES (P.S.L.)

ETIQUETTE PATIENT	
~	

REALISER la transfusion & SURVEILLER le receveur pour tout type de PSL

Il est fortement déconseillé de perfuser un autre produit en même temps (Transfusion en Y à proscrire) En cas d'impossibilité de VVP, autres voies d'abord possible portacath, picc line, VVC (attention au débit trop rapide) La personne qui réalise l'acte doit rester les 15 premières minutes auprès du receveur

Type de P.S.L. 0	Heure	Pouls	T.A.	T°	autres (facultatif)	Observations
Début de la transfusion	Н					
à 15 mn	Н					
à m n	Н					
Fin de la transfusion	Н					
Type de P.S.L. ②	Heure	Pouls	T.A.	T°	autres (facultatif)	Observations
Début de la transfusion	Н					
à 15 mn	Н					
à m n	Н					
Fin de la transfusion	Н					
Type de P.S.L. 6	Heure	Pouls	T.A.	T°	autres (facultatif)	Observations
Début de la transfusion	Н					
à 15 mn	Н					
à m n	Н					
Fin de la transfusion	н					
	GERE	ER un Effet	: Indésirab	le REC	EVEUR (E.	J.R.)
						PSL
P.S.L. NON TRANSFUS						1 2 3
•						
i Effet Indésirable au co	ours ou au d	écours de la	transfusio	n:		PSL
Arrêt de la transfusion (Garder la voie veineuse)						🗖 🗂 🗂
	`	,				🗆 🗆 🗆
Prévenir l'E.F.S. de site	et faire redesc	cendre la pocl	he à l'E.F.S			
•	_					

N.B.: Cette fiche doit être conservée dans le dossier de soins du patient.