


Glad spierweefsel



1

---

---


---

---

---

---

---



2

---

---


---

---

---

---

---



3

---

---

---


---

---

---

---

## Glad spierweefsel



4

---

---


---

---

---

---

---



5

---

---


---

---

---

---

---



6

---

---

---


---

---

---

---

## Glad spierweefsel



7

---

---


---

---

---

---

---



8

---

---


---

---

---

---

---



9

---

---

---


---

---

---

---

## Glad spierweefsel



10

---

---

---

---

---

---

---

---



11

---

---

---


---

---

---

---

---



12

---

---

---


---

---

---

---

---



13

---

---

---


---

---

---

---

---



14

---

---

---


---

---

---

---

---



15

---

---

---

---

---


---

---

---



# Glad spierweefsel

Gladde spiercel



Sarcoplasmatisch reticulum minder ontwikkeld dan bij dwarsgestreepte spier

Rondom de kern: mitochondriën, ribosomen, RER, Golgi-apparaat, geen myoglobine



University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology  
and Histology

16

---

---

---

---

---


---

---

---

Gladde spiercel

Organisatie actine en myosine






Inactive myosins II have their tail regions folded back and closely apposed near the myosin head. Active myosins II have their tails stretched.

Myosine komt voor in inactieve vorm (geplooid staartdeel)

↓

Actief myosine II gaat naast actinefilamenten liggen





University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology  
and Histology

17

---

---

---

---

---


---

---

---

Gladde spiercel



Intracellulaire calciumstijging



Intracellulaire calciumstijging kan op verschillende manieren

Eén manier is vergelijkbaar met dwarsgestreepte spieren:

- Caveolae (rudimentair T-systeem)
- Maar ook influx van extracellulair  $Ca^{2+}$  (pinocytose van vloeistof met hoge  $Ca^{2+}$ -concentratie)



University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology  
and Histology

18

---

---

---

---

---

---

---

---

Glad spierweefsel

**Gladde spiercel**  
**Contractie**

Binding of calmodulin and  $\text{Ca}^{2+}$  to the regulatory domain of MLCK activates the kinase

Myosin light-chain kinase (inactive)

Regulatory domain

Calmodulin

$\text{Ca}^{2+}$

1

Catalytic domain

2

Active myosin light-chain kinase-calmodulin- $\text{Ca}^{2+}$  complex

ATP

ADP

F-actin

Active myosin

Controle door fosforylatie myosine II

'sliding filament theorie' van actine- en myosinefilamenten

Afhankelijk van cytoplasmatische  $\text{Ca}^{2+}$  concentratie (Ca eerder extracellulair gerecruteerd)

Gladde spieren hebben **geen troponine**, maar **wel tropomyosine** dat actinefilamenten stabiliseert

University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology and Histology

19

---

---

---

---

---

---

---

---

**Gladde spiercel**  
**Contractie**

Dense Body

Attachment to cell Wall

Uncontracted State

Contracted State

Actin-myosin filaments

Myosinefilamenten met over hun hele lengte myosinekoppen -> krachten even groot als in skeletspier

Sliding filament contractie door aanhechting aan dense bodies

University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology and Histology

20

---

---

---

---

---

---

---

---

University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology and Histology

21

---

---

---

---

---

---

---

---

# Glad spierweefsel

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

## Gladde spiercel

### Contractie

Positie dense bodies, myofilamenten en intermediaire filamenten (desmine/vimentine) zorgt voor verwringing gladde spiercel bij contractie

Contractie is trager dan skeletspiercel maar kan langer aanhouden (cfr tonus)

University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology and Histology

22

---

---

---

---

---

---

---

---

## Gladde spiercel

### Controle van de contractie

Autonoom zenuwstelsel:

verschillende transmitters: eindresultaat afhankelijk van transmitter en aanwezigheid receptor

Chemische stoffen:

Beïnvloeding instroom van extracellulair  $Ca^{2+}$

Lokale (chemische) factoren vb histamine, hypoxie

Hormonen (vb oxytocine,...)

Door rekking:

vb tonische contractie door gladde spiercellen van de luchtwegen;

vb oprekking gladde spieren van de blaas

University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology and Histology

23

---

---

---

---

---

---

---

---

## Glad spierweefsel

### Single unit gladde spieren

Werken als één geheel: gap junctions en desmosomen; minder sterk bezuuwend dan 'multi-unit' gladde spieren

Georganiseerd in tunicae

University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology and Histology

24

---

---

---

---

---


---

---

---



## Glad spierweefsel



25

---

---


---

---

---

---

---



26

---

---

---

---

---

---

---

**Histogenese, groei & regeneratie van gladde spier**

Histogenese, groei:

- mechanismen minder gekend
- hypertrofie (cfr uteruswand tijdens dracht)
- postnataal zou differentiatie van mesenchymale cellen naar gladde spiercellen nog kunnen voorkomen

Regeneratie:

- regeneratie door mitose mogelijk, meestal echter veel bw-vorming
- dus nooit volledig herstel van oorspronkelijke toestand

University of Antwerp  
Laboratory of Cell Biology and Histology

27

---

---

---

---

---

---

---