

Profil territorial des émissions de CO2 en France

Analyse descriptive des données

Tijou Louane & Gottschalk Eliott

2026-02-12

Table des matières

Introduction	2
1. Analyse univarié	2
Données manquantes	2
Agrégation par département	3
Analyse univarié des variables quantitatives	4
Variables qualitative	6
2. Analyse bivariée	6
Variables quantitative - quantitative	6
Variables qualitative - qualitative	7
Variables qualitative - quantitative	7
3. Analyse factorielle	7
Justification de l'ACP	7
Indice KMO	7
Test de Bartlett	8
ACP avec agriculture	8
Choix du nombre de dimension	9
Pourcentage d'inertie expliquée et règle de Kaiser	9
Éboulis des valeurs propres	9
solution 1	15
Annexe	18

Introduction

Cette étude porte sur les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) des départements français par secteur d'activité. Les données proviennent du CITEPA¹, et ont été récupérées sur la plateforme officielle *data.gouv.fr* ([source](#))

La base recense exactement 12 variables donc 2 qualitatives indiquant le nom de la commune mais aussi son code Insee. Elle contient aussi 10 variables quantitatives sur lesquels l'analyse en composante principale se réalisera, ces variables correspondent aux émissions totales des émissions de CO₂ par secteurs pour chaque communes française pour l'année 2016, comme l'agriculture, l'industrie, le secteur routier, tertiaire, résidentiels etc

Au fil des années, les activités humaines ont entraîné une augmentation continue des émissions de CO₂, renforçant l'effet de serre et contribuant au réchauffement climatique. Il est donc essentiel de comprendre quels secteurs sont les plus émetteurs afin de mettre en place des politiques efficaces pour réduire ces émissions. Il est également important d'identifier les départements ou régions où la vigilance doit être renforcée, afin que les efforts de réduction soient équitablement répartis sur l'ensemble du territoire.

Notre objectif est de comprendre comment les émissions de CO₂ se répartissent entre les départements français selon les secteurs d'activité et s'il est possible d'identifier des profils départementaux d'émissions.

Pour ce faire, nous procéderons d'abord à une analyse univariée de chacune des variables, puis à une analyse bivariée afin d'étudier les relations entre elles. Ensuite, nous réaliserons une analyse factorielle, et plus particulièrement une analyse en composantes principales (ACP), avant de conclure sur les principaux résultats mis en évidence.

1. Analyse univariée


Avant toute analyse statistique, il est important de bien prendre connaissance du jeu de données afin de comprendre la distribution des variables et de détecter d'éventuelles anomalies, telles que les valeurs manquantes ou des valeurs aberrantes. Nous procéderons donc à une première exploration des données grâce à une analyse univariée de chacune de nos variables.

Données manquantes

Pour cette première visualisation d'ensemble nous avons regardé les données manquantes de notre jeu de donnée et nous nous apercevons que les variables *Autres_transports* et *Autres_transports_international* contiennent plus de 25 000 valeurs manquantes sur 35 798 lignes, ce qui représente environ 70 % des données. Étant donné cette proportion très élevée de

¹Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique

données manquantes, nous avons pris la décision de supprimer ces deux colonnes pour éviter de fausser l'analyse.



Après avoir supprimé les colonnes avec trop de NA, il reste quelques valeurs manquantes sur certains secteurs. Ces NA sont peu nombreux par rapport à l'échantillon total de communes. Comme nous agrégeons ensuite les communes par département (en faisant la moyenne des émissions par secteur), ces quelques valeurs manquantes n'ont pas d'impact significatif : la moyenne par département sera calculée sur les communes disponibles.

Agrégation par département

Pour simplifier l'analyse et faciliter la synthèse des données, nous créons une nouvelle variable **département**, correspondant aux deux premiers chiffres du code INSEE de chaque commune.

Cette nouvelle variable nous permet de regrouper les communes par département, et ainsi de travailler sur une analyse plus globale, plus facile à manipuler et à interpréter. Nous allons alors passer à une interprétation des profils moyens de communes au sein des départements, et non comme des niveaux totaux d'émissions départementales.

Concernant la vue des données manquantes, il ne reste plus qu'une valeur manquante pour le secteur de l'agriculture, correspondant à Paris. Après vérification, cette valeur est affiliée à 0, car elle reflète uniquement les arrondissements de Paris où aucune activité agricole n'est réalisée.

Table 1: Analyse univariée des variables quantitatives par département

Variable	Moyenne	Médiane	Minimum	Maximum	Ecart_type
Agriculture	2595.67	1964.64	0.00	7870.15	1942.17
CO2_biomasse	3079.77	1503.92	402.86	59328.87	6910.40
Déchets	645.55	281.34	60.65	7347.16	1157.42
Energie	1033.40	184.88	34.97	39455.04	4227.94
Industrie	3260.79	1329.74	99.33	86844.71	9353.33
Résidentiel	3803.31	1228.17	326.74	96729.00	11277.33
Routier	5584.34	3085.45	966.12	81279.14	9740.37
Tertiaire	2460.49	797.30	228.71	66581.50	7531.31

L'analyse univariée est donc réalisée sur cette base agrégée de 96 départements, car c'est sur celle-ci que sera effectuée l'analyse en composantes principales.

Analyse univarié des variables quantitatives


Voici le tableau :

On remarque que quelques départements très émetteurs de CO2 tirent fortement la moyenne vers le haut, tandis que la majorité des départements ont des niveaux d'émissions plus faibles.

On peut alors penser que par exemple pour les déchets il y a une forte concentration géographique des infrastructures de traitement des déchets ce qui explique une médiane plutôt basse par rapport au maximum. De la même manière on remarque certains département sont beaucoup plus industrialisé que d'autre

En résumer, l'analyse descriptive met en évidence une forte hétérogénéité des émissions de CO2 selon les secteurs et les départements, avec des distributions très asymétriques et la présence de valeurs extrêmes.

Visualisation graphique :



Les boxplots mettent en évidence la présence de nombreuses valeurs extrêmes pour la plupart des secteurs. Ces valeurs ne traduisent pas des erreurs de mesure, mais reflètent des spécificités territoriales fortes (départements très industrialisés, fortement urbanisés ou spécialisés dans la production d'énergie). Elles ont donc été conservées, car elles constituent une information

pertinente pour l'analyse des profils d'émissions.

Variables qualitative

La base de données contient deux variables qualitatives (*dep_code* et *dep_nom*) correspondant à l'identification des départements. Ces variables servent uniquement de repères pour l'interprétation des résultats. Nous avons alors seulement vérifié l'absence de doublons afin de nous assurer que chaque département est bien représenté une seule fois. La réalisation d'un graphique en camembert serait illisible compte tenu du nombre élevé de départements et n'apporterait aucune information supplémentaire à l'analyse.

2. Analyse bivariable

Nous passons dès à présent à l'analyse bivariable afin d'analyser les relations entre nos variables.

Variables quantitative - quantitative

Pour analyser les relations entre les différents secteurs d'émissions de CO₂, nous utilisons la corrélation de Spearman. Bien que toutes les variables soient exprimées en tonnes de CO₂, leurs distributions sont très asymétriques et présentent des valeurs extrêmes. La corrélation de Spearman, basée sur les rangs des valeurs, est moins sensible aux outliers et permet d'identifier les associations monotones entre les secteurs de manière robuste. Elle est donc plus appropriée que la corrélation de Pearson dans ce contexte.

Les variables sont quantitatives, exprimées dans une unité homogène (tonnes équivalent CO₂), et présentent de fortes corrélations, notamment entre les secteurs liés à l'urbanisation, aux transports et à l'activité économique. En particulier, les émissions résidentielle, tertiaire et routière sont très fortement corrélées entre elles (coefficients supérieurs à 0,9), traduisant une importante redondance informationnelle.

À l'inverse, le secteur agricole présente des corrélations faibles et négatives avec les autres variables, suggérant un profil d'émissions distinct. Cette structure justifie pleinement le recours à une analyse en composantes principales afin de synthétiser l'information et d'identifier des profils territoriaux d'émissions.

Variables qualitative - qualitative

Les colonnes dep_code et dep_nom contiennent la même information sous des formats différents. Un tableau croisé ou un graphique n'apporterait aucune information supplémentaire et serait alors illisible.

Variables qualitative - quantitative

Répartition des émissions de CO₂ par secteur et par département

Intensité des émissions de CO₂ par secteur activité selon les départements

Comme observé, les émissions de CO₂ par secteur sont fortement corrélées. Cette redondance complique l'interprétation directe. L'analyse en composantes principales (ACP) permettra de réduire la dimension du jeu de données, de synthétiser l'information et de mettre en évidence les profils départementaux similaires ou distincts.

3. Analyse factorielle

Justification de l'ACP

Nous choisissons de faire une analyse en composantes principales puisque nous avons principalement des variables quantitatives.

Indice KMO

Afin de vérifier l'adéquation de nos données à une Analyse en Composantes Principales, nous avons calculé l'indice KMO. Celui-ci permet d'évaluer si les corrélations entre variables sont suffisamment structurées pour être synthétisées par une analyse factorielle

Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy

Call: KMO(r = Base_dep[, variables_quantitatives])

Overall MSA = 0.66

MSA for each item =

Agriculture	CO2_biomasse	Déchets	Energie	Industrie	Résidentiel
0.64	0.94	0.49	0.62	0.65	0.67
Routier	Tertiaire				
0.69	0.61				

Le résultat de l'indice KMO est inférieur à 0,6, il est exactement de 0,58, nous décidons malgré tout de conserver l'analyse en composante principale car nous venons de démontrer de fortes corrélations entre certains secteurs. Si l'on regarde plus précisément on voit que l'indice KMO est notamment tiré vers la bas à cause de la variable agriculture dont l'indice est seulement de 0,13 indiquant que ce secteur a un profil d'émission bien différent des autres secteurs. Par conséquent nous allons faire une ACP avec et sans la variable agriculture car ce secteur est malgré tout un secteur clé dans l'émission de CO2 en France et ces différences peuvent être intéressantes à analyser.

Test de Bartlett

Afin de vérifier correctement et vérifier notre intuition si il existe des corrélations suffisantes pour faire une ACP nous réalisons ce test de Bartlett.

```
$chisq  
[1] 1722.479
```

```
$p.value  
[1] 0
```

```
$df  
[1] 28
```

Le test de Bartlett s'avère très significatif et permet de rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle la matrice de corrélation est une matrice d'identité. Ainsi nous pouvons confirmer la présence de corrélations importantes entre les secteurs d'émissions et justifier la pertinence de l'analyse en composantes principales.

ACP avec agriculture

Warning: Setting row names on a tibble is deprecated.

Bien que toutes les variables soient exprimées dans la même unité (tonnes équivalent CO₂), leurs dispersions et ordres de grandeur diffèrent fortement selon les secteurs. Le centrage-réduction est donc nécessaire afin d'éviter que les secteurs les plus émetteurs ne dominent l'analyse et afin de mettre en évidence la structure relative des émissions entre départements.

```
[1] 8.049915e-06
```

Il n'est pas nul, donc il n'y a pas de corrélation parfaite.

Choix du nombre de dimension

Pourcentage d'inertie expliquée et règle de Kaiser


	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	4.9595905476	61.994881845	61.99488
comp 2	1.5945430239	19.931787799	81.92667
comp 3	0.9465292795	11.831615994	93.75829
comp 4	0.4488483555	5.610604444	99.36889
comp 5	0.0242698678	0.303373347	99.67226
comp 6	0.0197557665	0.246947082	99.91921
comp 7	0.0057414787	0.071768483	99.99098
comp 8	0.0007216805	0.009021006	100.00000

Après analyse des valeurs propres de l'ACP, on observe que les deux premières composantes principales expliquent 81,21% de la variance totale (Dim 1 : 61,46 %, Dim 2 : 19,74%). Ces deux axes contiennent donc l'essentiel de l'information et permettent de synthétiser efficacement les relations entre les secteurs et les départements. Nous avons donc choisi de retenir uniquement les deux premières composantes pour les analyses et visualisations ultérieures.

Selon la règle de Kaiser, on ne conserve que les composantes dont la valeur propre est supérieure à 1. Ici, les trois premières composantes ont une valeur propre > 1 (Comp 1 : 4,917, Comp 2 : 1,580, Comp 3 : 1,026). Cependant, la troisième composante n'apporte que 12,82 % d'inertie supplémentaire, donc nous choisissons de retenir les deux premières composantes.

Éboulis des valeurs propres



```
Warning in geom_bar(stat = "identity", fill = barfill, color = barcolor, :  
Ignoring empty aesthetic: `width`.
```



L'éboulis des valeurs propres montre une chute marquée après la deuxième composante, ce qui suggère que les deux premiers axes concentrent l'essentiel de l'information pertinente.


Warning: Using ``size`` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
i Please use ``linewidth`` instead.
i The deprecated feature was likely used in the ggpubr package.
Please report the issue at <https://github.com/kassambara/ggpubr/issues>.

Warning: ``aes_string()`` was deprecated in ggplot2 3.0.0.
i Please use tidy evaluation idioms with ``aes()``.
i See also ``vignette("ggplot2-in-packages")`` for more information.
i The deprecated feature was likely used in the factoextra package.
Please report the issue at <https://github.com/kassambara/factoextra/issues>.




même procédé sans les valeurs extrêmes:


Cercle des corrélations – Variables



Carte des individus (cos2)





Groupes d'individus (Clustering)



	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
C02_biomasse	16.70165	0.2440007	3.587262	2.911823	0.31149040
Résidentiel	16.41536	0.1343829	6.552187	1.531413	0.03025871
Routier	16.36993	0.3374327	5.078151	2.147535	1.35079491
Tertiaire	15.91002	0.2235180	10.240371	1.436160	0.09237371
Industrie	13.99576	0.2537463	5.939935	9.142437	70.29961002
Energie	12.31863	3.2763905	9.870038	50.322429	24.02957540

Link between the variable and the continuous variables (R-square)


	correlation	p.value
C02_biomasse	0.9771787	1.137751e-61
Résidentiel	0.9687673	1.099632e-55
Routier	0.9674258	6.941028e-55
Tertiaire	0.9537393	3.101945e-48
Industrie	0.8945251	7.114515e-33
Energie	0.8392194	2.842898e-25
Déchets	0.6535052	2.188478e-12
Agriculture	-0.2163694	3.940146e-02




Globalement on n'arrive pas à en tirer un quelconque résultat de cette acp vu que seuls quelques département tirent vers eux tout l'axe 1. Même en retirant les plus atypiques, on en obtient de nouveau et ce, en continue. Une solution est donc de créer une nouvelle colonne mesurant les émissions totales du département pour ensuite déterminer un ratio de chaque département pour

chaque secteur. On peut ainsi reprendre la base initiale, sans les départements “extrêmes”.

solution 1





#Solution 2 On va ici faire une acp sur l'intensité d'émissions par habitant.

New names:

```
* `` -> `...2`
* `` -> `...4`
* `` -> `...5`
* `` -> `...6`
* `` -> `...7`
* `` -> `...8`
* `` -> `...10`
* `` -> `...11`
* `` -> `...12`
* `` -> `...13`
* `` -> `...14`
* `` -> `...16`
* `` -> `...17`
* `` -> `...18`
* `` -> `...19`
* `` -> `...20`
```

Annexe

	Variable	Moyenne	Médiane	Minimum	Maximum	Ecart_type
1	Agriculture	2459.9758	1559.381285	0.003431569	98949.32	2926.958
2	CO2_biomasse	1774.3815	424.849988	3.758087577	576394.18	7871.342
3	Déchets	410.8063	54.748653	0.132243124	275500.37	4122.473
4	Energie	662.5698	4.709115	2.354557741	2535857.56	26455.714
5	Industrie	2423.1278	13.822427	1.052998302	6765118.85	56703.738
6	Résidentiel	1783.6779	227.091193	1.027266053	410675.90	8915.902
7	Routier	3535.5012	1070.895593	0.555092164	586054.67	9663.157
8	Tertiaire	1105.1659	216.297718	0.000000000	288175.40	5164.183