



Praxis für Naturheilverfahren
Martin Lee
Arzt für biologische und ganzheitliche Medizin
Argelanderstr. 173
53115 Bonn

- **Messineo, Maria**
geb. 19.05.1970 w
Praxis Barcode 15951500
Barcode 15951500
Labornummer 1910012737
Probenabnahme am 01.10.2019
Probeneingang am 01.10.2019 16:09
Ausgang am 07.10.2019



Laborärztlicher Befundbericht

Endbefund, Seite 1 von 2

Benötigtes Untersuchungsmaterial: Lithium-Heparin-Blut, Serum

Untersuchung	Ergebnis	Einheit	Vorwert	Referenzbereich/ Nachweisgrenze
--------------	----------	---------	---------	------------------------------------

Immunologie

T-Cellspot Borrelien:

Negativkontrolle	1,0	Index		1,0
Positivkontrolle	>50,0	Index		> 4,0
Borrelien-Antigen OspC	6,0	Index		< 4,0
Peptid-Sequenzen von OspC (outer surface protein C) B. burgdorferi, B. afzelii und B. garinii				
Borrelien-Vollantigen	7,0	Index		< 4,0

Vollantigen: Zell-Lysat aus Borrelia burgdorferi.

Infektionsserologie

Mycoplasma-AK (IgG)*	20,0	U/ml		< 20
				Kinder: < 10 U/ml
				Erwachsene: < 20 U/ml
Mycoplasma-AK (IgA)*	10,3	U/ml		< 10
Mycoplasma-AK (IgM)*	5,5	U/ml		< 13

IgG- und IgA Antikörper sind grenzwertig nachweisbar.
Akute oder zurückliegende Infektion mit Mykoplasmen.
Serologische Kontrolle in ca. 7-10 Tagen empfohlen

Hinweistext

Bitte beachten Sie:

Die oben aufgeführten Analysen aus den Bereichen Klinische Chemie, Gerinnung und Hämatologie wurden in der privatärztlichen Laborgemeinschaft durchgeführt.

Übersicht Immunologie:

Im T-Cellspot ließen sich Borrelien-spezifische Effektor-T-Zellen nachweisen. Hinweis auf aktive und ggf. behandlungsbedürftige Borrelien-Infektion. Zur Bestätigung der Diagnose empfehlen wir die Analyse der Borrelien-Serologie (ELISA, Western-Blot). Zur Verlaufskontrolle ist eine weitere Untersuchung mit dem T-Cellspot Borrelien nach vier bis sechs Wochen sinnvoll.

Bei der Diagnosestellung und einer darauf beruhenden Therapieindikation ist das Einbeziehen der klinischen Symptomatik, basierend auf einer umfangreichen Anamnese und körperlichen Untersuchung, von entscheidender Bedeutung.

Immunologische Diagnostik - Befundinterpretation

T-Cellspot Borrelien

Der T-Cellspot Borrelien basiert auf dem Nachweis der antigeninduzierten Freisetzung des Zytokins Interferon-gamma durch reaktive T-Zellen. Dazu werden Lymphozyten des Patienten in Mikrokulturen mit Borrelien-Antigenen stimuliert. Die reaktiven Borrelien-spezifischen Effektor-T-Zellen werden anschließend auf Einzelzellebene durch eine Färbereaktion in Form von Spots sichtbar. Die entstehenden Spots werden mit Hilfe eines bildanalytischen Auswertungsverfahrens anhand definierter Kriterien (Größe, Form, Intensität) automatisiert beurteilt und gezählt.

Die Anzahl der Spots in stimulierten Mikrokulturen wird zur Anzahl der Spots in Mikrokulturen ohne Stimulation (Negativkontrolle) ins Verhältnis gesetzt. Der resultierende Index zeigt eine Borrelien-spezifische Stimulation an, wenn der Wert von 4,0 überschritten wird. Zur Überprüfung der Vitalität und allgemeinen Funktionalität der Lymphozyten (Positivkontrolle) werden Patientenzellen in separaten Mikrokulturen mit einem Mitogen stimuliert, was zu einer Aktivierung sämtlicher T-Zellen in der Kultur und damit zu einer deutlichen Zunahme der Spots führen sollte.

Laborärztlich validiert durch Frau Dr. med. Irina Neumann

Die mit * gekennzeichneten Untersuchungen wurden von einem unserer akkreditierten Partnerlaboratorien durchgeführt.

** Untersuchung nicht akkreditiert