

Privatpraxis am Wasserturm
Dr. med. Peter Germann
Facharzt für Allgemeinmedizin und Umweltmedizin

Köhlerstr. 14
67549 Worms



Laborärztlicher Befundbericht

Endbefund, Seite 1 von 2

Benötigtes Untersuchungsmaterial: Lithium-Heparin-Blut, Serum



Untersuchung	Ergebnis	Referenzbereich/ Vorwert Nachweisgrenze
--------------	----------	--

Immunologie

T-Cellspot Borrelien:

Negativkontrolle	1,0 Index	1,0
Positivkontrolle	50,0 Index	> 4,0
Borrelien-Antigen OspC	1,0 Index	< 4,0
Peptid-Sequenzen von OspC (outer surface protein C) B. burgdorferi, B. afzelii und B. garinii.		
Borrelien-Vollantigen	15,0 Index	< 4,0
Vollantigen: Zell-Lysat aus Borrelia burgdorferi.		

Infektionsserologie

Bartonella henselae-AK (IgG)	<1:320 Titer	< 1:320
Bitte beachten Sie den geänderten Normbereich.		
Bartonella henselae-AK (IgM)	<1:100 Titer	< 1:100
Bitte beachten Sie den geänderten Normbereich.		
Bartonella quintana-AK (IgG)	<1:320 Titer	< 1:320
Bitte beachten Sie den geänderten Normbereich.		
Bartonella quintana-AK (IgM)	<1:100 Titer	< 1:100
Bitte beachten Sie den geänderten Normbereich.		
Borrelien-AK Westernblot (IgG) p25, p17 (p30)	positiv	negativ

Herzlichen Dank für Ihren Untersuchungsauftrag.

Laborärztlich validiert für das MVZ Labor Dr. Kirkamm GmbH

BUON GIORNO,

HERE YOU SEE THAT BORRELIA IS ACTIVE AGAIN~~Y~~ AND SO IT IS MANDATORY TO INTENSIFY THE THERAPY.

IF YOUR REGIMEN FAILS MY BEST RESULTS I'VE GOT WAS WITH MINOCYCLIN 2X50mg WHEN IRRITATIONS COME FROM THE NERVOUS SYSTEM.

IN ADDITION TO THAT LEAVE IRON AWAY AND TAKE CARDUS MARIANUS FOR THE LIVER DETOXIFICATION AND QUENSYL OR QUANTALAN.

BEST REGARDS,

Dr. Peter Jomann
13.10.2015