# Osnove verjetnosti in statistike Zvezne porazdelitve

Asistent dr. Kristina Veljković

# ENAKOMERNA PORAZDELITEV

- ightharpoonup Vsi izidi na intervalu [a, b] so enako verjetni.
- ightharpoonup Slučajna spremenljivka X je enakomerno porazdeljena,  $X \sim \mathcal{U}[a,b].$



### ENAKOMERNA PORAZDELITEV

- ightharpoonup Vsi izidi na intervalu [a, b] so enako verjetni.
- ► Slučajna spremenljivka X je enakomerno porazdeljena,  $X \sim \mathcal{U}[a,b]$ .
- ► Gostota verjetnosti  $p_X(x) = \frac{1}{b-a}, \ x \in [a,b].$
- ▶ Porazdelitvena funkcija  $F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}, \ x \in [a,b].$
- ▶ Pričakovana vrednost  $E(X) = \frac{a+b}{2}$ .
- ► Disperzija  $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ .

**Primer 1.** (Zbirka) Avtobus vozi na 10 minut, na postajo pridemo naključno. Naj bo *X* čas čakanja na avtobus.

- a) Določi  $F_X(x)$  in  $p_X(x)$ .
- b) Koliko verjetno bomo čakali manj kot 5 minut?
- c) Koliko verjetno bomo čakali več kot 7 minut?

**Primer 2.** (Zbirka) Na štoparici imamo oznake za natančnost 0.2 sekunde. Pri merjenju čas zaokrožimo na najbližjo oznako. Naj bo *X* absolutna napaka izmerjenega časa v sekundah.

- a) Določi porazdelitev  $F_X(x)$ .
- b) Koliko verjetno bomo naredili napako vsaj 0.05 sekund?



# EKSPONENTNA PORAZDELITEV

- Slučajna spremenljivka *X* čas med zaporednima dogodkoma, pri čemer so dogodki neodvisni in se pojavijo s konstantno stopnjo λ (ang. *rate*).
- lacktriangle  $\lambda$  povprečno število dogodkov na izbrano časovno enoto.
- ► Slučajna spremenljivka X je eksponentno porazdeljena,  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ .

# EKSPONENTNA PORAZDELITEV

- Slučajna spremenljivka *X* čas med zaporednima dogodkoma, pri čemer so dogodki neodvisni in se pojavijo s konstantno stopnjo λ (ang. *rate*).
- ightharpoonup  $\lambda$  povprečno število dogodkov na izbrano časovno enoto.
- ► Slučajna spremenljivka X je eksponentno porazdeljena,  $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ .
- Gostota verjetnosti  $p_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \ x \ge 0.$
- ▶ Porazdelitvena funkcija  $F_X(x) = 1 e^{-\lambda x}, \ x \ge 0.$
- ▶ Pričakovana vrednost  $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ .
- ► Disperzija  $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ .

**Primer 3.** Dolžina telefonskega klica v minutah je eksponentna slučajna spremenljivka X s parametrom  $\lambda=\frac{1}{10}$ . Če nekdo pride tik pred vami na javno telefonsko govorilnico, kolikšna je verjetnost, da boste morali počakati

- a) več kot 10 minut?
- b) med 10 in 20 minutami?

**Primer 4.** (Zbirka) Na malo obiskanem spletnem strežniku je v povprečju 5 obiskov na uro. Administrator se loti vzdrževalnih del.

- a) Koliko je pričakovan čas do naslednjega obiska?
- b) Največ koliko časa je lahko strežnik nedosegljiv, da z verjetnostjo več kot 90% v tem času ne bo nobenega obiska?