




TIM KHỎE MỖI NGÀY™

TÀI LIỆU THỰC HÀNH

CHECKLIST ĐO HUYẾT ÁP ĐÚNG CÁCH

Hướng dẫn ngắn gọn, dễ nhớ, có minh họa và ví dụ ghi kết quả tại nhà.



Đo đúng mới có kết quả đáng tin cậy

Chỉ vài sai lệch nhỏ về tư thế, vòng bít hoặc thời điểm đo cũng có thể làm kết quả cao hoặc thấp hơn thực tế.

5 phút nghỉ - Tay ngang tim - Đo 2 lần

GHÌ NHỚ TRONG 6 BƯỚC

- 1 Tránh cà phê, thuốc lá, vận động 30 phút
- 2 Đi tiểu và ngồi nghỉ 5 phút
- 3 Ngồi tựa lưng, chân đặt phẳng
- 4 Quấn vòng bít trên da trần
- 5 Giữ tay ngang mức tim, không nói
- 6 Đo 2 lần, cách nhau ít nhất 1 phút

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐO

Một lần đo chính xác bắt đầu từ việc chuẩn bị đúng.



TRÁNH TRONG 30 PHÚT


- ☐ Cà phê, trà đặc, nước tăng lực
- ☐ Hút thuốc hoặc dùng nicotine
- ☐ Tập thể dục, leo cầu thang nhanh
- ☐ Rượu bia ngay trước khi đo



LÀM TRƯỚC KHI ĐO

- ☐ Đi tiểu nếu đang buồn tiểu
- ☐ Ngồi yên, thư giãn ít nhất 5 phút
- ☐ Không nói chuyện hoặc nhấn tin
- ☐ Đo trong phòng yên tĩnh, nhiệt độ dễ chịu

CHỌN MÁY VÀ VÒNG BÍT



Ưu tiên máy đo huyết áp tự động ở bắp tay, đã được kiểm định độ chính xác. Vòng bít phải phù hợp chu vi cánh tay; vòng quá nhỏ thường làm số đo cao giả, vòng quá lớn có thể làm số đo thấp hơn.

Mẹo thực tế

Mang máy đến buổi khám định kỳ để nhân viên y tế kiểm tra cách dùng và so sánh kết quả với thiết bị tại cơ sở y tế.


KHÔNG NÊN ĐO NGAY KHI...

Vừa chạy vội, đang căng thẳng, vừa uống cà phê, đang nói chuyện điện thoại hoặc bàng quang căng. Hãy xử lý nguyên nhân và nghỉ yên trước khi đo lại.


2. TƯ THẾ ĐÚNG - VÒNG BÍT ĐÚNG

Tư thế đúng giúp hạn chế sai số và làm các lần đo có thể so sánh với nhau.

TƯ THẾ ĐÚNG



SAI THƯỜNG GẶP



CHECKLIST TƯ THẾ

- ☐ Ngồi trên ghế có tựa lưng; lưng được nâng đỡ.
- ☐ Hai bàn chân đặt phẳng trên sàn; không bắt chéo chân.
- ☐ Cánh tay thả lỏng, đặt trên bàn; lòng bàn tay hướng lên.
- ☐ Giữa vòng bít ngang mức tim.
- ☐ Quấn vòng bít trực tiếp trên da trần, không quấn ngoài áo.
- ☐ Vòng bít ôm vừa; mép dưới ở ngay phía trên nếp khuỷu theo hướng dẫn của máy.
- ☐ Trong lúc đo: không nói, không cử động, không nắm chặt bàn tay.

Câu nhớ nhanh: Lưng tựa - Chân phẳng - Tay ngang tim - Im lặng.

3. ĐO 2 LẦN VÀ GHI KẾT QUẢ

Một số đo đơn lẻ chỉ là “ảnh chụp tại thời điểm đó”. Nhật ký nhiều ngày giúp bác sĩ đánh giá đáng tin cậy hơn.

QUY TRÌNH 4 BƯỚC

1

Ngồi yên

5 phút

2

Đo lần 1

Không nói

3

Chờ

Ít nhất 1 phút

4

Đo lần 2

Ghi cả hai kết quả

VÍ DỤ NHẬT KÝ HUYẾT ÁP TẠI NHÀ

Ngày/giờ	Lần 1	Lần 2	Nhịp tim	Ghi chú
17/07 - 07:00	132/82	128/80	72	Đã nghỉ 5 phút
17/07 - 19:30	136/84	131/82	75	Sau ăn tối 2 giờ

Cách ghi đúng

Ghi cả hai lần đo, ngày giờ, nhịp tim và tình huống đặc biệt. Không tự ý bỏ thuốc hoặc tăng liều chỉ vì một lần đo cao hay thấp.

KHI NÀO NÊN ĐO?

Khi bác sĩ yêu cầu theo dõi tại nhà, thường nên đo vào cùng thời điểm mỗi ngày, phổ biến là buổi sáng và buổi tối. Thời gian, số ngày và cách tính trung bình cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc cơ sở y tế.

Lưu ý: Không đo ngay sau khi thức dậy rồi vội vàng đứng lên; hãy đi vệ sinh, ngồi nghỉ và chuẩn bị đúng trước khi đo.

4. KHI HUYẾT ÁP CAO BẤT THƯỜNG

Bình tĩnh, kiểm tra lại kỹ thuật đo và đánh giá triệu chứng đi kèm.

NẾU KẾT QUẢ CAO HƠN THƯỜNG NGÀY

- 1 Ngồi yên, không nói chuyện
- 2 Kiểm tra lại vòng bít và tư thế
- 3 Chờ ít nhất 1 phút rồi đo lại
- 4 Ghi kết quả; liên hệ nhân viên y tế nếu vẫn cao

CẢNH BÁO CẤP CỨU

Nếu huyết áp trên 180/120 mmHg và có triệu chứng nghiêm trọng, hãy gọi cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế ngay.

- Đau ngực hoặc khó thở
- Yếu, tê một bên cơ thể
- Khó nói, nói không rõ
- Thay đổi thị lực
- Lú lẫn, bất tỉnh hoặc đau dữ dội bất thường

THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG

Huyết áp tại nhà hỗ trợ theo dõi, nhưng không tự thay thế chẩn đoán. Không tự ý ngừng, đổi hoặc tăng liều thuốc huyết áp nếu chưa được bác sĩ hướng dẫn.

NGUỒN KIỂM CHỨNG

- WHO - Technical specifications for automated non-invasive blood pressure measuring devices
- CDC - Measuring Your Blood Pressure
- American Heart Association - Home Blood Pressure Monitoring
- ESC - 2024 Guidelines for Elevated Blood Pressure and Hypertension