

NHẬT KÝ HUYẾT ÁP



Theo dõi sáng - tối • Ghi 2 lần đo • Mang theo khi đi khám

Thông tin người theo dõi

Họ và tên:

Năm sinh:

Thuốc huyết áp đang dùng:

Mục tiêu do bác sĩ hướng dẫn:

Tài liệu dành cho tự theo dõi tại nhà - không thay thế chẩn đoán hoặc chỉ định điều trị.

Cách sử dụng nhật ký 7 ngày

Mục tiêu: tạo một chuỗi số đo nhất quán để bác sĩ có thêm thông tin khi đánh giá huyết áp. Không tự ngừng hoặc đổi liều thuốc chỉ dựa trên nhật ký.

1	Chuẩn bị đúng Tránh hút thuốc, cà phê, rượu bia và vận động gắng sức ít nhất 30 phút trước đo. Đi tiểu nếu đang buồn.
2	Nghỉ 5 phút Ngồi yên, không nói chuyện; lưng tựa ghế, hai chân đặt phẳng, không bắt chéo.
3	Quấn vòng bít Quấn trên cánh tay trần, đúng cỡ; đặt cánh tay trên bàn, ngang mức tim.
4	Đo 2 lần Mỗi buổi đo hai lần, cách nhau khoảng 1 phút. Ghi cả hai kết quả và nhịp tim.
5	Giữ thời điểm ổn định Ưu tiên buổi sáng trước ăn/uống thuốc (theo hướng dẫn bác sĩ) và buổi tối trước bữa tối hoặc giờ cố định.
6	Ghi chú hoàn cảnh Ghi triệu chứng, quên thuốc, mất ngủ, đau, căng thẳng, vận động hoặc yếu tố bất thường.

VÍ DỤ GHI MỘT BUỔI ĐO

Sáng ngày 1: Lần 1: 138/86 mmHg, mạch 72; Lần 2: 134/84 mmHg, mạch 70. Ghi chú: ngủ 6 giờ, chưa uống thuốc buổi sáng.

Nhật ký đo huyết áp - Ngày 1 đến ngày 4

Điền đủ cả hai lần đo. Không tự làm tròn số. Ghi chú bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng kết quả.

Ngày y	Buổi	Lầ n	Tâm thu (mmHg)	Tâm trương (mmHg)	Mạch (lần/phút)	Giờ đo	Ghi chú
1	Sáng	1					
		2					
	Tối	1					
		2					
2	Sáng	1					
		2					
	Tối	1					
		2					
3	Sáng	1					
		2					
	Tối	1					
		2					
4	Sáng	1					
		2					
	Tối	1					
		2					

Nhật ký đo huyết áp - Ngày 5 đến ngày 7

Duy trì cùng máy, cùng cánh tay và thời điểm tương tự trong suốt 7 ngày.

Ngày	Buổi	Lần	Tâm thu (mmHg)	Tâm trương (mmHg)	Mạch (lần/phút)	Giờ đo	Ghi chú
5	Sáng	1					
		2					
	Tối	1					
		2					
6	Sáng	1					
		2					
	Tối	1					
		2					
7	Sáng	1					
		2					
	Tối	1					
		2					

TÓM TẮT SAU 7 NGÀY

Số ngày đo đủ sáng và tối: ____ / 7 ngày

Có lần quên thuốc hoặc đổi giờ thuốc: ☐ Không ☐ Có, ngày: _____

Triệu chứng đáng chú ý: _____

Câu hỏi muốn trao đổi với bác sĩ: _____

Khi nào cần liên hệ nhân viên y tế?

KẾT QUẢ RẤT CAO	DẤU HIỆU NGUY HIỂM
Nếu huyết áp trên 180/120 mmHg: Ngồi nghỉ và đo lại sau ít nhất 1 phút. Nếu vẫn rất cao, liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn ngay.	Gọi cấp cứu 115 ngay nếu huyết áp rất cao kèm đau ngực, khó thở, yếu/tê, nói khó, nhìn mờ, lú lẫn hoặc triệu chứng thần kinh bất thường.

Ghi nhớ nhanh

NGHỈ 5 PHÚT	TAY NGANG TIM	KHÔNG NÓI	ĐO 2 LẦN	GHI ĐỦ 7 NGÀY
-------------	---------------	-----------	----------	---------------

Nguồn tham khảo đã kiểm tra

- [American Heart Association - Home Blood Pressure Monitoring \(cập nhật 14/8/2025\)](#)
- [CDC - Measuring Your Blood Pressure \(cập nhật 12/5/2026\)](#)
- [European Society of Hypertension - Blood Pressure Monitoring](#)
- [WHO - Technical specifications for automated non-invasive blood pressure measuring devices with cuff](#)

Lưu ý: Nhật ký này là công cụ hỗ trợ theo dõi. Ngưỡng chẩn đoán và mục tiêu điều trị phải do bác sĩ xác định dựa trên tuổi, bệnh nền, thai kỳ, thuốc đang dùng và nguy cơ tim mạch của từng người.