Veille ataxies cérébelleuses — semaine du 2026-10-12

Bonjour à toutes et à tous, voici notre point hebdomadaire sur les avancées scientifiques et les essais cliniques qui touchent de près ou de loin les ataxies cérébelleuses. Comme chaque semaine, certains éléments concernent spécifiquement l'ataxie de Friedreich (que notre association ne couvre pas directement) mais nous les mentionnons car ils peuvent éclairer des mécanismes communs avec d'autres ataxies. Bonne lecture !

Diagnostic et outils d'évaluation

La capture de mouvement en 3D permet de distinguer une ataxie cérébelleuse légère d'une maladie de Parkinson débutante

Quand les symptômes sont discrets, il est parfois difficile pour les médecins de différencier une ataxie cérébelleuse légère d'une maladie de Parkinson débutante, car les tests cliniques habituels (toucher du doigt au nez, mouvements rapides de la main) se ressemblent. Cette étude utilise des caméras de capture de mouvement en 3D pour mesurer précisément les gestes du bras et identifier des différences invisibles à l'œil nu. Cela pourrait, à terme, aider à poser un diagnostic plus rapide et plus fiable dès les premiers signes.

Un test d'évaluation cognitive du cervelet peut être réalisé à distance

Le CCAS-S est un test qui évalue les troubles cognitifs et émotionnels liés aux maladies du cervelet (mémoire, attention, humeur), de plus en plus utilisé dans les essais cliniques. Cette étude montre qu'il peut être réalisé par vidéo à distance avec des résultats comparables à une consultation en présentiel. C'est une bonne nouvelle pour les patients qui habitent loin des centres spécialisés, car cela facilite le suivi sans déplacement.

Le neurofilament à chaîne légère : un marqueur sanguin prometteur pour suivre les ataxies

Cette synthèse fait le point sur un marqueur présent dans le sang, le neurofilament à chaîne légère, qui reflète les dommages aux neurones. Il pourrait servir à mesurer plus facilement l'évolution de la maladie et l'effet des traitements testés, sans attendre de voir les symptômes s'aggraver. Un tel marqueur est très attendu pour accélérer les essais cliniques dans les ataxies, qui progressent souvent lentement et de façon variable d'un patient à l'autre.

Un séquençage ADN de nouvelle génération pour mieux caractériser les expansions génétiques responsables des ataxies

Certaines ataxies sont causées par des répétitions anormales de petites séquences d'ADN. Cette étude teste une technique de séquençage plus précise et détaillée (nanopore) pour mieux caractériser ces anomalies génétiques chez 132 participants. Une meilleure caractérisation génétique peut améliorer le diagnostic et, potentiellement, la sélection des patients pour de futurs essais thérapeutiques.

Pistes thérapeutiques et mécanismes de la maladie

Une pilule qui imite l'altitude pourrait protéger les neurones dans plusieurs maladies neurodégénératives

Des chercheurs ont développé une approche qui expose l'organisme à un léger manque d'oxygène de façon contrôlée et continue (comme en altitude), ce qui semble protéger les neurones dans différents modèles de souris atteintes de maladies neurodégénératives. Ces résultats sont encore précliniques, c'est-à-dire obtenus chez l'animal, mais ils ouvrent une piste de recherche intéressante qui pourrait un jour concerner plusieurs types de maladies du système nerveux, dont certaines ataxies. Il est encore trop tôt pour savoir si cette approche sera un jour testée chez l'humain atteint d'ataxie.

Un variant génétique rare de type SCA19/22 associé à des symptômes parkinsoniens

Cette étude de cas rapporte un patient japonais porteur d'une nouvelle variante du gène KCND3, impliqué dans la SCA19/22 (un type d'ataxie spinocérébelleuse), qui présentait à la fois une ataxie et des

symptômes évoquant la maladie de Parkinson. Ce type de description enrichit la connaissance du spectre des symptômes possibles liés à ce gène, ce qui peut aider les médecins à mieux reconnaître et diagnostiquer des formes atypiques d'ataxie.

Essais cliniques en cours

Étude de sécurité d'un nouveau médicament (ATI-105) chez des volontaires sains, en vue d'un futur essai dans l'ataxie de Friedreich

Cette étude est une première étape : elle teste la tolérance et le comportement dans l'organisme d'une nouvelle molécule, ATI-105, chez des personnes en bonne santé, avant d'envisager de futurs essais chez des patients atteints d'ataxie de Friedreich. Bien que cette maladie ne soit pas directement suivie par notre association, ce type d'étude de sécurité est une étape habituelle avant tout essai thérapeutique plus large.

Une combinaison vestimentaire de stimulation électrique à domicile pour réduire les troubles de coordination et la raideur musculaire

Cette étude évalue si le port à domicile d'une combinaison envoyant de légères stimulations électriques peut améliorer la coordination (ataxie) et réduire la raideur musculaire (spasticité) chez des personnes atteintes de sclérose en plaques. Bien que menée chez des patients SEP, cette approche non-médicamenteuse pourrait intéresser plus largement les personnes souffrant de troubles de la coordination d'origine cérébelleuse, si son efficacité est confirmée.