FcμR-D1-Fcμ contact frequency (side-chain, distance ≤ 4.5 Å)

FcμR-D1 residues

Met42 0.62 0.59 0.38 0.21 0.72 0.53 0.62 0.81
His43 0.56 0.88 0.50
Val44 0.59 0.56 0.19 0.75 0.66
Arg45 0.25 1.00 0.25 0.86
Met52 0.62
Ser55 0.12
Gly56 0.12
Thr57 0.96 0.62
Cys58 0.25
Gly59 0.79 0.75
Thr60 0.95 1.00 0.85
Ser63 0.89
Thr65 0.46 0.50 0.50 0.98 0.44
Asn66 0.19 0.50 0.67 0.58 0.96
Phe67 0.80 1.00 0.53 0.12 0.25
Lys69 0.25 0.86
Glu71 0.38
Lys73 0.25
Ala106 0.56 0.25
Gly107 0.12 0.62 0.69 0.56
Met108 0.25 0.56 0.52 0.75 0.82 0.12 0.12
Asn109 0.25 0.96 0.12 1.00 0.71
Thr110 0.91 1.00 1.00
Asp111 1.00 0.91 0.25
Arg112 0.19 0.25 0.19 0.25 0.12 0.56 0.59 0.81 0.12 0.25 0.25 0.59 0.53 0.46 0.56 0.71
Gly113 1.00 0.25 0.56

His63 Ser65 Asp66 Arg105 Pro130 Asp131 Tyr134 His450 Arg451 Asp453 Asn465 Leu466 Arg467 Glu468 Ser469 Gln490 Arg491 Gln493 Pro494 Leu495 Ser496 Gln510 Ala511 Pro512 Arg514 Ser524 Glu525 Glu526 Thr530 Gly531 Glu532 Thr533 Ser569 Asp570 Thr571 Ala572 Thr574 Cys575 Tyr576

Immunoglobulin heavy constant μ residues

Average proportion of FcμR chains with contact
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0