

Álgebra/Álgebra II

Clase 17 - Coordenadas. Matriz de una transformación lineal

FAMAF / UNC

06 de junio de 2024

En esta clase introduciremos coordenadas respecto a una base ordenada y la matriz de una transformación lineal respecto a dos bases ordenadas.

Esta presentación está basada en las secciones 5.5 y 5.6 de las notas de la materia.

Hasta aquí hemos estudiado espacios vectoriales de manera general, abstrayendo las propiedades de \mathbb{R}^n .

Esto nos facilitó deducir propiedades válidas, no sólo para \mathbb{R}^n , si no también para polinomios, matrices, funciones, etc. sin tener que probar las propiedades en cada caso.

Sin embargo, cada vez que queremos operar en ejercicios particulares, sí recurrimos al auxilio de números concretos. Por ejemplo, hacemos esto cada vez que en lugar de usar un polinomio nos quedamos con sus coeficientes.

Estos números concretos que determinan de manera precisa a un vector es lo que llamaremos coordenadas. En el caso de \mathbb{K}^n , obtendremos las coordenadas usuales.

Definición 3.5.1

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y \mathcal{B} una base de V . Se dice que \mathcal{B} es una *base ordenada* si los vectores que la forman están ordenados.

Ejemplo

La base canónica de \mathbb{R}^n : $\mathcal{C} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base ordenada.

Si cambiamos el orden tenemos otra base ordenada. Por ejemplo,

$$\mathcal{C}' = \{e_n, e_{n-1}, \dots, e_2, e_1\}$$

es otra base ordenada distinta a \mathcal{C} .

Nota 1. La notación “conjuntista” es poco feliz, pero es la que se usa en la literatura.

Nota 2. El orden es importante para luego definir las coordenadas.

Proposición (Proposición 5.5.2 en las Notas)

Sea V un \mathbb{K} -espacio vectorial de dimensión finita y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V . Entonces, para cada $v \in V$, existen únicos escalares $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ tales que

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$$

Demostración

Dichos escalares existen porque \mathcal{B} genera a V .

Veamos que son únicos. Sean $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ otros escalares que satisfacen el enunciado. Entonces tenemos que

$$x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = v = y_1 v_1 + \dots + y_n v_n$$

Restando la sumatoria de la derecha a la de la izquierda obtenemos:

$$(x_1 - y_1)v_1 + \cdots + (x_n - y_n)v_n = 0.$$

Dado que \mathcal{B} es LI, $x_i - y_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$), o dicho de otro modo

$$x_i = y_i \quad (1 \leq i \leq n).$$



Esta proposición permite, dada una base ordenada, asociar a cada vector una n -tupla que serán la coordenadas del vector en esa base.

Definición

Sea V espacio vectorial de dimensión finita y sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V , si $v \in V$ y

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n,$$

entonces x_i es la *coordenada i -ésima de v* y denotamos

$$[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n).$$

El vector $[v]_{\mathcal{B}}$ es el *vector de coordenadas de v* respecto a la base \mathcal{B} .

También nos será útil describir a v como una matriz $n \times 1$ y en ese caso hablaremos de *la matriz de v en la base \mathcal{B}* :

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

(Usamos la misma notación).

Observación

Recordemos siempre:

$$v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n \quad \Longleftrightarrow \quad [v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n).$$

Ejemplo

Las coordenadas de $v \in \mathbb{K}^n$ con respecto a la base canónica \mathcal{C} son las coordenadas usuales de \mathbb{K}^n .

En efecto, si $v = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ entonces

$$[v]_{\mathcal{C}} = (x_1, \dots, x_n) \quad \Longleftrightarrow \quad v = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n.$$

Ejemplo

Sea $\mathcal{B} = \{(1, -1), (2, 3)\}$ una base ordenada de \mathbb{R}^2 . Encontrar las coordenadas de $(1, 0) \in \mathbb{R}^2$ en la base \mathcal{B} .

Solución

Debemos encontrar escalares $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que

$$(1, 0) = x_1(1, -1) + x_2(2, 3)$$

Entonces tenemos que resolver el sistema

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ -x_1 + 3x_2 = 0 \end{cases}$$

La solución es $x_1 = \frac{3}{5}$ y $x_2 = \frac{1}{5}$. Es decir

$$[(1, 0)]_{\mathcal{B}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{1}{5} \right)$$



Ejemplo

¿Qué vector de \mathbb{R}^2 tiene coordenadas 1 y 2 en la base ordenada $\mathcal{B} = \{(1, -1), (2, 3)\}$?

Dicho de otro modo,

¿Qué $v \in \mathbb{R}^2$ tiene coordenadas $[v]_{\mathcal{B}} = (1, 2)$?

Respuesta

$$v = (5, 5) \in \mathbb{R}^2$$

En efecto, si 1 y 2 son las coordenadas de v en la base \mathcal{B} quiere decir que

$$v = 1(1, -1) + 2(2, 3) = (5, 5)$$

La siguiente simple observación suele ser muy útil y la usaremos más adelante.

Observación

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V .

Las coordenadas de $v_i \in \mathcal{B}$ son

$$[v_i]_{\mathcal{B}} = (0, \dots, 1, \dots, 0),$$

es decir, todas 0 salvo un 1 en la i -ésima coordenada.

Pues, $v_i = 0v_1 + \dots + 1v_i + \dots + 0v_n$.

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V .

El vector de coordenadas $[v]_{\mathcal{B}}$ es un vector en \mathbb{K}^n entonces lo podemos sumar y multiplicar por escalares.

A continuación veremos como se relacionan estas operaciones con las operaciones propias del espacio vectorial V .

Proposición (Proposición 5.5.4 de las Notas)

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V un \mathbb{K} -espacio vectorial.
Entonces

(1) Las coordenadas de la suma es la suma de las coordenada:

$$[v + w]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} \quad \forall v, w \in V.$$

(2) Las coordenadas del producto por un escalar es igual a multiplicar las coordenadas por el escalar:

$$[\lambda v]_{\mathcal{B}} = \lambda[v]_{\mathcal{B}} \quad \forall v \in V, \lambda \in \mathbb{K}.$$

A continuación la demostración.

Demostración

(1) Si $v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n$ y $w = y_1 v_1 + \cdots + y_n v_n$, entonces

$$v + w = (x_1 + y_1)v_1 + \cdots + (x_n + y_n)v_n,$$

luego

$$[v + w]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = [v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

(2) Si $v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\lambda v = (\lambda x_1)v_1 + \cdots + (\lambda x_n)v_n,$$

luego

$$[\lambda v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \lambda [v]_{\mathcal{B}}.$$

Corolario

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V un \mathbb{K} -espacio vectorial. Entonces la aplicación

$$\begin{aligned}\Theta : V &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}}\end{aligned}$$

es un isomorfismo.

Demostración

La proposición anterior nos dice que Θ es lineal.

Por otro lado, $\Theta(v_i) = [v_i]_{\mathcal{B}} = e_i$, luego Θ manda base en base y por lo tanto es un isomorfismo.



Definición

Sean V y W dos \mathbb{K} -espacios vectoriales con bases ordenadas $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$, respectivamente.

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal tal que

$$Tv_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i.$$

A La matriz $m \times n$ definida por $[A]_{ij} = a_{ij}$ se la denomina *la matriz de T respecto a las bases ordenadas \mathcal{B} y \mathcal{B}'* ; y se la denota

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = A.$$

Notar que $[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ con $n = \dim V$ y $m = \dim W$.

Ejemplo

Sea $T : \mathbb{K}^3 \longrightarrow \mathbb{K}^2$ definida por

$$T(x, y, z) = (2x - z, -x + 3y + z)$$

y $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ base ordenada de \mathbb{K}^3 .

Calculemos la matriz de T en la base \mathcal{C}_3 y la base canónica \mathcal{C}_2 de \mathbb{K}^2 , es decir, calculemos $[T]_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2}$.

$$T(1, 0, 0) = (2, -1) = 2e_1 + (-1)e_2$$

$$T(0, 1, 0) = (0, 3) = 0e_1 + 3e_2$$

$$T(0, 0, 1) = (-1, 1) = (-1)e_1 + 1e_2.$$

Luego

$$[T]_{\mathcal{C}_3\mathcal{C}_2} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Notar que si denotamos

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix},$$

entonces

$$T(x, y, z) = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Es decir, la transformación lineal T es igual a la transformación lineal “multiplicar por la matriz A ”.

Ejemplo

Sea $T : \mathbb{K}^3 \longrightarrow \mathbb{K}^2$ definida por

$$T(x, y, z) = (2x - z, -x + 3y + z)$$

y $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ base ordenada de \mathbb{K}^3 .

Calculemos la matriz de T en la base \mathcal{B} y la base canónica \mathcal{C}_2 de \mathbb{K}^2

$$T(1, 1, 1) = (1, 3) = 1e_1 + 3e_2$$

$$T(0, 1, 1) = (-1, 4) = (-1)e_1 + 4e_2$$

$$T(0, 0, 1) = (-1, 1) = (-1)e_1 + 1e_2.$$

Luego

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Observación

$$Tv_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \quad \Leftrightarrow \quad [Tv_j]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}$$

Luego,

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ [Tv_1]_{\mathcal{B}'} & [Tv_2]_{\mathcal{B}'} & \cdots & [Tv_n]_{\mathcal{B}'} \\ | & | & & | \end{array} \right]$$

es decir, las columnas son los vectores de coordenadas de $Tv_i \in W$ con respecto a la base \mathcal{B}'

Ejemplo

Sea $T : \mathbb{K}^3 \longrightarrow \mathbb{K}^2$ definida por

$$T(x, y, z) = (2x - z, -x + 3y + z).$$

Sean $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ base ordenada de \mathbb{K}^3 y $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (1, 0)\}$ una base ordenada de \mathbb{K}^2 .

Calculemos $[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

Debemos encontrar a_{ij} tales que

$$T(1, 1, 1) = a_{11}(1, 1) + a_{21}(1, 0)$$

$$T(0, 1, 1) = a_{12}(1, 1) + a_{22}(1, 0)$$

$$T(0, 0, 1) = a_{13}(1, 1) + a_{23}(1, 0).$$

Explícitamente, debemos encontrar a_{ij} tales que

$$\begin{aligned}(1, 3) &= a_{11}(1, 1) + a_{21}(1, 0) \\ (-1, 4) &= a_{12}(1, 1) + a_{22}(1, 0) \\ (-1, 1) &= a_{13}(1, 1) + a_{23}(1, 0).\end{aligned}$$

Es decir, debemos resolver el sistema

$$(b_1, b_2) = a(1, 1) + b(1, 0) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a + b = b_1 \\ a = b_2 \end{cases}$$

La solución es $a = b_2$ y $b = b_1 - b_2$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}(1, 3) &= 3(1, 1) + (-2)(1, 0) \\ (-1, 4) &= 4(1, 1) + (-5)(1, 0) \\ (-1, 1) &= 1(1, 1) + (-2)(1, 0).\end{aligned}$$

Es decir,

$$[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -2 & -5 & -2 \end{bmatrix}.$$

Proposición (Proposición 5.6.3 de las Notas)

Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita con bases ordenadas $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_m\}$, respectivamente.

Si $T : V \longrightarrow W$ es una transformación lineal, entonces

$$[T(v)]_{\mathcal{B}'} = [T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} [v]_{\mathcal{B}}$$

para todo $v \in V$.

En palabras, el vector de coordenadas de $T(v)$ en la base \mathcal{B}' es igual a multiplicar la matriz de T en las bases \mathcal{B} y \mathcal{B}' por el vector de coordenadas de v en la base \mathcal{B} .

La demostración se puede ver en el apunte de clase.

La demostración sigue los mismos pasos del siguiente ejemplo pero escribiendo todo en forma más abstracta: con letras y subíndices en lugar de números concretos.

Ejemplo

Sean las bases ordenadas de \mathbb{R}^3

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, 0)\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{e_1, e_2, e_3\}.$$

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida

$$T(x, y, z) = (x - 2y + z, x + y, -x - y + z),$$

y sea $v \in \mathbb{R}^3$. Veamos que

$$[T(v)]_{\mathcal{B}'} = [T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}}$$

Solución

Primero debemos calcular (1) $[T(v)]_{\mathcal{B}'}$, (2) $[v]_{\mathcal{B}}$ y (3) $[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$.

Si $v = (x_1, x_2, x_3)$, veamos como se escribe b en la base \mathcal{B} .

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, x_3) &= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= (x_1, x_2, x_3) = x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0) \\&= x_1(1, 0, -1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(1, 1, 0)\end{aligned}$$

Ejemplo

Sean las bases ordenadas de \mathbb{R}^3

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, 0)\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{e_1, e_2, e_3\}.$$

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida

$$T(x, y, z) = (x - 2y + z, x + y, -x - y + z),$$

y sea $v = (-4, 4, 6)$. Veamos que

$$[T(v)]_{\mathcal{B}'} = [T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}}$$

Solución

Primero debemos calcular (1) $[T(v)]_{\mathcal{B}'}$, (2) $[v]_{\mathcal{B}}$ y (3) $[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$.

Aplicando la definición de T , calculamos

$$T(-4, 4, 6) = (-6, 0, 6) = -6(1, 0, 0) + 0(0, 1, 0) + 6(0, 0, 1).$$

Es decir

$$[T(v)]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Por otro lado

$$(-4, 4, 6) = -7(1, 0, -1) + 1(0, 1, -1) + 3(1, 1, 0),$$

Luego

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -7 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

$$\begin{aligned}\text{Finalmente, } T(1, 0, -1) &= (0, 1, -2) \\ T(0, 1, -1) &= (-3, 1, -2) \\ T(1, 1, 0) &= (-1, 2, -2)\end{aligned}$$

Luego

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

\Rightarrow

$$\begin{aligned}[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}} &= \begin{bmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} \\ &= [T(v)]_{\mathcal{B}'}.\end{aligned}$$



¿Por qué se cumple esta “mágica” igualdad?

Escribiendo v como combinación lineal de la base \mathcal{B}' y luego calculando $T(v)$ se devela el “misterio”. En nuestro caso

$$v = (-4, 4, 6) = -7(1, 0, -1) + 1(0, 1, -1) + 3(1, 1, 0),$$

Luego,

$$\begin{aligned} T(-4, 4, 6) &= T(-7(1, 0, -1) + 1(0, 1, -1) + 3(1, 1, 0)) \\ &= -7T(1, 0, -1) + 1T(0, 1, -1) + 3T(1, 1, 0) \\ &= -7(0, 1, 2) + 1(-3, 1, -2) + 3(-1, 2, -2) \\ &= \begin{bmatrix} -7 \cdot 0 & + & 1 \cdot (-3) & + & 3 \cdot (-1) \\ -7 \cdot 1 & + & 1 \cdot 1 & + & 3 \cdot 2 \\ -7 \cdot 2 & + & 1 \cdot (-2) & + & 3 \cdot (-2) \end{bmatrix} = [T(v)]_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

Repasando

$$[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix},$$

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -7 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$[T(v)]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} -7 \cdot 0 & + & 1 \cdot (-3) & + & 3 \cdot (-1) \\ -7 \cdot 1 & + & 1 \cdot 1 & + & 3 \cdot 2 \\ -7 \cdot 2 & + & 1 \cdot (-2) & + & 3 \cdot (-2) \end{bmatrix}$$

Es decir

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix}}_{[T]_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}} \underbrace{\begin{bmatrix} -7 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_{[v]_{\mathcal{B}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -7 \cdot 0 & + & 1 \cdot (-3) & + & 3 \cdot (-1) \\ -7 \cdot 1 & + & 1 \cdot 1 & + & 3 \cdot 2 \\ -7 \cdot 2 & + & 1 \cdot (-2) & + & 3 \cdot (-2) \end{bmatrix}}_{[T(v)]_{\mathcal{B}'}}$$