

Matemática Discreta I

Clase 13 - Máximo común divisor (2)

FAMAF / UNC

3 de mayo de 2022

Algoritmo de Euclides

Para calcular el mcd de enteros a y b , con $b > 0$, definimos q_i y r_i recursivamente de la siguiente manera: $r_0 = a$, $r_1 = b$, y

$$(e_1) \quad r_0 = r_1 q_1 + r_2 \quad (0 < r_2 < r_1)$$

$$(e_2) \quad r_1 = r_2 q_2 + r_3 \quad (0 < r_3 < r_2)$$

$$(e_3) \quad r_2 = r_3 q_3 + r_4 \quad (0 < r_4 < r_3)$$

...

$$(e_i) \quad r_{i-1} = r_i q_i + r_{i+1} \quad (0 < r_{i+1} < r_i)$$

...

$$(e_{k-1}) \quad r_{k-2} = r_{k-1} q_{k-1} + r_k \quad (0 < r_k < r_{k-1})$$

$$(e_k) \quad r_{k-1} = r_k q_k + 0,$$

Entonces $r_k = \text{mcd}(a, b)$ (Se usa en filmina 6)

- El proceso se detiene en el primer resto r_i igual a 0.
- El proceso debe detenerse, porque cada resto no nulo es positivo y estrictamente menor que el anterior.
- Este procedimiento es conocido como el *algoritmo de Euclides*.

Teorema

Sean a y b enteros con $b > 0$, entonces el máximo común divisor es el último resto no nulo obtenido en el algoritmo de Euclides (r_k de la filmina anterior).

Idea de la demostración

$r_{i-1} = r_i q_i + r_{i+1} \Rightarrow \text{mcd}(r_{i-1}, r_i) = \text{mcd}(r_i, r_{i+1})$. Luego,

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(r_0, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2) = \dots$$

$$\dots = \text{mcd}(r_{k-1}, r_k) = \text{mcd}(r_k, 0) = r_k. \quad \square$$

Ejemplifiquemos el algoritmo de Euclides.

Ejemplo

Encuentre el mcd de 2406 y 654.

Solución

Tenemos

$$2406 = 654 \cdot 3 + 444, \quad \text{entonces} \quad (2406, 654) = (654, 444)$$

$$654 = 444 \cdot 1 + 210, \quad \text{entonces} \quad (654, 444) = (444, 210)$$

$$444 = 210 \cdot 2 + 24, \quad \text{entonces} \quad (444, 210) = (210, 24)$$

$$210 = 24 \cdot 8 + 18, \quad \text{entonces} \quad (210, 24) = (24, 18)$$

$$24 = 18 \cdot 1 + 6, \quad \text{entonces} \quad (24, 18) = (18, 6)$$

$$18 = 6 \cdot 3 + 0 \quad \text{entonces} \quad (18, 6) = (6, 0) = 6$$

Por lo tanto $(2406, 654) = 6$.

- El algoritmo de Euclides es fácilmente implementable en un lenguaje de programación.
- A continuación una versión del mismo en pseudocódigo (estilo Python).

Algoritmo de Euclides

```
# pre: a y b son números positivos
# post: obtenemos d = mcd(a,b)
i, j = a, b
while j != 0:
    # invariante: mcd(a, b) = mcd(i, j)
    resto = i % j # i = q * j + resto
    i, j = j, resto
d = i
```

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, uno de ellos no nulo, entonces

$$d = sa + tb.$$

Calculemos s y t . En el caso que $b > 0$, la ecuación (e_i) de la fila 2 es:

$$r_{i-1} = r_i q_i + r_{i+1}$$

Esto implica que

$$r_{i+1} = r_{i-1} - r_i q_i.$$

Lo cual nos dice que r_i puede ser calculado usando r_{i-1} y r_{i-2} .

r_k puede ser calculado con r_{k-1} y r_{k-2}

r_{k-1} puede ser calculado con r_{k-2} y r_{k-3}

...

r_3 puede ser calculado con r_2 y r_1

r_2 puede ser calculado con $r_1 = b$ y $r_0 = a$

Ejemplo

Encuentre d , el mcd de 174 y 72 y escribir $d = s \cdot 174 + t \cdot 72$.

Solución

$$174 = 72 \cdot 2 + 30, \quad \Rightarrow \quad 30 = 174 - 72 \cdot 2 \quad (1)$$

$$72 = 30 \cdot 2 + 12, \quad \Rightarrow \quad 12 = 72 - 30 \cdot 2 \quad (2)$$

$$30 = 12 \cdot 2 + 6, \quad \Rightarrow \quad 6 = 30 - 12 \cdot 2 \quad (3)$$

$$12 = 6 \cdot 2 + 0.$$

Por lo tanto, $(174, 72) = 6$ y,

$$6 \stackrel{(3)}{=} 30 - 12 \cdot 2$$

$$\stackrel{(2)}{=} 30 - (72 - 30 \cdot 2) \cdot 2$$

$$= 5 \cdot 30 + (-2) \cdot 72$$

$$\stackrel{(1)}{=} 5 \cdot (174 - 72 \cdot 2) + (-2) \cdot 72$$

$$= 5 \cdot 174 + (-12) \cdot 72$$

Concluyendo:

- $(174, 72) = 6$ y,
- $6 = 5 \cdot 174 + (-12) \cdot 72$.



Ejemplo

Encuentre d , el mcd de 470 y 55 y escribir $d = s \cdot 470 + t \cdot 55$.

Solución

Por el algoritmo de Euclides obtenemos

$$470 = 55 \cdot 8 + 30 \Rightarrow 30 = 470 + (-8) \cdot 55 \quad (1)$$

$$55 = 30 \cdot 1 + 25 \Rightarrow 25 = 55 + (-1) \cdot 30 \quad (2)$$

$$30 = 25 \cdot 1 + 5 \Rightarrow 5 = 30 + (-1) \cdot 25 \quad (3)$$

$$25 = 5 \cdot 5 + 0.$$

Luego

$$5 \stackrel{(3)}{=} 30 + (-1) \cdot 25$$

$$\stackrel{(2)}{=} 30 + (-1) \cdot (55 + (-1) \cdot 30) = 2 \cdot 30 + (-1) \cdot 55$$

$$\stackrel{(1)}{=} 2 \cdot (470 + (-8) \cdot 55) + (-1) \cdot 55 = 2 \cdot 470 + (-17) \cdot 55 \quad \square$$

Mínimo común múltiplo

Definición

Si a y b son enteros decimos que un entero no negativo m es el *mínimo común múltiplo*, o *mcm*, de a y b si

- a) $a|m$ y $b|m$;
- b) si $a|n$ y $b|n$ entonces $m|n$.

- La condición (a) nos dice que m es múltiplo común de a y b .
- La condición (b) nos dice que cualquier otro múltiplo de a y b también debe ser múltiplo de m .

Ejemplo

Halleemos el mínimo común múltiplo entre 8 y 14.

Solución

Escribamos los múltiplos de ambos números y busquemos el menor común a ambos.

Los primeros múltiplos de 8 son: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ...

Los primeros múltiplos de 14 son: 14, 28, 42, 56, 72, ...

Luego se tiene $\text{mcm}(8, 14) = 56$. Nos faltaría comprobar que cualquier múltiplo de 8 y 14 es múltiplo de 56, pero eso se deduce fácilmente de los resultados que veremos a continuación.

Teorema

Sean a y b enteros no nulos, entonces

$$\text{mcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{mcd}(a, b)}.$$

En particular este resultado implica que si a y b son enteros coprimos, entonces $\text{mcm}(a, b) = ab$.

Ejemplo

Encontrar el mcm de 8 y 14.

Solución

Es claro que $2 = \text{mcd}(8, 14)$, luego $\text{mcm}(8, 14) = 8 \cdot 14 / 2 = 56$.

Ejercicio

Demostrar que si a , b y n son enteros no nulos, entonces $\text{mcd}(na, nb) = n \text{mcd}(a, b)$.

Solución

Sea $d = (a, b)$, debemos probar que $nd = (na, nb)$.

a) $d|a$ y $d|b$;

b) si $c|a$ y $c|b$ entonces $c|d$.

\Downarrow

a') $nd|na$ y $nd|nb$;

b') si $c|na$ y $c|nb$ entonces $c|nd$.

a')

Por a), $a = d \cdot q_1$, $b = d \cdot q_2$, luego

$$na = d \cdot nq_1, \quad nb = d \cdot nq_2,$$

es decir

$$nd|na, \quad nd|nb.$$

b')

Sea c tal que $c|na$ y $c|nb$.

Ahora bien

$$d = ra + sb \Rightarrow nd = s(na) + t(nb),$$

Luego,

$$c|na, c|nb \Rightarrow c|s(na) + t(nb) = nd.$$

Esto prueba b').

