EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

QCM

1. Tous les facteurs suivants inhibent le réflexe ocytocique chez la mère, sauf un. Cocher l'intrus.

a	La vue de son bébé
b	La douleur physique
c	Le manque de confiance en soi
d	La crise d'anxiété

2. Nouveau-né GG, sexe masculin, est âgé de 5 jours. Il vit avec sa mère à Grand Yapo. La mère réalise les soins du cordon avec une décoction de plante traditionnelle. L'examen somatique de GG est normal. La réalité personnelle de GG comporte :

a	4 données de dépendance
b	5 données de dépendance
c	3 données de dépendance
d	2 données de dépendance

3. L'échographie réalisée au premier trimestre de la grossesse vise les objectifs suivants sauf un. Cocher l'intrus.

a	Confirmer la grossesse
b	Estimer le risque trisomie
c	Apprécier l'activité cardiaque de l'embryon
d	Rechercher des malformations

4. Les signes suivants sont ceux du kwashiorkor sauf un. Lequel ?

a	Enfant grognon
b	Ulcération et desquamation
c	Alopécie
d	Bouffissure du visage

5. Durant la prise en charge de l'enfant malnutri, je surveille tous les paramètres suivants sauf un. Cocher ce paramètre.

a	Le retour de l'appétit
b	La prise de poids
c	La guérison des lésions
d	La régression des œdèmes

6. Les cellules qui produisent le lait maternel sont appelées :

a	Cellules souches
b	Cellule épidermique
c	Cellules épithéliales
d	Cellules myoépithéliales

7. BH est âgé de 2 ans et pèse 12 kg. Il est correctement nourri. Sa surface corporelle est estimée à :

a	0,2 m²
b	0,4 m²
c	0,5 m²
d	0,6 m²

8. L'infection bactérienne du nouveau-né précoce survient entre :

a	0 et 7 jours
b	7 et 8 jours
c	8 et 16 jours
d	16 et 28 jours

9. Vous collaborez à la réalisation des examens suivants en cas de fièvre aiguë, sauf un, lequel ?

a	Hémoculture
b	ECBU
c	Analyse LCR
d	Sérodiagnostic de Widal et Félix

10. Un enfant qui fait de la fièvre avec une bonne tolérance présente :

a	Une conscience altérée
b	Des marbrures
c	Un faciès vultueux
d	Un teint grisâtre

11. Une femme rhésus négatif accouche d'un enfant rhésus positif. Elle n'a pas eu le sérum anti-D. Dans une telle situation, le nouveau-né :

a	Doit téter les seins comme les autres enfants
b	Ne doit pas téter les seins comme les autres enfants
c	Doit être nourri au biberon
d	Doit recevoir le sérum antitétanique en sous-cutané

12. Les facteurs de risque de survenue des convulsions, liés à l'enfant, sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Faible poids de naissance
b	Céphalhématome
c	Traumatisme crânien
d	Malnutrition

13. Les rôles de collaboration dans la prise en charge des convulsions sont :

a	Administrer le diazépam
b	Récupérer des résultats de laboratoire
c	Prendre une voie veineuse
d	Aider la mère à allaiter

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

14. ML est âgé de 36 mois, sa mère l'amène aux urgences pour une diarrhée glaireuse. Le germe probable à l'origine de cette diarrhée est :

a	Shigelles
b	Escherichia coli
c	Vibrion cholérique
d	Rotavirus

15. La mère de JK n'a pas respecté la prescription médicale et il présente, 4 jours plus tard, un poids de 8 kg, les yeux enfoncés, la bouche sèche et des signes évidents de déshydratation. Quelle est la quantité de SRO à administrer ?

a	500 ml
b	400 ml
c	600 ml
d	700 ml

16. La diarrhée aiguë concerne l'émission d'au moins 3 selles liquides par 24 heures depuis moins de :

a	21 jours
b	14 jours
c	10 jours
d	8 jours

17. Le plan de traitement des signes sévères de déshydratation est le :

a	Plan A
b	Plan B
c	Plan C
d	Plan D

18. DG est incapable de nouer les lacets de sa paire de tennis mais s'habille seul et raconte des petites histoires. Je conclus que DG est âgé de :

a	2 ans
b	3 ans
c	4 ans
d	5 ans

19. Les propositions suivantes concernent les signes d'un enfant souffrant de marasme. Cochez la proposition qui est retrouvée au stade de début de cette maladie.

a	Fonte graisseuse et musculaire
b	Retard pondéral inférieur à 60 % du poids idéal théorique
c	Affamé et porte le doigt à la bouche
d	Alopécie avec le reste des cheveux normaux non décolorés

20. Les propositions suivantes sont relatives à la bonne pratique de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance sauf une. Cocher cette proposition.

a	Essuyer l'enfant
b	Vérifier la respiration
c	Porter un bonnet
d	Pincer le mamelon

21. Les séquelles neurologiques et neurosensorielles au cours du paludisme sont les suivantes sauf une, laquelle ?

a	Paralysie
b	Troubles du tonus
c	Myosite
d	Hypoacousie

22. Le paludisme grave est causé par l'espèce plasmodiale suivante :

a	Vivax
b	Ovale
c	Knowlésie
d	Falciparum

23. Les facteurs de mauvais pronostic au cours de la méningite purulente sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Âge de moins de 5 ans
b	Virulence du germe
c	Malnutrition
d	Retard de diagnostic et prise en charge

24. Les principaux virus responsables des infections respiratoires aiguës sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Virus para influenzae
b	Herpès simplex virus
c	Rhinovirus
d	Virus respiratoire syncytial

25. Ces affirmations concernant la bronchiolite sont justes sauf une. Laquelle ?

a	Causée par le virus respiratoire syncytial
b	Respiration sifflante
c	Fièvre et rhume
d	Plus fréquent après 2 ans

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

26. Dans la prise en charge de la bronchiolite, l'agent de santé a pour rôle propre :

a	Conseils à la mère sur l'hygiène
b	Montrer la technique de la DRP à la mère
c	Accompagner l'enfant en ORL
d	Administrer un antipyrétique

27. Les infections respiratoires basses sont les suivantes sauf une, laquelle ?

a	Bronchiolite aiguë
b	Sinusite maxillaire aiguë
c	Laryngite aiguë
d	Bronchite aiguë

28. L'administration de zinc comprimé dans le traitement de la diarrhée chez le nourrisson de moins de 6 mois est de :

a	10 mg/j pendant 7 jours
b	15 mg/j pendant 10 jours
c	10 mg/j pendant 5 jours
d	15 mg/j pendant 7 jours

29. La quantité de SRO à administrer chez un nourrisson, après chaque selle molle dans le plan A de traitement, est :

a	50-100 ml
b	25-50 ml
c	100-200 ml
d	Autant qu'il en voudra

30. Les soins propres dans la prise en charge des vomissements chez l'enfant sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Nettoyer l'enfant
b	Aider à alimenter l'enfant
c	Administrer du Vogalène
d	Surveiller l'enfant

QCD

31. La méningite est l'inflammation aiguë des méninges par des bactéries, responsable d'une suppuration donnant au liquide céphalorachidien un aspect clair.

a	b
Vrai	Faux

32. L'enfant expatrié, venant pour la première fois dans une zone endémique, est à risque de faire le paludisme.

a	b
Vrai	Faux

33. Un encombrement de l'arbre respiratoire au niveau de la zone de conduction se manifeste par une perturbation au niveau des échanges gazeux.

a	b
Vrai	Faux

34. Le paracétamol est administré à la posologie de 15 mg par kilogramme toutes les 6 heures si fièvre.

a	b
Vrai	Faux

35. L'anorexie du nourrisson est un trouble du comportement alimentaire consécutif à une cause organique.

a	b
Vrai	Faux

36. Le sevrage précoce est un facteur favorisant la survenue de l'anémie.

a	b
Vrai	Faux

37. La pose d'une transfusion sanguine est un rôle de collaboration.

a	b
Vrai	Faux

38. Le nourrisson allaité qui émet 3 à 4 selles par jour souffre d'une diarrhée aiguë.

a	b
Vrai	Faux

39. Une fièvre qui évolue depuis 15 jours est une fièvre prolongée.

a	b
Vrai	Faux

40. Laisser l'enfant avec sa mère 10 heures par jour est l'une des conditions de l'initiative Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB).

a	b
Vrai	Faux

41. L'électrophorèse de l'hémoglobine fait partie du bilan prénatal recommandé.

a	b
Vrai	Faux

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

42. Le nourrisson allaité qui émet 3 à 4 selles par jour souffre d'une diarrhée aiguë.

a	b
Vrai	Faux

43. La lèvre inférieure du bébé éversée et l'aréole peu visible en haut est un critère de bon positionnement au sein.

a	b
Vrai	Faux

44. Le surfactant est un film tensioactif sécrété par les cellules pneumocytes I des poumons.

a	b
Vrai	Faux

45. L'entérocolite est un problème lié à la prématurité.

a	b
Vrai	Faux

46. Le manque de soutien psychologique de la mère est un facteur de déclin de l'allaitement exclusif.

a	b
Vrai	Faux

47. L'enveloppement humide est un rôle propre de l'agent de santé dans la prise en charge de la fièvre chez l'enfant.

a	b
Vrai	Faux

48. Des crises convulsives subintrantes sans reprise de la conscience intercritique réalisent un état de mal convulsif.

a	b
Vrai	Faux

49. L'hyperparasitémie supérieure à 4 % chez le sujet immun est un critère clinique de gravité du paludisme grave.

a	b
Vrai	Faux

50. JL a 4 ans, il présente seulement une fièvre et 2 vomissements ce jour. Le TDR paludisme réalisé est positif. Le traitement à administrer est l'artéméther injectable.

a	b
Vrai	Faux

51. Le stress et le manque d'affection favorisent les vomissements du nourrisson.

a	b
Vrai	Faux

52. Le temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes est un signe de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

53. Les téguments chauds et érythrosiques sont des signes de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

54. Le syndrome extrapyramidal qui survient chez l'enfant après administration de l'antiémétisant se traite avec du diazépam.

a	b
Vrai	Faux

55. Le nourrisson présentant une diarrhée aiguë sans signe de déshydratation boit avec avidité.

a	b
Vrai	Faux

56. L'Haemophilus influenzae est l'un des principaux germes responsables de la méningite bactérienne.

a	b
Vrai	Faux

57. Devant une fièvre aiguë, vous collaborez avec le médecin à la réalisation d'un tubage gastrique BK.

a	b
Vrai	Faux

58. La goutte épaisse et le frottis sanguin réalisés au lit du malade apportent la confirmation du paludisme à Plasmodium falciparum.

a	b
Vrai	Faux

59. La réaction fébrile postvaccinale est une étiologie des fièvres aiguës.

a	b
Vrai	Faux

VERSION D

MINISTÈRE DE LA SANTÉ RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ

ANTENNE DE DALOA

EXAMEN BLANC DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (ÈRE)

Session du 19 au 20 septembre 2026

ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

QCD

Répondre aux questions Vrai = A ou Faux = B, sachant qu'une bonne réponse = 1 point, une mauvaise réponse = -1 et une absence de réponse = 0 point.

1. Le superviseur ayant le style autocratique cherche à tout comprendre. A B

2. L'intervention en approche épidémiologique repose sur le contrôle, l'éradication, l'élimination et la maîtrise de la maladie. A B

3. Le processus d'évacuation des ordures ménagères comprend le stockage et le ramassage. A B

4. Le taux de létalité permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades. A B

5. La participation communautaire a été prônée en 1985 à Bamako pour garantir la mise en œuvre et la pérennisation d'un système de financement communautaire. A B

6. L'absence d'humidité dans le logement est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins physiologiques. A B

7. Le bassin de desserte correspond à une zone située dans un rayon de 15 km autour d'un centre de santé. A B

8. Le district est l'unité sanitaire décentralisée regroupant tous les services sanitaires publics tant en milieu urbain que rural. A B

9. Les doses de vaccins perdues pour que la vaccination ait lieu sont considérées comme des doses sacrifiées. A B

10. Plus le taux de perte est élevé, moins le facteur de perte est élevé. A B

VERSION D

11. Dans les cas de poliomyélite à virus de type sauvage, l'excrétion virale dans les selles augmente au-delà de deux semaines après le début de la paralysie. A B

12. Le sujet d'intérêt en épidémiologie est le malade. A B

13. En matière de vaccination, l'intervalle minimum existe. A B

14. Les centres antituberculeux sont situés au niveau périphérique du versant administratif du PNLT. A B

15. Le seuil d'alerte est le niveau à partir duquel la riposte doit être déclenchée face à une menace d'épidémie. A B

16. L'accessibilité aux soins consiste à mettre les soins de santé à proximité des populations et à un prix non exorbitant. A B

17. Le non-respect de la politique du flacon entamé est un facteur évitable de perte de vaccins. A B

18. En Côte d'Ivoire, la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes curatives. A B

19. On peut administrer le VPI à tous les enfants ayant un âge compris entre 0 et 23 mois sans exception. A B

QCM

Cochez les bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse = 1 point et une mauvaise réponse = 0 point.

20. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui constituent des différentes catastrophes naturelles :

A. La guerre
B. Les cyclones
C. Les tremblements de terre
D. Le tsunami
E. Les graves accidents de circulation
F. Les génocides

21. Les vaccins du PEV qui sont sensibles à la lumière sont :

A. BCG
B. RR
C. VAA
D. Penta

VERSION D

22. La liste ci-dessous contient des dates et des événements relatifs à la politique des SSP :

1. 1997	a. Initiative de Bamako
2. 06 au 12/09/1978	b. Conférence d'Alma-Ata
3. 1991	c. Lancement officiel des SSP en C.I.
4. 1993	d. Mise en œuvre effective des SSP en C.I.
5. 1987	e. Définition des niveaux d'application des SSP
6. 1985	f. Réunion du comité d'experts africains à Brazzaville

Trouvez les bonnes combinaisons entre les dates et les événements.

A. (1, f) ; (2, b) ; (3, c) ; (4, d) ; (5, a) ; (6, e)
B. (1, f) ; (2, c) ; (3, b) ; (4, a) ; (5, d) ; (6, e)
C. (1, e) ; (2, b) ; (3, c) ; (4, d) ; (5, a) ; (6, f)
D. (1, c) ; (2, f) ; (3, a) ; (4, b) ; (5, e) ; (6, d)
E. (1, d) ; (2, e) ; (3, f) ; (4, c) ; (5, b) ; (6, a)

23. Quel est l'ordre normal d'administration de ces groupes d'antigènes conformément au calendrier de vaccination du PEV ivoirien ?

1. Penta 3 + VPO-3 + PCV-13-3 + VPI
2. Penta 2 + VPO-2 + PCV-13-2 + Rota 2
3. VPO-0 + BCG + DN-HepB
4. Penta 1 + VPO-1 + PCV13-1 + Rota 1
5. RR + VAA + Men A

A. (1,2,3,4,5) B. (3,4,2,1,5) C. (3,4,1,2,5) D. (4,3,2,1,5)

24. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles qui sont sous surveillance en Côte d'Ivoire.

A. Le choléra
B. Le paludisme
C. La fièvre hémorragique virale
D. La dracunculose
E. Les infections respiratoires aiguës
F. Les infections urinaires

VERSION D

25. Parmi les critères suivants, indiquez ceux qui permettent de sélectionner un problème prioritaire de santé :

A. L'ampleur du problème
B. La gravité du problème
C. La population totale de la localité
D. Le niveau d'instruction des populations
E. La vulnérabilité du problème
F. La durée des interventions

26. Le nombre de doses et la voie d'administration correcte du vaccin Rotarix est :

A. Deux doses de 0,5 ml en IM
B. Trois doses de 0,5 ml en IM
C. Deux doses de 2 ml par voie orale
D. Trois doses de 2 ml par voie orale

27. Parmi les problèmes suivants causés par l'abus des drogues, indiquez ceux qui sont d'ordre sanitaire :

A. L'absentéisme scolaire
B. L'hallucination
C. Les accidents de la voie publique
D. Le délire
E. Le suicide
F. L'asthénie

28. Parmi les propositions suivantes, cocher celles qui sont les missions assignées à un district sanitaire :

A. Évaluation des agents de santé
B. Promotion des soins de santé primaires
C. Suivi et évaluation des activités
D. Coordination des activités sanitaires

Entourer la bonne réponse

VERSION D

29. Selon le rythme des activités de monitorage en Côte d'Ivoire, précisez les périodes de monitorage.

A. Décembre 2023 à mai 2024

B. Janvier 2023 à juin 2023

C. Juin 2024 à novembre 2024

D. Juillet 2023 à décembre 2023

30. Parmi les antigènes ci-dessous, cochez ceux qui ont pour site d'administration la cuisse.

A. BCG ; Td ; PCV 13

B. VPI ; Rota

C. DN hépatite ; VPI ; Men A ; VAP

D. VPO ; HPV ; RR

31. Le système d'évacuation des excréta le plus couramment utilisé sans entraînement des matières fécales est :

A. La fosse septique

B. La fosse d'aisance

C. La latrine à fosse

D. Le réseau d'égouts

32. Quelle méthode permet de lutter contre les moustiques adultes ?

A. Combler les flaques d'eau

B. Curer les caniveaux

C. Dormir sous une moustiquaire imprégnée

D. Vider les récipients contenant de l'eau

33. Parmi les facteurs susceptibles d'influencer le changement social de comportement ci-dessous, indiquer ceux qui sont d'ordre externe.

A. La perception

B. Le milieu social

C. La culture

D. Les caractéristiques personnelles et psychologiques

VERSION D

34. En cas de paralysie flasque aiguë, un prélèvement des selles se fait :

A. Entre J10 et J14

B. Entre J14 et J60

C. Entre J61 et 06 mois

D. Après 06 mois

35. Une endémie est un phénomène :

A. Limité dans le temps et limité dans l'espace

B. Illimité dans le temps et illimité dans l'espace

C. Limité dans le temps et illimité dans l'espace

D. Illimité dans le temps et limité dans l'espace

36. Parmi ces antigènes suivants, lequel est vivant atténué ?

A. Td

B. VPO

C. VPI

37. La MOBSOC a pour but :

A. Promouvoir la santé communautaire

B. Changer une situation sociale et communautaire en un sens favorable à la société selon ses valeurs et motivations

C. Inciter la communauté à se mobiliser et à mobiliser leurs propres moyens pour remédier aux problèmes

38. Parmi les actions suivantes, une seule permet d'améliorer la saveur et l'odeur de l'eau :

A. L'ébullition

B. Usage de charbon de bois

C. La sédimentation

D. La filtration

E. L'ionisation

VERSION D

ÉTUDE DE CAS

Après votre formation, vous êtes affecté(e) au centre de santé de Sinikosson où travaillent deux infirmiers et une sage-femme diplômés d'État.

La population totale de ce centre de santé a été estimée à 5 000 habitants au 31/12/2019 et à 5 100 habitants au 1er/01/2021.

Pendant l'année 2021, les données sanitaires suivantes ont été relevées dans ce village :

- 25 naissances enregistrées dont 04 mort-nés ;

- 105 cas de paludisme et 35 cas de diarrhées ;

- 03 décès de femmes enceintes dont 01 à la suite d'une chute sur la route du champ ;

- 06 femmes décédées dont 04 après 5 semaines de suites de couches et 02 après 7 semaines de suites de couches ;

Par ailleurs, le dispensaire et la maternité disposent de 18 lits et le ratio personnel infirmier/lit du dispensaire est de 0,2.

À partir du texte ci-dessus, répondre aux questions ci-dessous.

QUESTIONS

39. Quel est le taux d'accroissement annuel de la population de Sinikosson ?

A. 0,02 %
B. 2 %
C. 0,2 %

40. Quelle est la population totale en 2021 ?

A. 5100
B. 5200
C. 5202

41. Quelle est la population moyenne en 2021 ?

A. 5151
B. 5150
C. 5050
D. 5253

42. Quel est le nombre de femmes en âge de reproduction en 2021 ?

A. 1020
B. 1030
C. 1041

VERSION D

43. Quel est le nombre des enfants de 0 à 23 mois en 2021 ?

A. 352
B. 256
C. 355
D. 445

44. Calculez le besoin théorique mensuel de RR pour vacciner ces enfants de 0 à 23 mois.

A. 65 doses
B. 66 doses
C. 70 doses
D. 80 doses
E. 64 doses

45. Calculez le nombre de lits disponibles à la maternité.

A. 6 lits
B. 10 lits
C. 8 lits
D. 12 lits