EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

QUESTIONNAIRE A

Durée = 1 h 30 min. Traiter toutes les 40 questions. Total des points = 60.

QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD) : total des points = 15

Pour les questions numérotées de 1 à 15, noircir au stylo noir ou bleu la case A si la proposition vous paraît vraie ou la case B si la proposition vous paraît fausse, sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point, une réponse incorrecte vaut -1 point et aucune réponse vaut 0 point.

1. Le petit bassin osseux maternel comprend 3 parties qui sont : le détroit supérieur, le détroit moyen et le détroit inférieur.

a. Vrai
b. Faux

2. L'ovogonie est un gamète femelle qui a 2 x 22 chromosomes.

a. Vrai
b. Faux

3. Le repère de la présentation de la face est le menton.

a. Vrai
b. Faux

4. Après la naissance, les 1ères règles permettent de dater la puberté.

a. Vrai
b. Faux

5. Au cours de la grossesse normale, le poids de la gestante peut augmenter.

a. Vrai
b. Faux

6. Les modifications physiologiques de l'organisme maternel au cours de la grossesse débutent avant la fécondation.

a. Vrai
b. Faux

6. Les modifications physiologiques de l'organisme maternel au cours de la grossesse débutent avant la fécondation.

b. Faux

7. Les 1ères règles s'appellent les ménarches.

a. Vrai
b. Faux

8. La prescription de fer est interdite au 1er trimestre de grossesse.

a. Vrai
b. Faux

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

a. Vrai
b. Faux

9. La sérologie de la toxoplasmose positive à Ig M témoigne d'une atteinte toxoplasmique.

a. Vrai
b. Faux

10. Au premier trimestre de grossesse, la présence des Ig G durant la sérologie de la rubéole signe une primo-infection de la rubéole qui est très grave.

a. Vrai
b. Faux

11. Au cours de la grossesse, l'association d'une TA égale à 15/10 cmHg, d'une protéinurie à 3 croix et d'une crise convulsive signe une pré-éclampsie très sévère.

a. Vrai
b. Faux

12. On parle d'hydramnios quand la quantité de liquide amniotique dépasse 2 litres dans les derniers mois de grossesse.

a. Vrai
b. Faux

13. La survenue d'agitation, de confusion ou de délire durant un paludisme à Plasmodium falciparum au cours de la grossesse traduit automatiquement un paludisme grave.

a. Vrai
b. Faux

14. Au cours de la grossesse, un taux d'hémoglobine égal à 10,2 g/100 ml avec un CCMH = 26 picogrammes et un VGM = 70 μ^3 évoquent une anémie hypochrome microcytaire.

a. Vrai
b. Faux

15. Il est recommandé de donner une supplémentation de fer à une gestante ayant une hémoglobinose AS à partir du 2ème trimestre de grossesse pour éviter une anémie ferriprive.

anémie ferriprive.
a. Vrai
b. Faux

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM) : total des points = 45

Pour répondre à ces questions, noircir, au stylo noir ou bleu, la case de l'item correspondant à la bonne réponse, ou les cases des items correspondant aux bonnes réponses sachant que : un item correct vaut +1 point, un item incorrect vaut 0 point et une non-réponse vaut 0 point.

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

16. Parmi les signes suivants, relever celui ou ceux qui caractérise(nt) le placenta prævia marginal hémorragique dans sa forme typique :

a. Métrorragies indolores faites de sang rouge au 3ème trimestre de grossesse
b. Métrorragies faites de sang rouge au 3ème trimestre de grossesse avec des contractions utérines
c. Métrorragies indolores faites de sang noir au 3ème trimestre de grossesse
d. Petit côté des membranes mesurant moins de 10 cm
e. Petit côté des membranes mesurant moins de 9 cm
f. Métrorragies faites de sang rouge vif au 3ème trimestre de grossesse avec des contractions utérines

17. Relever la ou les manœuvre(s) à exécuter pour extraire la tête dernière retenue dans l'excavation pelvienne dans l'accouchement du siège.

a. Attitude de VERMELIN
b. Petite extraction du siège
c. Grande extraction du siège
d. Manœuvre de BRACHT
e. Manœuvre de LOVSET
f. Manœuvre de MAURICEAU

18. Le début du cycle menstruel commence toujours :

a. Au 1er jour de survenue des règles
b. Au début des règles
c. À la fin des règles
d. À l'ovulation
e. Au dernier jour précédant les règles
f. Au 1er jour des ménarches

19. Dans la présentation de la face, on sent au TV toujours :

a. La grande fontanelle du fœtus
b. La petite fontanelle du fœtus
c. Le front du fœtus
d. Le menton du fœtus
e. Les yeux du fœtus
f. La bouche du fœtus

20. Après la réfection de l'épisiotomie, le soin ci-dessous ne doit pas ou les soins ci-dessous ne doivent pas être prodigués :

a. Faire bain de siège avec de l'eau froide
b. Appliquer en permanence un linge mouillé sur la suture

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

c. Assécher la suture
d. Faire un pansement occlusif sur la suture
e. Faire un pansement non occlusif sur la suture
f. Faire bain de siège avec de l'eau tiède ou chaude sur la suture

21. Parmi les propositions suivantes, relever celle qui est fausse ou celles qui sont fausses.

a. Le cordon ombilical contient 3 vaisseaux
b. Le fibrome utérin involue à la ménopause
c. Le fibrome utérin est cause de stérilité
d. Le liquide amniotique est produit principalement par le fœtus
e. À terme, le poids du placenta est égal au 1/6 du poids du fœtus
f. Le cordon ombilical s'insère sur la face maternelle du placenta

22. Parmi les facteurs suivants, relever celui qui est ou ceux qui sont classiquement des facteurs de risque de survenue du cancer du col utérin.

a. Cervicite virale
b. Réalisation de façon régulière des examens de dépistage
c. Partenaires sexuels multiples
d. Nulliparité
e. Premier accouchement après 30 ans
f. Antécédents de cancer du col chez la mère

23. Les signes suivants évoquent une grossesse môlaire :

a. Métrorragies spontanées faites de sang rouge au cours du 1er trimestre de grossesse
b. Métrorragies spontanées de sang noir au cours du 1er trimestre de grossesse
c. Métrorragies provoquées de sang rouge au cours du 1er trimestre de grossesse
d. Sialorrhée et vomissements au cours du 1er trimestre de grossesse associés à un placenta ressemblant aux frais de grenouille
e. Aménorrhée
f. Ménorragie

1er CAS CLINIQUE

24. Ce jour à 5 heures, Mme B.B.B., 30 ans, G6, P5, non obèse, se présente à la maternité pour des contractions utérines sur grossesse à terme. Le travail d'accouchement a commencé à 4 h. La hauteur utérine = 36 cm. Température = 36,9 °C. Le col est dilaté à 5 cm. Le taux d'hémoglobine = 10 g/100 ml. Grâce à vos soins appropriés, Mme B.B.B. donne naissance à 5 heures 20 minutes d'une fille pesant 4000 grammes ; à la naissance, celle-ci ne crie pas et ne respire pas.

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

La délivrance est faite à 5 heures 30 minutes sans GATPA par TCC. Mme B.B.B. risque de saigner abondamment et mourir. Parmi les propositions suivantes, relever les 2 qui sont mentionnées dans le récit de Mme B.B.B. et qui devraient attirer votre attention sur ce risque majeur.

Parmi les propositions suivantes, relever le geste ou les gestes à exécuter vis-à-vis de ce nouveau-né :

a. Massage cardiaque externe
b. Demander de l'aide et expliquer doucement à la mère les gestes à faire
c. Couper aussitôt le cordon ombilical avant 1 min de vie
d. Bien placer le nouveau-né en décubitus dorsal, le cou en extension modérée
e. Libérer les voies aériennes
f. Administration des médicaments pour faire respirer ce nouveau-né

25. Grâce à ces gestes correctement exécutés, ce nouveau-né a une ventilation spontanée efficace, durable et tout va très bien. Néanmoins, vous décidez de surveiller l'accouchée et son nouveau-né. Entre 5 h 30 min et 7 h 30 min, chez la mère vous allez surveiller le ou les paramètres suivants :

a. Les lochies pour rechercher une endométrite du post-partum
b. La TA
c. Le pouls
d. L'écoulement vulvaire pour rechercher un saignement anormal
e. Le globe de sécurité
f. Les conjonctives pour rechercher un ictère

26. En dehors de tout élément anormal, la fréquence normale de cette surveillance entre 6 h 30 min et 7 h 30 min est : (relever la fréquence correcte)

a. Toutes les 10 min
b. Toutes les 15 min
c. Toutes les 30 min
d. Toutes les 40 min
e. Toutes les 60 min
f. Toutes les 20 min

27. À 6 h, Mme BBB a saigné 100 ml par voie vaginale ; elle transpire abondamment, sa TA = 6/4 cmHg, son pouls = 120/min, ses conjonctives sont blanches et pas d'ictère, le périnée est intact. Selon vous, de quoi souffre Mme BBB ?

a. Hémorragie du post-partum
b. Hémorragie du post-partum immédiat
c. Hémorragie du post-partum tardif
d. Hémorragie du post-partum immédiat par atonie utérine

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

QUESTIONS

27. Pensez-vous que Mme ALLO était éligible au DIU ? Choisir la réponse juste.

A. OUI B. NON

28. Dans quelle catégorie d'éligibilité placez-vous Mme ALLO ? Choisir la réponse juste.

A. Catégorie 1
B. Catégorie 2
C. Catégorie 3
D. Catégorie 4

29. Selon le texte, quels sont les éléments en faveur de cette catégorie du DIU de Mme ALLO ? Choisir la réponse juste.

A. Mme Allo est âgée de 33 ans
B. Mme Allo ne veut pas d'autres enfants
C. Mme Allo a perdu les eaux 24 heures avant son accouchement
D. Toutes les réponses sont justes

30. Comment appelle-t-on l'insertion dont elle a bénéficié ? Choisir la réponse juste.

A. Insertion post-partum
B. Insertion post-placentaire
C. Insertion post-partum immédiat
D. Insertion d'intervalle

31. Quel est le type de DIU inséré à Mme ALLO ? Choisir la réponse juste.

A. DIU au cuivre
B. DIU hormonal

32. Quelle est sa durée d'action ? Choisir la réponse juste.

A. 6 ans
B. 5 ans
C. 12 ans
D. 15 ans

33. Que craignez-vous pour les fils non perçus par Mme ALLO ? Choisir la réponse juste.

A. Déchirure du col
B. Migration du DIU
C. Migration des fils

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

31. Ici, il s'agit d'une : (relever la réponse exacte ou les réponses exactes parmi les propositions suivantes)

a. Présentation du sommet
b. Présentation du siège
c. Présentation du siège décomplété
d. Présentation de la face tournée vers le sacrum
e. Présentation du siège complet
f. Présentation céphalique avec procidence des 2 pieds

32. Ici, le repère de cette présentation est : (relever la réponse exacte parmi les propositions suivantes)

a. L'occiput du fœtus
b. La racine du nez fœtal
c. Le sacrum du fœtus
d. La petite fontanelle du fœtus
e. Le menton du fœtus
f. Le sacrum de la parturiente

33. Parmi les propositions de phrases suivantes, relever la phrase qui est vraie ou les phrases qui sont vraies concernant le cas de Mme C.C.C.

a. Dès la fin de mon examen, je commence à remplir le partographe modifié de l'OMS
b. Dès la fin de mon examen, je ne remplis pas le partographe modifié de l'OMS, car l'état de la poche des eaux n'est pas précisé
c. Dès la fin de mon examen, je ne commence pas à remplir le partographe modifié de l'OMS, car il ne s'agit pas d'une présentation eutocique
d. Dès la fin de mon examen, je ne remplis pas le partographe modifié de l'OMS
e. Dès la fin de mon examen, je ne remplis pas le partographe modifié de l'OMS, car il s'agit d'une présentation en S.I.D.A.
f. Dès la fin de mon examen, je ne remplis pas le partographe modifié de l'OMS, car je suis en périphérie

34. Concernant Mme C.C.C., l'une des phrases suivantes est synonyme d'organisation de son transfert ou les phrases suivantes sont synonymes d'organisation de son transfert depuis son admission à la maternité. (Relever cette phrase parmi les propositions suivantes.)

a. Poche des eaux intacte
b. Rupture tempestive des membranes
c. Rupture précoce des membranes à 5 cm

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

d. Bruits du cœur fœtal = 140/min, réguliers et liquide amniotique méconial

e. Rupture prématurée des membranes

f. Rupture des membranes à 10 cm de dilatation cervicale

35. Indiquer le geste ou les gestes à exécuter chez Mme C.C.C. dès que le col utérin est dilaté à 10 cm parmi les propositions suivantes :

a. Pratiquer une large épisiotomie

b. Perfusion intraveineuse de 5 unités de Syntocinon (ocytocine) pour renforcer les contractions utérines et empêcher le relèvement des bras du fœtus durant le TV

c. Perfusion intraveineuse de 5 unités de Syntocinon (ocytocine) pour dilater le col utérin

d. Faire une grande extraction du siège en l'absence de souffrance fœtale aiguë

e. Surtout ne pas rompre la poche des eaux

f. Injection en intramusculaire de 10 unités de Syntocinon (ocytocine)

36. À un moment donné, vous décidez de pratiquer une large épisiotomie. Indiquer le moment idéal pour réaliser ce geste en relevant la proposition exacte parmi les phrases ci-dessous :

a. Quand la tête fœtale est visible durant une contraction utérine

b. Quand la tête fœtale est visible en dehors d'une contraction utérine

c. Quand l'anus fœtal est dilaté à 2-3 cm durant une contraction utérine

d. Quand l'anus maternel est dilaté à 2-3 cm durant une contraction utérine

e. Dès que le siège prend contact avec le périnée maternel ou quand le siège fait bomber le périnée et la hanche antérieure commence à se dégager ou quand on voit l'anus fœtal durant une contraction utérine

f. Quand le col utérin est dilaté à 10 cm durant une contraction utérine

37. Parmi les gestes suivants, relever celui qui doit être exécuté durant la réparation d'une épisiotomie :

a. Suturer tous les 3 plans avec du nylon n° 1

b. Suturer tous les 3 plans avec du nylon n° 2

c. Suturer tous les 3 plans avec du fil non résorbable non serti n° 1

d. Commencer la suture toujours de la profondeur du vagin pour venir vers la vulve

e. Ne pas suturer l'angle supérieur de l'incision vaginale

f. Réaliser la suture en un seul plan

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

38. Au cours de l'expulsion de ce fœtus en présentation du siège, vous décidez de terminer rapidement cette expulsion par une manœuvre, malgré l'absence de toute dystocie. Parmi les phrases suivantes, relever celle qui est exacte :

a. Je pratique la manœuvre de Mauriceau dès que je vois la pointe des omoplates du fœtus
b. Je pratique la manœuvre de Bracht dès que je vois la pointe des omoplates du fœtus
c. Je pratique systématiquement la manœuvre de Lovset
d. Je pratique la manœuvre de Mauriceau dès que je vois les oreilles du fœtus
e. Je pratique la petite extraction du siège
f. Je pratique la manœuvre de Bracht dès que je vois les oreilles du fœtus

39. Pour la cotation du score d'Apgar à 1 minute du nouveau-né, vous avez coté 2 pour la fréquence cardiaque et 1 pour chacun des autres paramètres. Ainsi, le total du score d'Apgar à 1 minute est : (relever la bonne réponse parmi les propositions suivantes)

a. 7
b. 5
c. 3
d. 4
e. 9
f. 6

40. Après la fin de l'accouchement de Mme C.C.C., vous pensez qu'il y a une rupture utérine ; pour cela, vous décidez de lever ce doute en réalisant : (parmi les propositions suivantes, relever ce geste approprié ou ces gestes appropriés)

a. Perfusion intraveineuse de 5 unités de Syntocinon (ocytocine)
b. Délivrance artificielle
c. Perfusion intraveineuse d'antibiotiques et de 5 unités de Syntocinon (ocytocine)
d. Délivrance artificielle suivie de révision utérine
e. Révision utérine
f. Révision utérine suivie de délivrance artificielle

(Fin du 2ème cas clinique)

BONNE CHANCE !!!

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

VERSION D

QCD : Consignes

Une réponse juste équivaut à 1 point.
Une réponse fausse équivaut à -1 point.
Sans réponse équivaut à 0 point.

1. Dans les soins mère kangourou, la durée minimale du portage de l'enfant en discontinu recommandé est de 60 minutes.

A-Vrai B-Faux

2. La vérification et la mesure du résidu gastrique sont importantes avant le gavage chez l'enfant dont la sonde est déjà en place.

A-Vrai B-Faux

3. Le résidu gastrique supérieur au 1/3 de la ration administrée et propre signifie que la ration est trop importante pour l'enfant.

A-Vrai B-Faux

4. Résidu gastrique absent signifie que la quantité de la ration précédente administrée est insuffisante.

A-Vrai B-Faux

5. Le transport médicalisé est une des indications de l'incubateur.

A-Vrai B-Faux

6. Dans le carnet de santé mère-enfant, la partie réservée à l'accouchement concerne la 3ème partie.

A-Vrai B-Faux

7. Une absence de sourire social ou sourire-réponse à 3 mois ne doit pas faire objet de visite clé.

A-Vrai B-Faux

8. Le respect de la confidentialité fait partie des principes de remplissage du carnet mère-enfant.

A-Vrai B-Faux

9. L'enfant né à terme et correctement nourri triple son poids de naissance à 24 mois.

A-Vrai B-Faux

10. La croissance des os, la taille et le périmètre crânien sont les éléments qualitatifs de la croissance de l'enfant.

A-Vrai B-Faux

11. La section immédiate du cordon ombilical du nouveau-né après la sortie de la filière génitale expose celui-ci à une anémie ferriprive.

A-Vrai B-Faux

12. JR a 15 minutes de vie. Né à terme. Son poids de naissance est de 3 000 grammes. Dans le cadre des soins essentiels du nouveau-né, pour lutter contre la maladie hémorragique, je lui administre par voie orale 9 gouttes de vitamine K1.

A-Vrai B-Faux

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

13. Le collyre antiseptique administré au nouveau-né en salle de naissance a pour objectif de traiter une infection active de l'œil du nouveau-né.

A-Vrai B-Faux

14. Il existe trois types de toilette.

A-Vrai B-Faux

15. Avant la toilette, il faut appliquer du lait de toilette sur tout le corps du nouveau-né.

A-Vrai B-Faux

16. Lorsque la température corporelle de l'enfant dépasse 39 degrés Celsius, il faut lui donner un bain tiède.

A-Vrai B-Faux

17. Dans les soins ombilicaux, la solution ou le gel de Chlorhexidine s'applique sur le cordon frais de la pointe du moignon à la base du cordon.

A-Vrai B-Faux

18. Le pansement à la Chlorhexidine se fait une fois par jour jusqu'à la cicatrisation.

A-Vrai B-Faux

19. La fonction principale de l'incubateur est d'assurer la respiration d'un air filtré et humidifié.

A-Vrai B-Faux

20. Le colostrum qui est de couleur jaunâtre ou d'apparence claire et de consistance épaisse, constitue un excellent laxatif pour le bébé.

A-Vrai B-Faux

QCM : Cochez la ou les bonnes réponses

Une réponse juste donne 1 point.
Une mauvaise réponse donne 0 point.
Sans réponse équivaut à 0 point.

21. L'enfant ayant le marasme, présente les signes cliniques suivants :

A. Peau sèche, craquelée, et dépigmentée
B. Un visage creusé, vieillot avec un regard vif et intéressé
C. Anorexie-diarrhée-triste

22. Le diagnostic de certitude du paludisme repose sur :

A. La clinique seulement
B. La goutte épaisse ou le test de diagnostic rapide positif
C. La numération formule sanguine
D. La coloration des conjonctives

23. Pour rechercher les facteurs favorisant de la maladie chez l'enfant je m'appuie sur :

A. Le triangle pédiatrique
B. Le losange pédiatrique
C. La pyramide pédiatrique

24. Parmi les propositions suivantes deux ne sont pas des principes de la PCIMNE. Lesquels ?

A. Destinée aux agents de santé des ESPC
B. La gratuité
C. Approche syndromique
D. Approche systématique
E. L'efficacité

25. Le nouveau-né Téha est en bonne santé et nourri au sein. Il présente un écoulement blanchâtre au niveau de la vulve. Cet écoulement est appelé :

A. Leucorrhée blanchâtre
B. Crise génitale
C. Colostrum

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

26. Le nouveau-né normal a un âge gestationnel compris entre :

A. 37 et 41 semaines + 6 jours
B. 7 et 42 semaines + 6 jours
C. 38 et 42 semaines + 6 jours

27. Relevez la lettre correspondant aux différentes étapes de l'examen du nouveau-né :

A. Cotation d'APGAR, appréciation de la respiration du nouveau-né, mensurations, examen somatique par appareil
B. Cotation d'APGAR, appréciation du nouveau-né dans son ensemble, mensurations, examen somatique par appareil
C. Cotation des réflexes, appréciation du nouveau-né dans son ensemble, mensurations, examen somatique par appareil

28. Mienmo vient de naître il y a 1 mn. Elle présente une cyanose des extrémités, une fréquence cardiaque à 120 batt/mn, un cri vigoureux ? une attitude de WM, respiration irrégulière. Le score d'APGAR de Mienmo est égal à :

A. 5
B. 7
C. 8

29. Parmi le matériel de toilette cité ci-dessous, il y a un intrus : lequel ?

A. Une paire de moufles
B. Une brosse à dent
C. Du beurre de karité

30. Le bain thérapeutique est recommandé en cas de :

A. Fièvre
B. Dermatoses
C. Convulsions

31. Si la sonde est en place et que le résidu gastrique est supérieur au 1/3 de la ration et sale ; il faut trouver l'intrus dans les gestes à poser :

A. Faire un lavage gastrique
B. Sauter de repas
C. Injecter 20 cc de ringer lactate

32. Quelles sont les trois formes principales de malnutrition ?

A. Sous-alimentation, carences alimentaires, suralimentation
B. Obésité, diabète, hypertension
C. Kwashiorkor, marasme, obésité

33. Parmi les principaux symptômes, relever deux à rechercher chez l'enfant de 2 mois à -5 ans, dans la PCIMNE :

A. L'incapacité de boire ou de téter
B. La convulsion
C. La difficulté respiratoire
D. La léthargie
E. Le problème d'oreille

34. Dans la PCIMNE, deux de ces fiches utilisées correspondent à différentes tranches d'âge qui sont de :

A. 0 à 1 mois
B. 1 mois à 2 mois
C. 0 à 1 semaine
D. 1 mois à 6 mois
E. 2 mois à 5 ans

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

35. Mme DKT envoie au centre de santé, son nouveau-né présentant un muguet buccal. L'agent de santé décide de faire le soin de la bouche avec :

A. Du sérum glucosé isotonique
B. Du sérum bicarbonaté à 14 ‰
C. Du sérum glucosé à 10 %
D. De l'éosine aqueuse à 2 %

36. Vous recevez à votre permanence le nouveau-né Tahi au 5ème jour de vie, avec une pâte de médicament traditionnel sur le cordon ombilical. Vous décidez d'effectuer les soins ombilicaux en commençant :

A. De la base vers la pointe du moignon du cordon ombilical
B. De la pointe du moignon du cordon vers la base de l'ombilic
C. De la base vers la moitié du moignon du cordon

37. Parmi les dispositions suivantes, deux sont à observer par l'agent de santé avant les soins ombilicaux. Lesquelles ?

A. Ôter les bijoux
B. Habiller le nouveau-né
C. Porter un cache-nez
D. Remercier la mère
E. Noter le soin dans le carnet ou le dossier médical du nouveau-né

38. L'antiseptique recommandé pour les soins ombilicaux est :

A. L'Hexomidine
B. L'Éosine aqueuse
C. La Chlorhexidine gel

39. Pour affirmer qu'une gestante est bien suivie, il faut qu'elle réalise :

A. Au plus 3 consultations prénatales
B. Au moins 4 consultations prénatales
C. Au plus 2 consultations prénatales

40. Les soins essentiels du nouveau-né sont limités aux :

A. 5 premières minutes de vie
B. 60 premières minutes de vie
C. 90 premières minutes de vie

41. Dans la première heure de vie, il est nécessaire de mesurer la température du nouveau-né toutes les :

A. 10 minutes
B. 15 minutes
C. 20 minutes

42. La mise du nouveau-né au sein doit se faire précocement entre :

A. 0 et 15 minutes de vie
B. 15 et 30 minutes de vie
C. 30 et 60 minutes de vie

43. GG est né à 14 h 30 minute à terme. Il est en bonne santé apparente. Je mesure son poids et lui administre la vitamine K1 en IM entre :

A. 14 h 30 min et 14 h 45 min
B. 14 h 46 min et 15 h 00 min
C. 15 h 31 min et 16 h 00 min

44. Lorsque survient un granulome ombilical (bourgeon) après la chute du cordon, le geste approprié consiste à :

A. Continuer l'application de la chlorhexidine

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

B. Traiter avec du crayon au Nitrate d'argent
C. Appliquer de l'alcool à 90°

45. Les éléments de surveillance du nouveau-né dans l'incubateur sont :

A. Température ; Coloration ; poids ; Rythme cardiaque
B. Température ; Coloration ; Respiration ; Rythme cardiaque
C. Température ; périmètre brachial ; Respiration ; Rythme cardiaque

46. Parmi les signes suivants, relever les deux signes d'une prise de sein correcte sont :

A. La bouche de l'enfant à moitié ouverte
B. La joue de l'enfant touche le sein de sa mère
C. Les lèvres du nourrisson sont en éversion
D. L'enfant suce les deux tiers du mamelon
E. L'aréole de la mère est peu visible au-dessus du mamelon

47. Dans la physiologie de la lactation, la prolactine réalise les deux actions suivantes :

A. Augmente le taux d'œstrogène
B. Favorise la production du lait
C. Provoque la contraction des cellules alvéolaires
D. Réalise une action contraceptive chez la mère
E. Propulse le lait dans les différents canaux lactifères

48. Dans la physiologie de la lactation, la prolactine réalise les deux actions suivantes :

A. Augmente le taux d'œstrogène
B. Favorise la production du lait
C. Provoque la contraction des cellules alvéolaires
D. Réalise une action contraceptive chez la mère
E. Propulse le lait dans les différents canaux lactifères

49. L'âge recommandé par l'OMS pour l'ablactation chez le nourrisson est :

A. 6 mois
B. 12 mois
C. 18 mois
D. 24 mois

50. Un nourrisson de 4 mois est nourri au lait maternel et reçoit du PRIMALAN sirop depuis la naissance pour un problème d'allergie. La modalité d'alimentation de ce nourrisson est :

A. Allaitement exclusif
B. Allaitement prépondérant
C. Alimentation mixte

51. Au nombre des directives établies par l'OMS pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte du VIH, il y a :

B. La pratique et la durée de l'allaitement
C. La mise au sein tardive
D. Le choix systématique de l'alimentation de remplacement

52. Parmi les critères ci-dessous, relevez 2 critères qui justifient le choix de l'alimentation de remplacement :

A. Accessible
B. Fiable
C. Justiciable
D. Discutable
E. Durable

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

53. Pour préparer le bol de lait d'un nourrisson de 5 mois avec du lait infantile, indiquez la lettre correspondant à la bonne réponse :

A. 5 mesurettes rases de lait + 200 ml d'eau
B. 6 mesurettes rases de lait + 210 ml d'eau
C. 7 mesurettes rases de lait + 210 ml d'eau

54. Les SMK comportent 3 composantes essentielles. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui n'est pas une composante des SMK :

A. Soins thermiques
B. Soins essentiels du nouveau-né
C. Allaitement

55. Domi est sous photothérapie, la surveillance de sa température se fait :

A. Toutes les 15 minutes
B. Toutes les 30 minutes
C. Toutes les 4 heures

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

VERSION A — LICENCE 3 IDE / SFM — DURÉE : 1 h 30 min

ÉTUDE DE CAS 1

Vous décidez de mener une enquête sociodémographique et épidémiologique au sein du village Gbézou. Vous avez enregistré les informations suivantes :

Population totale de la localité au 31/12/2019 : 8 000 habitants.

Population totale de la localité au 1er/01/2021 : 8 400 habitants.

Pendant l'année 2022, les données sanitaires suivantes ont été relevées dans le village :

85 naissances dont 23 mort-nés ;

Nombre total de décès enregistrés dans la localité : 52.

08 décès dont 03 du tétanos néonatal dans la tranche de 0 à 7 jours ;

06 décès dans la tranche de 8 à 27 jours ;

1 à 11 mois : 09 décès dont 02 dus aux IRA, 05 au paludisme et 02 à la rougeole ;

12 à 48 mois : 15 décès dont 03 dus à la rougeole, 05 aux IRA, et 07 au paludisme ;

3 décès dus au paludisme ;

11 décès maternels dont 02 liés aux morsures de serpent, 03 ont lieu au 43ème jour après l'accouchement et 5 au 48ème jour après l'accouchement. Le reste est survenu avant le 43ème après l'accouchement.

À partir du texte ci-dessus, répondez aux questions en hachurant sur l'alvéole des lettres correspondantes aux bonnes réponses, sachant qu'une bonne réponse = 1 point et mauvaise réponse = 0 point.

Questions

1. Quel est le taux d'accroissement annuel de la population de Gbézou ?

A. 4,75 %
B. 5,00 %
C. 5,25 %
D. 6,00 %

2. Quelle est la population totale de Gbézou en 2021 ?

A. 8 820 habitants
B. 8 800 habitants
C. 17 640 habitants

3. Quelle est la population totale de Gbézou en 2022 ?

A. 8 820 habitants
B. 9 261 habitants
C. 9 725 habitants
D. 18 040 habitants

4. Quelle est la population moyenne de Gbézou en 2022 ?

A. 8 600 habitants
B. 9 041 habitants
C. 9 812 habitants

5. Quel est le taux brut de natalité de Gbézou en 2022 ?

A. 0,48 %
B. 0,58 %
C. 0,68 %

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

D. 0,78 %

6. Quel est le taux brut de mortalité de Gbézou en 2022 ?

A. 0,48 %
B. 0,57 %
C. 0,67 %
D. 0,78 %

7. Quel est le taux de mortalité néonatale précoce de Gbézou en 2022 ?

A. 3,52 %
B. 4,83 %
C. 9,41 %
D. 12,90 %

8. Quel est le taux de mortalité néonatale tardive de Gbézou en 2022 ?

A. 7,05 %
B. 8,22 %
C. 9,67 %
D. 9,88 %

9. Quel est le taux de mortalité post néonatale de Gbézou en 2022 ?

A. 14,51 %
B. 12,23 %
C. 10,58 %
D. 9,46 %

10. Quel est le taux de mortalité néonatale de Gbézou en 2022 ?

A. 37,09 %
B. 27,05 %
C. 22,58 %
D. 16,47 %

11. Quel est le taux de mortalité infantile de Gbézou en 2022 ?

A. 37,09 %
B. 27,05 %
C. 41,93 %
D. 25,88 %

12. Quel est le taux de mortalité juvénile de Gbézou en 2022 ?

A. 0,93 %
B. 0,88 %
C. 0,97 %
D. 0,86 %

13. Quel est le taux de létalité lié au paludisme ?

A. 20 %
B. 23 %
C. 24 %
D. 25 %

14. Quel est le taux de mortalité maternelle ?

A. 1 612,90 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes
B. 8 064,51 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes
C. 10 756,34 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes
D. 17 741,93 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes

ÉTUDE DE CAS 2

Vous êtes en service dans le centre de santé Djamanasso dont la population de l’aire sanitaire est estimée à 6 500 habitants au 31 décembre 2024. Le taux d’utilisation du vaccin penta dans le centre est estimé à 98 %

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

en 2024. Au terme des activités de l'année 2024, le taux de couverture annuel de vaccination du centre de santé chez les enfants de 0 à 23 mois a été estimé à 90 %.
Les données du tableau ci-dessous ont été enregistrées pour ce centre de santé en 2024.

Vaccins	**Nombre de doses administrées en 2024**
VPO 0	135
VPO 3	130
Penta 1	132
Penta 3	130
RR 1	120

À partir du texte ci-dessus, répondez aux questions en hachurant sur l'alvéole des lettres correspondantes aux bonnes réponses, sachant qu'une bonne réponse = 1 point et mauvaise réponse = 0 point.
Questions

15. Quel est le facteur de perte du penta pour le centre de santé de Djamanasso ?

A. 1,02
B. 1,11
C. 1,05
D. 1,17

16. Quel est l'effectif des enfants de 0 à 23 mois dans l'aire de santé de Djamanasso ?

A. 227 enfants
B. 408 enfants
C. 444 enfants
D. 456 enfants

17. Quel est le besoin théorique en penta pour ce centre en 2024 ?

A. 1 100 doses
B. 1 291 doses
C. 1 320 doses
D. 1 390 doses

18. Quelle est la population cible des enfants pouvant bénéficier du vaccin VPO en campagne pendant l'année 2024 ?

A. 1 400 enfants
B. 1 320 enfants
C. 1 300 enfants

19. Le taux d'abandon du penta pour le centre de santé de Djamanasso ?

A. 1,05 %
B. 1,75 %
C. 1,51 %
D. 2,24 %

20. Le taux d'abandon global de la vaccination au centre de santé de Djamanasso ?

A. 7,25 %
B. 9,09 %
C. 12,03 %

21. Quel est le nombre des enfants de 0 à 23 mois ayant été complètement vaccinés au CSR de Djamanasso en 2024 ?

A. 400 enfants
B. 422 enfants
C. 444 enfants

22. Quelle est la population cible des enfants de 9 mois à 14 ans pouvant bénéficier du vaccin RR en campagne pendant l'année 2024 ?

A. 1 300 enfants
B. 2 925 enfants
C. 2 325 enfants

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

D. 1 756 enfants

QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (Q.C.D)

Répondez aux assertions ci-dessous en choisissant sur l'alvéole A pour vrai et B pour faux.
Réponse juste = 1 point ; Réponse fausse = -1 point ; Pas de réponse = 0 point.

23. La proportion d'échantillons de selles prélevés dans les 14 jours après le début de la paralysie doit être supérieure ou égale à 80 %.

A. Vrai B. Faux

24. L'approche psychosociologique des besoins en vue du diagnostic communautaire permet de fournir les données quantitatives.

A. Vrai B. Faux

25. La confirmation du tétanos néonatale dépend d'une confirmation du laboratoire.

A. Vrai B. Faux

26. Le volet préventif basé sur une assistance médicale visant à lutter contre les grandes endémies d'où la notion de grandes endémies, est un volet sur lequel, la prestation des services était organisée pendant la période de 1960 à 1980.

A. Vrai B. Faux

27. Les soins dits essentiels lorsqu'ils portent sur les besoins prioritaires de l'individu, des familles et des communautés.

A. Vrai B. Faux

28. La confirmation d'une épidémie de rougeole, c'est lorsque cinq (05) cas suspects ou plus sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire ou une aire de santé.

A. Vrai B. Faux

29. La règle des 3PS permet d'éviter les doses sacrifiées.

A. Vrai B. Faux

30. Les trois niveaux d'application des soins de santé primaires ont été dégagés pour booster la mise en œuvre des stratégies des SSP freinée par des difficultés.

A. Vrai B. Faux

31. Le taux de PFA est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est inférieur ou égal à 2 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans.

A. Vrai B. Faux

32. La plupart des facteurs ayant des répercussions sur la santé se situent en dehors de l'influence du secteur sanitaire.

A. Vrai B. Faux

33. Les qualités d'une eau potable sont à la fois physiques et bactériologiques.

A. Vrai B. Faux

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (Q.C.M)

Répondez aux questions ci-dessous en choisissant la ou les bonnes réponses.
Réponse juste = 1 point ; Réponse fausse = 0 point ; Pas de réponse = 0 point.

34. Les soins qui sont mis à la portée de tous, tant au plan géographique, social, financier que culturel sont dits :

A. Essentiels
B. Intégrés
C. Adaptés
D. Accessibles

35. L'un des principes de base des soins de santé primaire est :

A. La santé de la population
B. La couverture universelle

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

C. L'efficacité du programme
D. La politique sanitaire

36. Les différents domaines de la surveillance épidémiologique sont :

A. Épidémiologie descriptive
B. Épidémiologie des maladies transmissibles
C. Épidémiologie analytique
D. Épidémiologie des maladies transmissibles
E. Épidémiologie évaluative

37. Parmi les différentes méthodes de correction des défauts physiques de l'eau, deux permettent de corriger la turbidité de l'eau. Lesquelles ?

A. Javellisation
B. Décantation
C. Ionisation
D. Sédimentation
E. Ébullition

38. Parmi ces critères, identifiez ceux qui sont pris en compte dans le choix d'une source d'approvisionnement en eau potable.

A. Salubrité
B. Profondeur
C. Débit
D. Coût
E. Vitesse

39. Le système d'évacuation des excréta sans entraînement de matières fécales est :

A. La fosse d'aisance
B. La latrine à fosse
C. La fosse septique
D. Le puits perdu

40. Parmi ces propositions suivantes deux ne sont pas les fonctions d'un système de santé. Lesquelles ?

A. La prestation de service
B. Promotion de la santé
C. La mobilisation des ressources
D. Le financement
E. Amélioration de l'état de santé
F. La gouvernance

41. Parmi ces formes d'accessibilité, deux sont dans le système de santé.

A. Accessibilité médicale
B. Accessibilité financière
C. Accessibilité géographique
D. Accessibilité socio-culturelle

42. Parmi ces propositions suivantes, une n'est pas un avantage de l'étude du milieu :

A. Connaître les différents problèmes de santé du milieu
B. Disposer des données fiables et récentes sur la population
C. Regarder, centrer son intérêt sur des points précis du milieu
D. Connaître les composantes de la communauté et son organisation sociale

43. Les facteurs physiologiques favorisant la santé sont :

A. Absence de troubles métabolique
B. L'aspect physique (poids ne correspondant pas à la taille, maigreur)
C. L'eau polluée ou non potable
D. Bonne aération
E. Environnement affectif satisfaisant durant l'enfance

44. Parmi ces propositions suivantes, un est un acteur de la mobilisation communautaire :

A. Organisation de jeunesse
B. Les gouvernements

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

C. Les ministères
D. Organisations internationales

45. L'existence d'un goulot d'étranglement entre accessibilité géographique et l'utilisation des services signifie :

A. La population ne fréquente pas le service parce qu'elle n'accède pas
B. La population a accès au service, mais ne le fréquente pas
C. La population accède difficilement au service, mais le fréquente

46. Parmi ces éléments suivants, deux entrent dans l'élaboration d'une monographie :

A. Les informations relatives à l'agriculture et à l'alimentation
B. Les informations relatives à la politique
C. Les informations relatives à la culture
D. Les informations relatives à la faune
E. Les informations relatives aux marigots et cours d'eau

47. La période 1960 à 1980, identifiez le volet des activités de la santé parmi les propositions suivantes :

A. Un volet orienté sur les soins curatifs avec pour caractéristique essentielle, la gratuité des soins
B. Un volet orienté sur une émergence et une propagation des maladies fortement liées à la modernisation
C. Un volet orienté sur la promotion de la santé

48. Parmi les actions de prophylaxie, indiquez celles pratiquées en période coloniale :

A. Le dépistage des cas de maladies
B. Les consultations prénatales
C. L'isolement des cas dépistés
D. Les stratégies avancées
E. Les journées nationales de vaccination

49. Parmi ces propositions suivantes, deux sont celles ont marqué la période de 1994 à 2006 :

A. Une recrudescence et une extension des grandes endémies tels que le pian, la lèpre, la tuberculose, la dracunculose, l'ulcère de Burili
B. Le renforcement de la politique des médicaments essentiels génériques par le biais de la Pharmacie de la Santé Publique
C. La naissance d'un véritable système de santé national et d'une politique de santé
D. Le maintien en bonne santé la main d'œuvre destinée au développement économique qui était prioritaire
E. Une émergence et une propagation des maladies fortement liées à la modernisation de nos sociétés, à la modification des modes de vie, à l'urbanisation et aux difficultés d'adaptation et d'insertion

50. Parmi les propositions suivantes, identifiez l'avantage du diagnostic communautaire.

A. Permet d'identifier les principaux problèmes de santé d'une communauté avec sa participation et ses ressources pour envisager les solutions et des actions ciblées sur les problèmes repérés
B. Permet de faire une analyse fine des ressources disponibles (matérielles et humaine) sur le plan quantitatif et qualitatif
C. Permet de renforcer les activités effectuées en santé communautaire

51. Parmi les propositions suivantes, identifiez le but du diagnostic communautaire.

A. Permet de servir de base à toutes les actions sanitaires
B. Permet d'orienter les efforts sur les besoins réels de la population
C. Permet d'initier un processus de collaboration entre les populations et les agents de santé

52. L'existence d'un goulot d'étranglement entre l'utilisation des services et la couverture adéquate signifie :

A. La population vient une fois recevoir un soin, mais ne revient plus pour terminer la série de soins souhaitée pour avoir l'effet escompté
B. La population vient pour recevoir les soins mais n'y parvient pas
C. La population bénéficie des soins en quantité sans qualité

53. Parmi les critères suivants, indiquez ceux qui permettent de sélectionner un problème de santé :

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

A. Population totale de la localité
B. L'ampleur du problème
C. La gravité du problème
D. Le niveau d'instruction des populations
E. La vulnérabilité du problème
F. La durée des interventions

54. Parmi les items suivants, identifiez celui qui est une population bénéficiaire de la mobilisation sociale.

A. L'individu
B. La communauté
C. La société toute entière

55. Parmi les items suivants, identifiez celui qui est une population bénéficiaire de la mobilisation communautaire.

A. La famille
B. Les personnes physiques
C. Les entités morales

56. Parmi ces propositions suivantes, un est un acteur de la mobilisation sociale :

A. Les partenaires de mise en œuvre (Organisation Non Gouvernementales)
B. Président de l'association de développement
C. Agent de Santé Communautaire

57. L'existence d'un goulot d'étranglement entre la population cible et la disponibilité des ressources signifie :

A. Les ressources sont disponibles mais la population cible ne s'y intéresse pas
B. Les ressources ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins de la population cible
C. L'effectif de la population cible est très petit par rapport aux ressources disponibles

BONNE CHANCE

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

VERSION B — LICENCE 3 SFM

EXERCICE 1 : QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES (QCM)

CONSIGNES	
Parmi les propositions faites, choisissez la ou les bonnes réponses à la question posée.	**Une réponse exacte = 1 pt** **Une réponse fausse = 0 pt** **Aucune réponse = 0 pt**

1. Les besoins des jeunes/adolescents varient en fonction des éléments suivants sauf un lequel ? : choisir la mauvaise réponse

A. Sexe

B. Âge

C. Éducation

D. Paire

2. L'application des critères médicaux d'éligibilité permet :

A. De prendre en charge les effets secondaires de la méthode par rapport aux conditions spécifiques du client

B. De classer les méthodes en fonction de leur mode d'action par rapport aux conditions spécifiques du client

C. De faire une prescription appropriée en fonction des risques et des avantages de la méthode par rapport aux conditions spécifiques du client

3. Les adolescent(e)s doivent éviter les rapports sexuels précoces car : choisir 2 réponses justes

A. Les organes génitaux ne sont pas encore matures à cause de la fragilité de leurs muqueuses ;

B. Les adolescent(e)s sont préparé(e)s sur le plan psychologique à cause de la fragilité de leurs muqueuses.

C. Les parents n'approuvent pas leur décision de refus de petit ami à cause de la fragilité de leurs muqueuses.

D. Les adolescent(e)s ont plus de risque d'être infecté(e)s par les IST, le VIH et le SIDA à cause de la fragilité de leurs muqueuses.

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

4. Parmi les propositions suivantes, indiquez les champs d'activité de la SR en COTE D'IVOIRE. Choisir trois réponses justes

A. Les centres de dispensaire

B. Le service de conseil économique et juridique.

C. Les services de santé scolaire et universitaire

D. Les centres d'écoute et de conseils pour les jeunes

E. Association réponse A, B et D

5. Indiquez Les obstacles à la promotion des droits des jeunes au sein de la famille. Choisir la réponse juste

A. La dislocation de la famille et la pauvreté

B. Le manque de dialogue entre enfants et parents et enfants entre eux,

C. L'ignorance des textes et des instruments juridiques en faveur des enfants,

D. Le manque de scolarisation des enfants, la déscolarisation des enfants,

E. Toutes les réponses sont justes

6. La planification peut contrôler les facteurs de risques suivants sauf un , lequel ?

A. L'âge de la mère et les grossesses non désirées

B. La délinquance juvénile

C. La taille d'une famille

D. L'intervalle inter génésique

7. En matière de SR, Les adolescents et jeunes ont besoins de : choisir 3 réponses justes

A. Compétences psychosociales

B. Services de santé adaptés à leurs besoins

C. Informations fiables sur la prévention de l'utilisation de la drogue

D. Continuité de soins et des services intégrés conformément aux normes du pays.

E. Uniquement les réponses A et B

8. Le DIU est contre indiqué en cas de : choisir 4 réponses justes

A. Cardiopathie valvulaire

B. Traitement anticoagulant

C. Utérus bicorne

D. Antécédents d'infection génitale haute

E. Fibrome sous séreux pédiculé

9. La première visite après utilisation des COC : choisir la réponse juste

A. RDV dans 25 jours

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

B. RDV dans 5 à 6 mois

C. RDV dans 4 semaines

10. Le DIU expose aux risques immédiats suivants : choisir 3 réponses justes

A. Perforation utérine

B. Syncope et choc vagal

C. Infection génitale haute

D. Grossesse extra utérine

E. Fistule urérovésicale

11. L'orientation sexuelle : choisir la réponse juste

A. Renvoie à la manière dont une personne se perçoit et s'identifie sur le spectre des identités de genre,

B. L'attirance physique, romantique ou émotionnelle qu'une personne éprouve envers une autre personne

C. Renvoie à la manière dont une personne se perçoit et s'identifie sur le spectre des identités de sexe

D. Renvoie à la manière dont une personne se perçoit et s'identifie sur le spectre des identités de la communauté,

12. En tant que SFM donnez l'ordre d'établissement d'une bonne relation avec une patiente adolescente : choisir la réponse juste

A. Vous efforcer de normaliser le problème pour réduire le sentiment de stigmatisation qui peut l'entourer

B. Utiliser la troisième personne (questions indirectes) lorsque cela est possible

C. Commencer par des questions moins sensibles et qui ne dérangent pas

D. Réponse A-B-C

E. Réponses C-B-A

13. Le calendrier de suivi PATCH combiné : choisir la réponse juste

A. Un suivi médical régulier au moins 3 fois par an.

B. Un suivi médical régulier au moins une fois par an.

C. Un suivi médical régulier au moins 2 fois par an

14. Mme ADONIS est sous pilule et vient vous voir au centre pour une TA 170/110. Quelle sera votre conduite à tenir ? choisir 3 réponses justes

A. La rassurer qu'il n'en soit rien à s'inquiéter

B. Stopper la pilule

C. Lui conseiller d'autres méthodes

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

D. La revoir deux semaines après pour le contrôle de la TA

E. Lui demander de continuer la pilule et RDV deux semaines après

15. Le DIU est : la réponse juste

A. Petite armature flexible qui existe sous plusieurs formes, que l'on insère dans les trompes de Fallope de la femme afin d'éviter la survenue d'une grossesse

B. Petite armature flexible qui existe sous plusieurs formes, que l'on insère dans la cavité utérine de la femme afin d'éviter la survenue d'une grossesse

C. Armature flexible qui existe sous plusieurs formes, que l'on insère dans la cavité utérine de la femme pour bloquer les spermatozoïdes

16. Les implants sous cutanés appartiennent à la famille des : choisir la réponse juste

A. CHC

B. CHP

C. CHI

D. COP

E. CIP

17. Quelles informations allez-vous donner à Mme YEO Après insertion de son implant ce jour : choisir la réponse juste

A. Le type d'implant

B. La date de l'insertion

C. Le site d'insertion (le bras)

D. Le mois et l'année où les implants doivent être retirés ou remplacés

E. L'endroit où elle peut se rendre si elle a des problèmes ou des questions à propos des implants

F. Tous les éléments cités

18. Chez une utilisatrice de CIP : choisir la réponse juste

A. Un retard ou une avance de 5 à 12 jours pour la prochaine injection peut être toléré

B. Un retard ou une avance de 7 à 12 jours pour la prochaine injection peut être toléré

C. Un retard ou une avance de 8 à 12 jours pour la prochaine injection peut être toléré

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

19. Les effets secondaires suivants peuvent être observés chez Mme Kouassi sous implant sauf deux lesquels ?

A. Forte hémorragie

B. Diminution de la libido

C. Sautes d'humeur

D. Nausées

E. Douleurs abdominales violentes

F. Acnés

20. Une cliente sous COP prenant les BARBITURIQUES, est placée dans quelle catégorie d'éligibilité ?

A. Catégorie 1

B. Catégorie 2

C. Catégorie 3

D. Catégorie 4

21. Quelle formule est généralement utilisée pour l'estimation des besoins ?

A. Besoin = Stock disponible + Pertes

B. Besoin = Consommation moyenne × Période d'approvisionnement

C. Besoin = Commande précédente × 2

D. Besoin = Stock minimum × 10

22. Quel facteur ne doit PAS influencer directement l'estimation des besoins ? choisir la réponse juste

A. La saisonnalité de certaines pathologies

B. Les campagnes de vaccination à venir

C. La consommation réelle des mois précédents

D. Le budget restant de l'année précédente

23. Que doit-on faire en premier lors de la réception d'un lot de médicaments ? choisir la réponse juste

A. Le stocker immédiatement

B. L'enregistrer dans l'ordinateur

C. Vérifier la quantité, la qualité, et la conformité avec la commande

D. Le distribuer aux services demandeurs

24. La Gestion de l'hygiène menstruelle : choisir la réponse juste

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

A. Désigne l’utilisation de protections propres (serviettes, coupe, tissu) pour absorber le sang, qui peuvent être changées dans l’intimité et en toute sécurité, sans accès à l'eau et aux savons pour se laver, ainsi qu’aux installations pour éliminer les protections.

B. Désigne l’utilisation de protections propres (serviettes, coupe, tissu) pour absorber le sang, qui peuvent être changées dans l’intimité et en toute sécurité, avec accès à l'eau et aux savons pour se laver, ainsi qu’aux installations pour éliminer les protections.

C. Désigne l’utilisation de protections propres (serviettes, coupe, tissu) pour absorber le sang, qui peuvent être changées partout sans aucune sécurité, avec accès à l'eau et aux savons pour se laver, ainsi qu’aux installations pour éliminer les protections.

25. Dans la gestion de l’hygiène menstruelle, Les hommes jouent un rôle clé en tant que : sauf un lequel ? choisir la mauvaise réponse

A. Pères et tuteurs

B. Enseignants et leaders communautaires

C. Principaux bénéficiaires directs des produits d’hygiène menstruelle

D. Décideurs politiques et économiques

E. Partenaires et alliés

26. Les principes de la participation communautaire en GHM reposent sur : choisir 4 réponses justes

A. Prudence

B. Équité

C. Transparence

D. Efficacité

E. Durabilité

F. Inclusion

EXERCICE 2 : ÉTUDE DE CAS

Mme ALLO, âgée de 33 ans, est mère de trois enfants dont un nouveau-né sexe féminin de 7 semaines, Elle vous informe qu’elle avait perdu les eaux pendant 24 heures à la maison avant son accouchement et elle a bénéficié d’un DIU dans les 27 minutes après son accouchement. Elle est mariée depuis 4 ans et ne veut pas d'autres enfants pour le moment. Son inquiétude au moment où vous la recevez, est qu’elle ne perçoit plus les fils du DIU après les rapports sexuels avec son mari.

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

QUESTIONS

27. Pensez-vous que Mme ALLO était-elle éligible au DIU ? choisir la réponse juste

A. OUI B. NON

28. Dans quelle catégorie d'éligibilité placez-vous Mme ALLO ? choisir la réponse juste

A. Catégorie 1

B. Catégorie 2

C. Catégorie 3

D. Catégorie 4

29. Selon le texte, quelles sont les éléments en faveur de cette catégorie du DIU de Mme ALLO ? choisir la réponse juste

A. Mme Allo est âgée de 33 ans,

B. Mme Allo ne veut pas d'autres enfants

C. Mme Allo a perdu les eaux 24 heures avant son accouchement

D. Toutes les réponses sont justes

30. Comment appelle-t-on l'insertion dont elle a bénéficié ? choisir la réponse juste

A. Insertion post partum

B. Insertion post-placentaire

C. Insertion post-partum immédiat

D. Insertion d'intervalle

31. Quel est le type de DIU inséré à Mme ALLO ? choisir la réponse juste

A. DIU au cuivre

B. DIU hormonale

32. Quelle est sa durée d'action ? choisir la réponse juste

A. 6 ans

B. 5 ans

C. 12 ans

D. 15 ans

33. Que craignez-vous pour les fils non perçus par Mme ALLO ? choisir la réponse juste

A. Déchirure du col

B. Migration du DIU

C. Migration des fils

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

34. Quelle sera votre CAT face à cette situation ? Choisir la réponse juste

A. La rassurer

B. Lui dire de rentrer sans savoir quoi faire

C. Examiner pour vérifier la présence des fils

D. Si fils non vus après l'examen, lui donner une méthode d'attente et la revoir aux prochaines règles

E. Réponse A, C et D

35. LA CCV est : choisir la réponse juste

A. Intervention chirurgicale qui met fin de façon temporaire à toute possibilité de reproduction sexuée sans toutefois troubler la sexualité et perturber la fonction hormonale.

B. Intervention chirurgicale qui met fin de façon définitive et irréversible à toute possibilité de reproduction sexuée sans toutefois troubler la sexualité et perturber la fonction hormonale.

C. Intervention chirurgicale qui met fin de façon définitive et irréversible à toute possibilité de reproduction sexuée

36. En cas d'occlusion des trompes : choisir la réponse juste

A. Éviter d'avoir des rapports sexuels pendant 1 semaine après l'intervention.

B. Éviter d'avoir des rapports sexuels pendant 2 semaine après l'intervention

C. Éviter d'avoir des rapports sexuels pendant 3 semaine après l'intervention

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

EXERCICE 3 : QUESTIONS À CHOIX DIRECT (QCD)

CONSIGNES	
Choisir A = Vrai si l'affirmation est vraie. **Choisir B = Faux si l'affirmation est fausse.**	**Une réponse exacte = +1 pt** **Une réponse fausse = -1 pt** **Aucune réponse = 0 pt**

37. Les femmes qui suivent un traitement antirétroviral (ARV) peuvent utiliser sans risque les contraceptifs injectables.

38. La santé de la reproduction vise l'amélioration de la qualité de vie pour tous à travers le cycle de la vie qui va de la naissance à l'âge avancé.

39. Les femmes qui allaitent peuvent utiliser des contraceptifs injectables six semaines après l'accouchement.

40. La planification familiale ne procure que des avantages sanitaires pour la mère et pour l'enfant.

41. Les contraceptifs injectables permettent un retour immédiat de la fécondité.

42. Une femme séropositive peut utiliser un implant.

43. En Côte d'Ivoire, on dénombre six champs d'activités de la SR.

44. Les adolescents et jeunes n'ont nullement pas le droit d'exprimer leur opinion sur les services qu'ils reçoivent en SR.

45. Les besoins des jeunes varient en fonction du Sexe.

46. Le tabagisme et l'alcoolisme sont seulement les principaux problèmes liés à la santé sexuelle des jeunes/adolescents.

47. Les adolescent(e)s doivent accepter les rapports sexuels précoces car les organes génitaux sont matures.

48. L'influence de la modernité est un facteur qui influence le comportement sexuel des adolescents (es).

49. La méthode de la glaire cervicale ou BILLINGS est une méthode traditionnelle.

50. La ligature des trompes est une méthode contraceptive temporaire.

51. Le coït interrompu est conseillé aux couples qui ont des rapports sexuels fréquents, s'ils souhaitent utiliser une méthode contraceptive sûre et efficace.

52. La MAMA est une méthode contraceptive naturelle qui agit directement sur l'utérus pour empêcher la survenue d'une gontraceptive sûre et efficace.

La MAMA est une méthode contraceptive naturelle qui agit directement sur l'utérus pour empêcher la survenue d'une grossesse.

EXAMEN BLANC INFAS KORHOGO - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SSR / PF

53. La contraception orale combinée n’est pas indiquée pour les femmes qui allaitent six semaines après leur accouchement.

54. La sage-femme de petit-paris peut placer le 17 OCTOBRE 2025 l’implant dont la date de péremption est prévue le 1 OCTOBRE 2025.

55. La consultation prénuptiale et conseil en mariage est une composante du volet santé des adolescents/enfants.

56. L’arrivée d’une population dans une région donnée autre que sa région d’origine est appelée émigration.

BONNE CHANCE