

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE CHIRURGIE

CONSIGNES

QCM : Réponse juste = 1 ; réponse fausse = 0 ; pas de réponse = 0.

QCD : Réponse juste = 1 ; réponse fausse = -1 ; pas de réponse = 0.
Vrai = A ; Faux = B.

Cas clinique

Lors d'un AVP (accident de la voie publique), M. Zada, commerçant, est transféré à l'hôpital le plus proche. Le médecin traitant fait le constat suivant : des scalpels et un hématome au niveau frontal ; M. Zada est inconscient. Après une radio, le cliché montre une embarrure.

1. Pour apprécier l'état de conscience de M. Zada, le médecin traitant a utilisé le : donner la bonne réponse.

- A. Score de Silverman
- B. Score d'Apgar
- C. Score de Glasgow

2. Le score de Glasgow se réfère à ces trois paramètres suivants : lesquels ?

- A. La réponse oculaire (ouverture des yeux)
- B. La douleur abdominale
- C. La réponse verbale
- D. La réponse motrice
- E. Les céphalées
- F. Les vomissements

3. Vu le constat du médecin traitant, choisir le chiffre vraisemblable correspondant au score de Glasgow concernant M. Zada.

- A. Score = 5
- B. Score = 10
- C. Score = 14
- D. Score = 12

4. Les deux signes physiques suivants de M. Zada attestent d'un traumatisme crânien : lesquels ?

- A. L'hématome frontal
- B. Les scalpels
- C. Les vomissements
- D. La sialorrhée
- E. Les douleurs lombaires

5. Le traitement de l'embarrure de M. Zada sera fait par : donner la bonne réponse.

- A. Orthopédie
- B. Ostéosynthèse
- C. Traitement médical

6. L'embarrure se définit comme étant :

- A. Décollement d'un lambeau de cuir chevelu d'origine traumatique
- B. Une plaie béante du cuir chevelu
- C. Un décollement d'un fragment de l'os crânien avec enfoncement dans la voûte crânienne suite à un traumatisme

7. S'appuyant sur les dires du médecin traitant, évaluer ce traumatisme crânien.

- A. Un traumatisme bénin
- B. Un traumatisme grave
- C. Un traumatisme modéré

8. Parmi ces signes suivants, indiquer deux concernant une fracture du fémur.

- A. L'infection
- B. L'impotence fonctionnelle du membre
- C. L'ankylose
- D. La déformation du membre

9. Parmi ces organes suivants, indiquer deux qui sont des organes pleins.

- A. La vessie
- B. Le foie
- C. La rate
- D. Le côlon
- E. L'intestin grêle

10. Parmi ces éléments suivants, indiquer celui sur lequel est fixé l'appendice.

- A. Le cæcum
- B. L'iléon
- C. Le sigmoïde

11. Indiquer le geste d'urgence à faire en cas de rétention aiguë des urines.

- A. Donner les antibiotiques
- B. Donner les anti-inflammatoires
- C. Poser une sonde vésicale
- D. Donner de l'eau à boire

12. Donner deux complications immédiates lors d'une fracture ouverte.

- A. Rupture vasculaire
- B. Pseudarthrose
- C. Rupture nerveuse
- D. Cal vicieux
- E. Douleur

13. L'efficacité du traitement du cancer réside dans :

- A. La précocité du diagnostic
- B. L'administration d'antibiotique massive
- C. L'administration d'antidouleur

14. L'épiphyse inférieure d'un os long est aussi appelée :

- A. Diaphyse
- B. Métaphyse
- C. Épiphyse distale

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE CHIRURGIE

15. Pour qu'il y ait une hernie abdominale, il faut :

- A. Un abdomen volumineux
- B. Un mégacôlon
- C. Un point de faiblesse

16. L'ankylose est :

- A. Une élongation du ligament
- B. Une raideur de l'articulation
- C. Une rupture du tendon

17. Indiquer deux buts du pansement parmi ceux-ci.

- A. But de désinfection
- B. But de protection
- C. But de rinçage
- D. But de torsion
- E. But d'ouverture

18. Le petit bassin est aussi appelé :

- A. L'abdomen supérieur
- B. Le pelvis
- C. La ligne blanche

19. Le mal de Pott est une maladie qui touche : une réponse juste.

- A. Le cerveau
- B. Les méninges
- C. La colonne vertébrale
- D. Les os iliaques

20. En cas d'échec de la pose de la sonde vésicale en urgence dans une rétention aiguë des urines, l'on recourt à :

- A. Un traitement médical
- B. Un traitement par voie orale
- C. Une ponction sus-pubienne

21. Pour le remplissage vasculaire (par les solutés) d'un brûlé grave, l'on utilise :

- A. La formule de Ferry
- B. La règle de Baxter
- C. La formule de Gorgina

22. Toutes ces causes aboutissent à une occlusion mécanique, sauf une, laquelle ?

- A. Corps étrangers
- B. Torsion d'une anse (segment) intestinale sur elle-même
- C. Dérèglement du système nerveux intestinal
- D. Invagination intestinale

23. Parmi les hernies suivantes, indiquer les deux qui sont des hernies de l'aine.

- A. La hernie ventrale latérale
- B. La hernie inguinale
- C. La hernie crurale (fémorale)
- D. La hernie de la ligne blanche
- E. La hernie ombilicale

24. Parmi les actes suivants, indiquer les deux possibles à effectuer en urgence chez un patient qui souffre de rétention aiguë des urines.

- A. L'adénomectomie
- B. La ponction sus-pubienne
- C. Le sondage urinaire
- D. La cystectomie
- E. La pose d'une vessie de glace

25. Une des contre-indications de la pose de la sonde urinaire est la suivante :

- A. L'infection
- B. La stérilité
- C. L'éjaculation précoce
- D. Le cancer du rectum

26. Le mal de Pott affecte (touche) ces deux (02) parties du corps :

- A. Les vertèbres
- B. Les bronches
- C. Les disques intervertébraux
- D. La trachée
- E. Le cerveau

27. Un malade souffre de douleur abdominale localisée dans la fosse iliaque droite de survenue brutale. Il peut s'agir de : une seule réponse.

- A. Hernie de la ligne blanche
- B. Appendicite aiguë
- C. Douleur néphrétique

28. Déterminer deux diagnostics différentiels de l'appendicite aiguë.

- A. Hépatite
- B. Pancréatite aiguë
- C. GEU (grossesse extra-utérine)
- D. Salpingite
- E. Rectorragie

29. Dans quel cadran de l'abdomen est situé le foie ?

- A. L'épigastre
- B. L'hypogastre
- C. L'hypochondre droit
- D. La fosse iliaque

30. Les membres supérieurs appartiennent au :

- A. Squelette principal
- B. Squelette appendiculaire
- C. Squelette axial

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE CHIRURGIE

- 31. La prise en charge d’une fracture simple dans un EPHR se réalise par ces deux (02) actes :**

 - A. Un pansement
 - B. Une réduction
 - C. Une contention (immobilisation)
 - D. Une incision
 - E. Une ouverture du foyer de fracture
- 32. Après la consolidation de la fracture, il faut réaliser une :**

 - A. Rééducation fonctionnelle
 - B. Assistance ventilatoire
 - C. Ponction du trait de fracture
- 33. Une des contre-indications de la pose d’une sonde urinaire est la suivante :**

 - A. Le vertige
 - B. La gonococcie
 - C. Les vomissements
- 34. Le choc septique est aussi appelé :**

 - A. Choc hypovolémique
 - B. Choc microbien (bactérien)
 - C. Choc traumatique
- 35. Le rein fait partie :**

 - A. Du bas appareil urinaire
 - B. Du milieu de l’appareil urinaire
 - C. Du haut appareil urinaire
- 36. L’un des diagnostics différentiels de l’appendicite est :**

 - A. Douleur dans l’hypochondre gauche
 - B. Une infection de l’ovaire droit
 - C. Une douleur épigastrique
- 37. L’hydrocèle est un épanchement liquidien :**

 - A. Dans le scrotum
 - B. Dans le canal inguinal
 - C. Dans l’utérus
- 38. La hernie non compliquée est aussi appelée :**

 - A. Hernie étranglée
 - B. Hernie non étranglée
 - C. Hernie douloureuse
- 39. La hernie étranglée est :**

 - A. Irréductible
 - B. Réductible
 - C. Dégonflable
- 40. L’appendice peut occuper aussi cette position :**

 - A. Sus-hépatique
 - B. Sus-splénique
 - C. Latérocaecale
- 41. L’anorexie, les vomissements alimentaires et la constipation sont des signes annonciateurs ou prodromes de l’appendicite aiguë.**

Vrai = A Faux = B
- 42. Le volvulus intestinal et l’invagination intestinale sont des causes mécaniques de l’occlusion intestinale aiguë.**

Vrai = A Faux = B
- 43. La hernie ombilicale est un épanchement liquidien dans l’ombilic.**

Vrai = A Faux = B
- 44. L’adénome de la prostate est une affection bénigne qui se manifeste par une hypertrophie de la prostate.**

Vrai = A Faux = B
- 45. Plus le score de Glasgow est élevé, plus l’état du malade est grabataire.**

Vrai = A Faux = B
- 46. Le défaut de sécrétion de testostérone est l’une des causes de la cryptorchidie.**

Vrai = A Faux = B
- 47. Les occlusions intestinales fonctionnelles ont pour synonymes les occlusions mécaniques.**

Vrai = A Faux = B
- 48. Les vomissements fécaloïdes évoquent une occlusion haute.**

Vrai = A Faux = B
- 49. La fracture ouverte véritable est la fracture ouverte de dedans en dehors.**

Vrai = A Faux = B
- 50. Lors de la surveillance d’un traumatisé, l’accélération du pouls et une hypotension artérielle attestent d’un état de choc.**

Vrai = A Faux = B
- 51. La radiographie est par excellence le diagnostic positif d’une fracture diaphysaire.**

Vrai = A Faux = B
- 52. L’étranglement herniaire peut occasionner une occlusion intestinale aiguë.**

Vrai = A Faux = B
- 53. Le globe vésical évoque une rétention aiguë des urines.**

Vrai = A Faux = B
- 54. Le choc opératoire fait partie des chocs traumatiques.**

Vrai = A Faux = B
- 55. Le choc hypovolémique chez un traumatisé de la voie publique évoque une hémorragie abondante.**

Vrai = A Faux = B
- 56. Un anthrax présente les signes cardinaux de l’inflammation.**

Vrai = A Faux = B
- 57. Un anthrax est un ensemble de furoncles.**

Vrai = A Faux = B
- 58. Un abcès froid présente la rougeur, la tuméfaction, la douleur, la chaleur.**

Vrai = A Faux = B
- 59. La polydactylie est aussi appelée la syndactylie.**

Vrai = A Faux = B
- 60. La toux chronique est l’une des causes de la hernie inguinale.**

Vrai = A Faux = B

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

Étude de cas

Au cours de la visite, deux clients retiennent votre attention. Il s'agit de Monsieur Goly, 50 ans, père de 6 enfants et avec sa deuxième femme à terme. Il est de profession libérale et gagne son argent de nourriture au quotidien. Hospitalisé il y a 17 jours. Couché sur le dos avec un abdomen de batracien, à la palpation de l'abdomen vous sentez le foie mobile, comme un glaçon flottant dans un liquide, les pieds sont tuméfiés gardant le godet à la pression, le tout dans un tableau de jaunisse. Goly est un consommateur de toute sorte d'alcool avec plus de 40 g/j. Il est très anxieux et pensif ce jour. Il oublie même l'heure de sa ponction et de prise des médicaments.

Q1. De quoi s'agit-il en terme syndromique chez GOLY ?

- A- Addiction alcoolique
- B- Syndrome œdémato-ascitique
- C- Cancer primitif du foie
- D- Cirrhose hépatique

Q2. De quelle affection souffre M. Goly ?

- A- Cirrhose évolutive
- B- Hépatite
- C- Ascite

Q3. Dans le texte, deux signes vous permettent de reconnaître une ascite.

- A- Pieds tuméfiés gardant le godet
- B- Foie mobile type glaçon dans un liquide
- C- Un tableau de jaunisse
- D- Un abdomen de batracien

Q4. Quel problème selon Virginia H. pouvez-vous formuler chez M. Goly ?

- A- Respirer convenablement
- B- Se réaliser
- C- S'occuper en vue de se sentir utile

À côté de Goly se trouve Monsieur Soro, 44 ans, hospitalisé depuis 11 jours pour hépatite virale. Le client est chauffeur de taxi et père de 5 enfants dont 3 scolarisés avec 1 en classe d'examen.

Q5. Quel rapport établissez-vous entre l'affection de Goly et de SORO ?

- A- Ce sont des affections complémentaires
- B- L'affection de Goly est la complication de celle de SORO
- C- L'affection de Soro constitue le début de celle de Goly
- D- Aucun rapport, ces deux affections sont différentes

Étude de cas 2 : M. Soro avait été admis dans le service à la période pré-ictérique de sa maladie. Les investigations ont relevé que le client a contracté cette hépatite virale lors d'une transfusion sanguine pour anémie post-hémorragique. Son taux d'hémoglobine se chiffrait à 7 g/dl avec un poids de 60 kg. Lors de la transfusion sanguine, l'hémoglobine désirée de M. Soro était de 14 g/100 ml.

Q6. Vous précisez le type de sang reçu par M. Soro.

- A- Sang total iso groupe iso rhésus
- B- Culot globulaire
- C- Plasma

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

Q7. Parmi les accidents suivants, M. Soro était exposé à trois pendant cette transfusion. Lesquels ?

- A- Hémolyse aiguë
- B- Perturbation du rythme cardiaque
- C- Transmission de maladie
- D- Accentuation de l'infection
- E- Œdème aigu du poumon

Q8. La quantité de sang reçu par M. SORO est :

- A- 360 ml
- B- 2520 ml
- C- 5400 ml

Q9. Parmi les besoins suivants, relevez un besoin fondamental d'ordre sociologique non satisfait chez M. Soro.

- A- S'habiller et se déshabiller
- B- S'occuper en vue de se réaliser
- C- Pratiquer sa religion et ses croyances

Ce matin, M. Soro affiche un air anxieux. M. Goly est sous Lasilix 20 mg à raison de 1 comprimé 2 fois par jour. De même, une ponction d'ascite est effectuée chez le client. M. Goly est alcoolique connu.

Q10. Vous formulez un diagnostic infirmier avec un facteur contributif parmi les suivants en liaison avec le besoin fondamental d'ordre sociologique.

- A- Incapacité à assumer son rôle social due à son hospitalisation se manifestant par l'anxiété
- B- Anorexie liée à sa maladie contractée lors d'une transfusion sanguine
- C- Anxiété liée à la crainte de complication de sa maladie se manifestant par la période pré-ictérique

Q11. En votre qualité d'infirmier(e), quels sont vos rôles auprès de M. Goly parmi les suivants ?

- A- Faire faire du sport au malade
- B- Conseiller au malade de garder le lit jusqu'à l'assèchement de l'ascite
- C- Faire faire la courbe des urines et surveiller la coloration des urines
- D- Laisser le médecin dépister l'apparition des signes cliniques signant l'évolution vers une insuffisance hépatique

Q12. Quelle est la classe thérapeutique du Lasilix ?

- A- Anxiolytique
- B- Antibiotique
- C- Diurétique de l'anse

Q13. Relevez parmi les suivants 3 examens paracliniques à pratiquer avant son administration.

- A- Ionogramme sanguin et urinaire
- B- Hémogramme suivi d'un antibiogramme
- C- ECG
- D- Clearance de la créatinine

Q14. Parmi les suivants, relevez deux signes d'efficacité recherchés dans l'administration du Lasilix.

- A- Calmer rapidement la douleur
- B- Augmenter la diurèse
- C- Faciliter la déglutition des autres médicaments
- D- Baisse du poids et fonte des œdèmes

Q15. L'affection de M. Goly peut évoluer vers une insuffisance hépatique. Quels sont les deux signes cliniques à dépister lors de la surveillance et qui signent cette évolution parmi les suivants ?

- A- Apparition de petites hémorragies
- B- Coloration jaune des téguments
- C- Trouble de la conscience et neurologique
- D- L'alcoolisme

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE MÉDECINE

Q16. La prévention de l'hépatite B vise 3 objectifs parmi les suivants ; lesquels ?

- A- Dissiper l'anxiété du client au bout des 24 heures
- B- Interrompre la chaîne de transmission
- C- Que le malade retrouve le plus tôt possible l'autonomie
- D- Protéger tout individu à haut risque par un vaccin
- E- Restaurer le plus tôt possible l'appétit du malade
- F- Utiliser l'immunisation passive pour les individus non protégés

Q17. Parmi les propositions suivantes, relever celles correspondant à des objectifs de soins relatifs à la satisfaction du besoin fondamental d'ordre sociologique de M. SORO.

- A- Aider le patient (M. SORO) à retrouver le plus tôt possible l'autonomie
- B- Renforcer la confiance de SORO à l'assurance de la guérison
- C- Permettre une respiration normale de M. SORO
- D- Dissiper l'anxiété du patient au bout des 24 heures

Q18. La nature de soin approprié pour atteindre les objectifs fixés est :

- A- Soins promotionnels
- B- Soins relationnels et éducatifs
- C- Soins palliatifs

Q19. Que décrit un objectif de soin ?

- A- Comportement attendu du malade par l'infirmier ou le soignant après les soins
- B- Activités précises menées par l'infirmier auprès du patient
- C- L'accueil réservé par tous les soignants aux malades

Q20. En votre qualité d'infirmier(e), quel est votre rôle auprès de M. Goly ?

- A- Amener M. GOLY à accepter et respecter le sevrage absolu et définitif de l'alcool
- B- Faire sortir M. GOLY de l'hôpital le plus tôt possible
- C- Surveiller la coloration et la consistance des selles
- D- Imposer au malade de rester au lit jusqu'à l'assèchement de l'ascite
- E- Prévenir les complications de décubitus en mobilisant régulièrement le malade

Q21. Dans la dysenterie amibienne, l'agent pathogène est :

- A- Entamoeba histolytica
- B- Shigelle
- C- Ankylostome

Q22. Les objectifs du traitement de l'ulcère gastroduodénal sont :

- A- Obtenir la sédation rapide de la douleur
- B- Conseiller au malade d'éviter la consommation d'alcool, du tabac et de l'aspirine
- C- Permettre la cicatrisation
- D- Encourager le malade à pratiquer un sport doux
- E- Éviter ou prévenir les récurrences

Q23. Retrouvez les signes cliniques de l'amibiase hépatique parmi les suivants.

- A- Diarrhée glairo-sanguinolente
- B- Hyperthermie à 39–40 °C
- C- Gros foie douloureux à la palpation
- D- Coloration jaune des yeux et des mains
- E- Douleur intense de la région hépatique irradiant en bretelle à l'épaule droite

Q24. Les besoins fondamentaux relevés au cours d'une amibiase intestinale sont : éliminer, se mouvoir et se maintenir en position convenable, éviter le danger... Dans votre planification infirmière, une des interventions infirmières à la résolution du besoin d'éliminer est :

- A- Le patient va au besoin selon un rythme normal
- B- Dans les 24 h qui suivent, le patient devra être capable d'éliminer les déchets biologiques
- C- L'infirmier assure la prise des médicaments régulièrement

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE MÉDECINE

Q25. La recherche du parasite responsable de l'amibiase intestinale nécessite un examen de selles, lequel parmi les suivants ?

- A- Coproculture
- B- Kyste amibe œuf parasite
- C- Recherche de sang dans les selles

Q26. Dans la prise en charge de la lèpre, l'OMS préconise une thérapie. Comment l'appelle-t-on ?

- A- Antibiothérapie massive
- B- Polychimiothérapie
- C- Déparasitage de masse

Q27. Quels sont les médicaments recommandés dans le traitement de la lèpre ?

- A- Association de rifampicine – clofazimine – dapsone
- B- Association rifamycine – clofazimine – rifampicine
- C- Association Novalgine – dexaméthasone et ceftriaxone

Q28. Parmi les médicaments du traitement de la lèpre, deux font l'objet de supervision dans leur prise par le client.

- A- La clofazimine et la rifampicine
- B- Dexaméthasone et ceftriaxone
- C- La clofazimine – la dapsone

Q29. Quelles sont les propositions justes parmi les suivantes concernant l'asthme ?

- A- L'asthme se manifeste par une dyspnée inspiratoire
- B- L'asthme se manifeste par une dyspnée expiratoire
- C- Cette dyspnée est à recrudescence nocturne
- D- Une toux est souvent associée à la dyspnée
- E- L'amélioration des symptômes d'asthme est souvent spontanée ou facilitée par les bronchodilatateurs

Q30. La voie de contamination prédominante du sida est :

- A- L'allaitement maternel
- B- La voie sanguine
- C- La voie transplacentaire
- D- La voie sexuelle

Q31. La mise au point d'un vaccin contre le sida s'avère difficile car :

- A- Le VIH est un rétrovirus
- B- Le VIH s'attaque au système immunitaire de l'individu
- C- Le VIH effectue des mutations fréquentes
- D- Le VIH est différent d'un individu à l'autre

Q32. Le sida est une :

- A- Pandémie
- B- Épidémie
- C- Épidémie
- D- Endémie

Q33. Indiquez le ou les signes cliniques que l'on observe habituellement dans la dysenterie à Shigella (dysenterie bacillaire).

- A- Fièvre
- B- Diarrhée glaireuse, sanglante
- C- Douleurs abdominales
- D- Éruption cutanée
- E- Ulcérations de la muqueuse colique en carte de géographie

Q34. Indiquer parmi les signes suivants les 3 qui caractérisent le syndrome dysentérique.

- A- Des douleurs abdominales intenses avec sensations de pesanteur
- B- Des épreintes
- C- Des ténesmes
- D- Une diarrhée faite de glaire muco-sanguinolente
- E- Une diarrhée afécale avec en moyenne plus de 10 selles par jour
- F- Des vomissements suivis d'une déshydratation

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE MÉDECINE

QUESTIONS À CHOIX DIRECT (Répondre A pour la réponse juste et B pour faux)

- Q35. Le plus souvent, c'est la combinaison de divers symptômes qui rend la situation du malade en situation palliative insupportable.
- Q36. En soins palliatifs, l'absence des autres symptômes rend impossible le soulagement du symptôme apparent.
- Q37. L'anxiété est un état de désarroi psychique ressenti en face d'une situation, et s'accompagnant d'un sentiment d'insécurité.
- Q38. En médecine palliative, la sédation est l'intention de soulager d'une souffrance réfractaire sans accord du patient ou à sa demande.
- Q39. En médecine palliative, la mort peut survenir mais n'est pas recherchée.
- Q40. L'euthanasie est pénalisée dans les pays francophones dont la Côte d'Ivoire.
- Q41. En soins palliatifs, l'euthanasie a pour intention le refus de mettre fin à la vie du patient à sa demande ou à la demande d'un tiers.
- Q42. En soins palliatifs, la sédation et l'euthanasie ont pour finalité commune de mettre un terme à une situation jugée insupportable par le patient.
- Q43. Les formes cliniques du paludisme couramment rencontrées sont l'accès de reviviscence, le neuropaludisme et le paludisme viscéral évolutif.
- Q44. Le VIH ne se transmet pas par les baisers, même avec la langue.
- Q45. Le rapport vaginal, anal et la fellation peuvent transmettre le virus.
- Q46. Le cunnilingus, les caresses et la masturbation ne transmettent pas.
- Q47. La pilule contraceptive protège contre le VIH.
- Q48. La pilule protège contre les grossesses et les infections sexuellement transmissibles.
- Q49. Le préservatif, le dépistage et les traitements comme la PrEP sont les trois méthodes principales pour se protéger du VIH.
- Q50. Le syndrome vipérin (Viperidae) provoque des saignements internes ou externes dus à des troubles de la coagulation.
- Q51. Les effets des venins de serpents vipéridés et élapidés sont très différents.
- Q52. Pour le traitement antituberculeux standard, la phase initiale dure 4 mois.
- Q53. Le traitement de la phase initiale de la tuberculose comprend les médicaments suivants : rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol.
- Q54. L'infarctus du myocarde est une douleur angineuse intolérable d'irradiation multiple insensible à la nitroglycérine sublinguale.
- Q55. L'énurésie est une miction incontrôlée qui survient au cours du sommeil.
- Q56. La chylurie est la présence de lymphes dans les urines donnant un aspect laiteux lié à une affection parasitaire ou consécutive à une intervention chirurgicale.
- Q57. Le liquide céphalo-rachidien a pour rôle d'assurer la protection mécanique du cerveau et de la moelle épinière.
- Q58. Le liquide céphalo-rachidien a pour rôle d'assurer le maintien de l'homéostasie cérébrale.
- Q59. Le solde hydrique est la somme des entrées et des sorties lors d'une hydratation vasculaire.
- Q60. Le diagnostic de la lipothymie se fait par constat d'une perte de connaissance brève et spontanée suivie de convulsions.

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

QCM

1. Nouveau-né GG, sexe masculin, est âgé de 5 jours. Il vit avec sa mère à Grand Yapo. La mère réalise les soins du cordon avec une décoction de plante traditionnelle. L'examen somatique de GG est normal. La réalité personnelle de GG comporte :

- | | |
|---|-------------------------|
| a | 4 données de dépendance |
| b | 5 données de dépendance |
| c | 3 données de dépendance |
| d | 2 données de dépendance |

2. L'échographie réalisée au premier trimestre de la grossesse vise les objectifs suivants sauf un. Cocher l'intrus.

- | | |
|---|---|
| a | Confirmer la grossesse |
| b | Estimer le risque trisomie |
| c | Apprécier l'activité cardiaque de l'embryon |
| d | Rechercher des malformations |

3. Les signes suivants sont ceux du kwashiorkor sauf un. Lequel ?

- | | |
|---|----------------------------|
| a | Enfant grognon |
| b | Ulcération et desquamation |
| c | Alopécie |
| d | Bouffissure du visage |

4. Durant la prise en charge de l'enfant malnutri, je surveille tous les paramètres suivants sauf un. Cocher ce paramètre.

- | | |
|---|--------------------------|
| a | Le retour de l'appétit |
| b | La prise de poids |
| c | La guérison des lésions |
| d | La régression des œdèmes |

5. Les cellules qui produisent le lait maternel sont appelées :

- | | |
|---|--------------------------|
| a | Cellules souches |
| b | Cellule épidermique |
| c | Cellules épithéliales |
| d | Cellules myoépithéliales |

6. BH est âgé de 2 ans et pèse 12 kg. Il est correctement nourri. Sa surface corporelle est estimée à :

- | | |
|---|--------|
| a | 0,2 m² |
| b | 0,4 m² |
| c | 0,5 m² |
| d | 0,6 m² |

7. L'infection bactérienne du nouveau-né précoce survient entre :

- | | |
|---|----------------|
| a | 0 et 7 jours |
| b | 7 et 8 jours |
| c | 8 et 16 jours |
| d | 16 et 28 jours |

8. Vous collaborez à la réalisation des examens suivants en cas de fièvre aiguë, sauf un, lequel ?

- | | |
|---|----------------------------------|
| a | Hémoculture |
| b | ECBU |
| c | Analyse LCR |
| d | Sérodiagnostic de Widal et Félix |

9. Un enfant qui fait de la fièvre avec une bonne tolérance présente :

- | | |
|---|------------------------|
| a | Une conscience altérée |
| b | Des marbrures |
| c | Un faciès vultueux |
| d | Un teint grisâtre |

10. Une femme rhésus négatif accouche d'un enfant rhésus positif. Elle n'a pas eu le sérum anti-D. Dans une telle situation, le nouveau-né :

- | | |
|---|--|
| a | Doit téter les seins comme les autres enfants |
| b | Ne doit pas téter les seins comme les autres enfants |
| c | Doit être nourri au biberon |
| d | Doit recevoir le sérum antitétanique en sous-cutané |

11. Les facteurs de risque de survenue des convulsions, liés à l'enfant, sont les suivants, sauf un, lequel ?

- | | |
|---|---------------------------|
| a | Faible poids de naissance |
| b | Céphalématome |
| c | Traumatisme crânien |
| d | Malnutrition |

12. Les rôles de collaboration dans la prise en charge des convulsions sont :

- | | |
|---|--|
| a | Administrer le diazépam |
| b | Récupérer des résultats de laboratoire |
| c | Prendre une voie veineuse |
| d | Aider la mère à allaiter |

13. ML est âgé de 36 mois, sa mère l'amène aux urgences pour une diarrhée glaireuse. Le germe probable à l'origine de cette diarrhée est :

- | | |
|---|-------------------|
| a | Shigelles |
| b | Escherichia coli |
| c | Vibron cholérique |
| d | Rotavirus |

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

14. La mère de JK n’a pas respecté la prescription médicale et il présente, 4 jours plus tard, un poids de 8 kg, les yeux enfoncés, la bouche sèche et des signes évidents de déshydratation. Quelle est la quantité de SRO à administrer ?

a	500 ml
b	400 ml
c	600 ml
d	700 ml

15. La diarrhée aiguë concerne l’émission d’au moins 3 selles liquides par 24 heures depuis moins de :

a	21 jours
b	14 jours
c	10 jours
d	8 jours

16. Le plan de traitement des signes sévères de déshydratation est le :

a	Plan A
b	Plan B
c	Plan C
d	Plan D

17. DG est incapable de nouer les lacets de sa paire de tennis mais s’habille seul et raconte des petites histoires. Je conclus que DG est âgé de :

a	2 ans
b	3 ans
c	4 ans
d	5 ans

18. Les propositions suivantes concernent les signes d’un enfant souffrant de marasme. Cochez la proposition qui est retrouvée au stade de début de cette maladie.

a	Fonte grasseuse et musculaire
b	Retard pondéral inférieur à 60 % du poids idéal théorique
c	Affamé et porte le doigt à la bouche
d	Alopécie avec le reste des cheveux normaux non décolorés

19. Les propositions suivantes sont relatives à la bonne pratique de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance sauf une. Cocher cette proposition.

a	Essuyer l’enfant
b	Vérifier la respiration
c	Porter un bonnet
d	Pincer le mamelon

20. Les séquelles neurologiques et neurosensorielles au cours du paludisme sont les suivantes sauf une, laquelle ?

a	Paralysie
b	Troubles du tonus
c	Myosite
d	Hypoacousie

21. Le paludisme grave est causé par l’espèce plasmodiale suivante :

a	Vivax
b	Ovale
c	Knowlésie
d	Falciparum

22. Les facteurs de mauvais pronostic au cours de la méningite purulente sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Âge de moins de 5 ans
b	Virulence du germe
c	Malnutrition
d	Retard de diagnostic et prise en charge

23. Les principaux virus responsables des infections respiratoires aiguës sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Virus para influenzae
b	Herpès simplex virus
c	Rhinovirus
d	Virus respiratoire syncytial

24. Ces affirmations concernant la bronchiolite sont justes sauf une. Laquelle ?

a	Causée par le virus respiratoire syncytial
b	Respiration sifflante
c	Fièvre et rhume
d	Plus fréquent après 2 ans

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

QCD

25. Laisser l'enfant avec sa mère 10 heures par jour est l'une des conditions de l'initiative Hôpitaux Amis des Bébé (IHAB).

a	b
Vrai	Faux

26. L'électrophorèse de l'hémoglobine fait partie du bilan prénatal recommandé.

a	b
Vrai	Faux

27. Le nourrisson allaité qui émet 3 à 4 selles par jour souffre d'une diarrhée aiguë.

a	b
Vrai	Faux

28. La lèvre inférieure du bébé éversée et l'aréole peu visible en haut est un critère de bon positionnement au sein.

a	b
Vrai	Faux

29. Le surfactant est un film tensioactif sécrété par les cellules pneumocytes I des poumons.

a	b
Vrai	Faux

30. L'entérocolite est un problème lié à la prématurité.

a	b
Vrai	Faux

31. Le manque de soutien psychologique de la mère est un facteur de déclin de l'allaitement exclusif.

a	b
Vrai	Faux

39. L'enveloppement humide est un rôle propre de l'agent de santé dans la prise en charge de la fièvre chez l'enfant.

a	b
Vrai	Faux

40. Des crises convulsives subintrantes sans reprise de la conscience intercritique réalisent un état de mal convulsif.

a	b
Vrai	Faux

41. L'hyperparasitémie supérieure à 4 % chez le sujet immun est un critère clinique de gravité du paludisme grave.

a	b
Vrai	Faux

42. JL a 4 ans, il présente seulement une fièvre et 2 vomissements ce jour. Le TDR paludisme réalisé est positif. Le traitement à administrer est l'artéméther injectable.

a	b
Vrai	Faux

43. Le stress et le manque d'affection favorisent les vomissements du nourrisson.

a	b
Vrai	Faux

44. Le temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes est un signe de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

45. Les téguments chauds et érythrosiques sont des signes de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

46. Le syndrome extrapyramidal qui survient chez l'enfant après administration de l'antiémétisant se traite avec du diazépam.

a	b
Vrai	Faux

47. Le nourrisson présentant une diarrhée aiguë sans signe de déshydratation boit avec avidité.

a	b
Vrai	Faux

48. L'Haemophilus influenzae est l'un des principaux germes responsables de la méningite bactérienne.

a	b
Vrai	Faux

49. Devant une fièvre aiguë, vous collaborez avec le médecin à la réalisation d'un tubage gastrique BK.

a	b
Vrai	Faux

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

50. La goutte épaisse et le frottis sanguin réalisés au lit du malade apportent la confirmation du paludisme à *Plasmodium falciparum*.

a	b
Vrai	Faux

51. La réaction fébrile postvaccinale est une étiologie des fièvres aiguës.

a	b
Vrai	Faux

52. La méningite est l’inflammation aiguë des méninges par des bactéries, responsable d’une suppuration donnant au liquide céphalorachidien un aspect clair.

a	b
Vrai	Faux

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

QCM

1. L'un des critères du logement visant principalement la protection contre la contagion est :

- a. L'approvisionnement en eau potable et en eau courante
- b. La construction avec des matériaux appropriés
- c. La possibilité d'assurer l'hygiène du logement
- d. Une température adéquate dans les chambres

2. Quels critères servent principalement à sélectionner un problème prioritaire de santé ?

- a. L'ampleur
- b. La gravité
- c. La vulnérabilité aux interventions
- d. L'ancienneté du responsable
- e. La taille du bâtiment sanitaire

3. Parmi les méthodes suivantes de traitement des ordures ménagères, laquelle pollue directement l'air lorsqu'elle est mal maîtrisée ?

- a. Le recyclage
- b. L'incinération
- c. Le compostage
- d. Le stockage contrôlé

4. Le système national de santé ivoirien est organisé :

- a. En deux niveaux et trois versants
- b. En trois niveaux et deux versants
- c. En trois niveaux et trois versants
- d. En deux niveaux et deux versants

5. Un goulot entre l'utilisation des services et la couverture adéquate signifie principalement que :

- a. Le service est géographiquement inaccessible
- b. Les intrants n'ont jamais été disponibles
- c. Les bénéficiaires utilisent le service sans recevoir complètement la prestation selon les normes
- d. La population ignore l'existence du service

6. La pollution de l'eau provoquée par les activités d'orpaillage clandestin est classée principalement comme une pollution :

- a. Domestique
- b. Agricole
- c. Diffuse
- d. Industrielle ou minière

7. Quelles fonctions relèvent du district sanitaire ?

- a. Coordonner les activités sanitaires
- b. Élaborer seul la politique nationale
- c. Appuyer la mise en œuvre des soins de santé primaires
- d. Suivre et évaluer les structures périphériques
- e. Autoriser la mise sur le marché des médicaments

8. Les trois actions fondamentales de l'hygiène appliquée à un milieu sont :

- a. Le nettoyage
- b. Le stockage
- c. Le ramassage
- d. La désinfection
- e. Le compostage
- f. La conservation dans un état de propreté

9. Disponibilité 65 %, accessibilité 70 %, utilisation 80 %, couverture adéquate 50 % et couverture effective 30 %. À quels niveaux observe-t-on une diminution, donc un goulot ?

- a. Entre la cible et la disponibilité
- b. Entre la disponibilité et l'accessibilité
- c. Entre l'accessibilité et l'utilisation
- d. Entre l'utilisation et la couverture adéquate
- e. Entre la couverture adéquate et la couverture effective

10. La lutte défensive contre les rongeurs repose principalement sur :

- a. L'utilisation des pièges
- b. L'utilisation du chat
- c. L'élimination des ordures et des sources de nourriture
- d. L'emploi de germes microbiens

11. Deux régions reçoivent chacune dix sages-femmes. La première est déjà bien dotée ; la seconde, rurale, présente une forte mortalité maternelle et un déficit important en personnel. Quelle appréciation est la plus juste ?

- a. La répartition est équitable parce que les effectifs sont identiques
- b. Elle est inéquitable parce qu'elle ne tient pas compte des besoins différents
- c. Elle est efficiente parce qu'aucune région n'est exclue
- d. Elle est acceptable si les établissements sont de même catégorie

12. La conférence internationale ayant consacré la stratégie des soins de santé primaires s'est tenue :

- a. Du 4 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata
- b. Du 6 au 12 septembre 1978 à Ata-Alma
- c. Du 6 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata
- d. Du 8 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata

13. Deux districts atteignent l'objectif de 95 % de couverture vaccinale. Le district A mobilise deux équipes et 2 millions de FCFA ; le district B, quatre équipes et 5 millions. Comment comparer leurs performances ?

- a. Seul A est efficace, car il utilise moins d'équipes
- b. Seul B est efficace, car il mobilise davantage de ressources
- c. Les deux sont efficaces et également efficaces
- d. Les deux sont efficaces, mais A est plus efficient

14. Le niveau principal de mise en œuvre opérationnelle des activités de soins de santé primaires est :

- a. Le niveau central
- b. Le niveau intermédiaire
- c. Le niveau périphérique

15. Un flacon multidose de vaccin liquide ouvert peut être réutilisé si :

- a. Sa date de péremption n'est pas dépassée
- b. Sa PCV n'a pas atteint le point de rejet
- c. Les conditions de conservation et d'asepsie ont été respectées
- d. Il a été immergé dans l'eau
- e. Son étiquette est devenue illisible

16. Le démarrage effectif des activités de soins de santé primaires à la base du secteur de santé rurale de Bouaflé date de :

- a. 1991
- b. 1993
- c. 1994
- d. 1996

17. Le ministère recrute des infirmiers, construit des centres et acquiert des vaccins. Ces activités relèvent principalement de :

- a. La mobilisation des ressources
- b. La gouvernance du système
- c. Le financement de la santé
- d. La prestation des services

18. Parmi les obstacles à la communication suivants, lequel est principalement lié au récepteur ?

- a. Le mauvais accueil
- b. Le non-respect des autres
- c. Le refus du message
- d. Un message inapproprié

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

19. Quels vaccins sont particulièrement sensibles à la lumière ?

- a. BCG
- b. RR
- c. VAA
- d. Penta
- e. Td

20. Lequel des éléments suivants n'est pas, en lui-même, l'une des huit composantes essentielles des soins de santé primaires ?

- a. L'approche préventive
- b. La promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles
- c. L'approvisionnement suffisant en eau saine et l'assainissement de base
- d. La protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale
- e. La fourniture de médicaments essentiels

21. Quelles sources sont directement utiles au monitoring de la vaccination ?

- a. Le registre de vaccination
- b. La fiche de stock des vaccins
- c. Le relevé de température du réfrigérateur
- d. Le registre de consultation curative
- e. Le cahier de présence des élèves

22. Le but principal de la mobilisation communautaire est de :

- a. Améliorer automatiquement le bien-être de la société
- b. Influencer uniquement un changement de politique
- c. Réaliser un but social commun grâce aux efforts de tous
- d. Définir les besoins sans organiser l'action collective

23. Un centre possède le personnel et le matériel nécessaires au dépistage du cancer du col. Le besoin est reconnu, mais les femmes utilisent très peu le service. Cette situation correspond à :

- a. Aucun besoin identifié et aucune réponse
- b. Un besoin ressenti et exprimé sans réponse
- c. Un besoin identifié avec une réponse disponible, mais une demande faible
- d. Une demande supérieure à une offre pleinement utilisée

24. Lequel des éléments suivants constitue surtout un obstacle à la participation communautaire ?

- a. La méfiance au cours d'un échange interpersonnel
- b. Le mauvais accueil d'un usager
- c. Le non-respect d'un interlocuteur
- d. Les rivalités entre villages

25. Un nourrisson de 14 semaines a reçu DN-Hep B, BCG et VPO0 à la naissance, mais aucun vaccin depuis. Sans contre-indication, il faut aujourd'hui :

- a. Administrer directement les troisièmes doses selon son âge
- b. Commencer les premières doses de Penta, VPO, PCV13, Rota et VPI, puis poursuivre selon les intervalles
- c. Administrer seulement les vaccins de 14 semaines
- d. Attendre 24 semaines pour reprendre avec le VAA-1

26. Parmi les fiches suivantes, quelles sont les deux fiches de comptage habituellement remplies de façon hebdomadaire ?

- a. Morbidité
- b. Accouchement
- c. Consultations pré- et postnatales
- d. Cabinet dentaire
- e. Planification familiale
- f. Réhydratation

27. Un nourrisson de 9 mois présentant des signes avérés de SIDA n'a reçu ni BCG ni vaccin antiamaril ; ses autres vaccins sont à jour. Il faut :

- a. Administrer tous les vaccins de 9 mois, y compris BCG et VAA
- b. Différer tous les vaccins
- c. Ne pas administrer BCG et VAA, mais donner les autres vaccins indiqués
- d. Administrer uniquement VAA et Men A

28. L'ensemble des actions mises en œuvre pour maîtriser ou résoudre un problème de santé détecté constitue :

- a. Le seuil épidémique
- b. La riposte
- c. Le seuil d'action
- d. Le seuil d'alerte

29. Une femme a reçu Td1, Td2 quatre semaines plus tard et Td3 six mois après. Elle revient exactement un an après Td3. Quelle proposition est correcte ?

- a. Elle doit recevoir Td4, qui porte la protection à dix ans
- b. Elle doit recevoir Td5
- c. Elle ne doit recevoir aucune dose avant cinq ans
- d. Elle doit recommencer par Td1

30. La surveillance intégrée de la maladie et la riposte (SIMR) vise notamment à :

- a. Collecter les données épidémiologiques
- b. Analyser et interpréter les données
- c. Détecter des situations inhabituelles
- d. Mesurer les changements dans le temps

31. Un enfant de 30 mois a reçu uniquement Penta1 et VPO1 au cours de sa première année. Il faut :

- a. Recommencer toutes les séries
- b. Poursuivre sans recommencer, donner en priorité les vaccins dus après 9 mois et programmer la suite selon les intervalles
- c. Donner uniquement Penta2 et VPO2 puis attendre 59 mois
- d. Le considérer comme complètement vacciné

32. À 6 semaines, un nourrisson reçoit Penta1, VPO1, PCV13-1 et Rota1, mais VPI1 est oublié. Selon les dispositions enseignées, il faut :

- a. Administrer VPI1 dès le lendemain
- b. Attendre 14 semaines et administrer directement VPI2
- c. Programmer le vaccin oublié au moins quatre semaines après le contact incomplet
- d. Ne plus administrer VPI1

QCD

33. Une forte couverture vaccinale suffit, à elle seule, pour conclure à une bonne gestion des vaccins et des stocks.

- a. Vrai b. Faux

34. Une eau potable se caractérise uniquement par trois qualités physiques.

- a. Vrai b. Faux

35. En monitoring, les indicateurs servent à mesurer le niveau atteint par les différents déterminants de couverture.

- a. Vrai b. Faux

36. Le mode de transmission du paludisme par le moustique Anopheles femelle est une transmission mécanique.

- a. Vrai b. Faux

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

37. Lorsque le taux de perte d'un vaccin augmente, son facteur de perte augmente également.

a. Vrai b. Faux

38. Le niveau périphérique de la pyramide sanitaire ivoirienne est chargé d'élaborer la politique nationale de santé.

a. Vrai b. Faux

39. Une catastrophe est une situation d'urgence dont les effets dépassent les capacités de réponse de la communauté touchée.

a. Vrai b. Faux

40. Les vaccins reconstitués non utilisés peuvent être conservés jusqu'à la séance suivante si la chaîne du froid a été respectée.

a. Vrai b. Faux

41. La communication pour le changement social et comportemental et le plaidoyer poursuivent exactement la même finalité et s'adressent aux mêmes publics.

a. Vrai b. Faux

42. La couverture adéquate correspond à la proportion de la population cible ayant bénéficié de l'activité selon l'intensité et la fréquence requises.

a. Vrai b. Faux

43. Les bruits intenses ou prolongés peuvent entraîner des lésions organiques de l'appareil auditif.

a. Vrai b. Faux

44. Un goulot d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services signifie qu'une partie de la population peut accéder au service, mais ne l'utilise pas.

a. Vrai b. Faux

ÉTUDE DE CAS

Le CSR d'Akakro, situé dans le district sanitaire de Bongouanou, desservait une population de 14 600 habitants en 2024. Le taux d'accroissement annuel (TAA) de cette population est estimé à 2,5 %. Dans le cadre de l'évaluation de ses performances, l'équipe du centre procède, en 2026, au monitoring des activités de vaccination, puis à la budgétisation des ressources propres de l'établissement. À la veille de ces opérations, le solde bancaire s'élève à 3 840 000 FCFA. Ce montant ne tient pas compte des intérêts bancaires, estimés à 48 000 FCFA, mais inclut 27 000 FCFA d'agios. Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels représentent 35 % du solde bancaire avant mouvement, tandis que celles provenant des actes de santé correspondent à 45 % du solde après mouvement. Les dépenses obligatoires représentent un cinquième des ressources propres. Concernant le vaccin Penta, l'inventaire fait état de 620 doses, dont 80 présentent une PCV au point de rejet et 60 sont arrivées à expiration avant la période d'utilisation. Au cours de l'année, 800 enfants ont reçu le BCG, 840 le Penta1, 720 le Penta2, 630 le Penta3 et 600 le vaccin RR. Par ailleurs, l'analyse des données de morbidité révèle que 900 personnes étaient déjà connues comme hypertendues au début de l'année 2026. Durant cette même année, 420 nouveaux cas d'hypertension artérielle ont été diagnostiqués et 12 décès imputables à cette maladie ont été enregistrés parmi l'ensemble des personnes hypertendues suivies.

45. Le solde bancaire après mouvement correspond nécessairement au montant des ressources propres à budgétiser.

a. Vrai b. Faux

46. Les agios constituent une recette du centre au même titre que les intérêts bancaires.

a. Vrai b. Faux

47. Les 620 doses inventoriées doivent être entièrement déduites du besoin réel pour déterminer la quantité à commander.

a. Vrai b. Faux

48. Le montant des dépenses de fonctionnement local est de :

- a. 2 417 760 FCFA
- b. 2 438 160 FCFA
- c. 2 465 160 FCFA
- d. 2 492 160 FCFA

49. Le taux d'abandon de Penta est de :

- a. 20,00 %
- b. 23,81 %
- c. 25,00 %
- d. 33,33 %

50. Le besoin réel annuel en vaccin Penta est approximativement de :

- a. 2 980 doses
- b. 3 425 doses
- c. 3 725 doses
- d. 4 025 doses

51. La population projetée de l'aire sanitaire en 2026 est approximativement de :

- a. 14 965 habitants
- b. 15 330 habitants
- c. 15 339 habitants
- d. 15 700 habitants

52. Le taux de prévalence de l'hypertension artérielle en 2026 est approximativement de :

- a. 2,74 %
- b. 5,87 %
- c. 8,61 %
- d. 9,14 %

53. Le taux d'incidence de l'hypertension artérielle en 2026 est approximativement de :

- a. 0,91 %
- b. 2,74 %
- c. 5,87 %
- d. 8,61 %

54. Le taux de létalité lié à l'hypertension artérielle en 2026 est approximativement de :

- a. 0,42 %
- b. 0,91 %
- c. 2,74 %
- d. 8,61 %

55. Si le TAA reste constant, l'année approximative de doublement de la population, à partir de 2024, est :

- a. 2048
- b. 2050
- c. 2052
- d. 2054

56. Le taux global d'abandon est de :

- a. 25,00 %
- b. 26,19 %
- c. 28,57 %
- d. 30,00 %