

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Questions à choix double (QCD)

Pour les questions numérotées de 1 à 20, noircir au stylo noir ou bleu la case A si la proposition vous paraît vraie ou la case B si la proposition vous paraît fausse, sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point, une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

1. Devant une MAP sur une grossesse à 33 SA, il faut réaliser la maturation pulmonaire.
2. Dans l'HRP, l'étiologie la plus rencontrée est le traumatisme abdominal.
3. Le diagnostic d'une anémie ne peut être posé qu'à partir de la réalisation de la Numération Formule Sanguine (NFS).
4. La priorité de la réanimation néonatale cardiovasculaire prime sur la réanimation respiratoire.
5. Le test de Kleihauer consiste à rechercher des agglutinines irrégulières après injection d'une dose d'immunoglobuline.
6. Une femme séropositive au VIH ne prenant pas le cotrimoxazole doit recevoir le TPI.
7. Une mère de Rh+ ayant accouché d'un bébé de Rh- doit recevoir une injection d'immunoglobuline anti-D.
8. La salpingite est une complication immédiate des avortements provoqués.
9. L'ovulation est presque toujours précédée d'un pic de la LH.
10. La mortalité maternelle est le décès d'une femme, survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit la cause.
11. Dans la grossesse gémellaire, plus la division est précoce, plus elle peut donner des siamois.
12. Le port du préservatif est un moyen de prévention de la rubéole.
13. La dessiccation est une complication survenant dans la procidence du cordon du 1er degré.
14. Le régime sans sel est recommandé pour les patientes présentant une hypertension artérielle au cours de la grossesse.
15. Dans la grossesse gémellaire monochoriale biamniotique, les fœtus sont toujours de même sexe.
16. Dans l'accouchement de siège, en cas de rétention de la tête dernière, l'attitude de Vermelin est préconisée.
17. La crise d'éclampsie peut survenir après un accouchement.
18. La pré-éclampsie, c'est l'association d'une HTA chronique à une protéinurie significative.
19. L'anémie est définie par un taux d'hémoglobine inférieur à 11 g/dL à tous les trimestres de la grossesse.
20. L'oligoamnios est un facteur de risque de procidence du cordon.

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE

Pour répondre à ces questions, noircir au stylo noir ou bleu la case du ou des items correspondants à la ou aux bonnes réponses, sachant qu'un item correct vaut +1 point, un item incorrect -1 point et aucune réponse 0 point.

21. Parmi les propositions suivantes, une ne fait pas partie des risques tératogènes des anti-inflammatoires non stéroïdiens : laquelle ?

- A. Hydramnios
- B. Insuffisance rénale
- C. Syndrome hémorragique
- D. Fermeture prématurée du canal artériel

22. Dans quelle pathologie le risque de coagulopathie est-il le plus important ? Cochez la bonne réponse.

- A. Placenta prævia
- B. Hématome rétroplacentaire
- C. Rupture utérine
- D. La grossesse extra-utérine

23. Quel germe est le plus souvent rencontré au niveau de la flore vaginale normale ?

- A. Les lactobacilles
- B. Gardnerella vaginalis
- C. Streptocoques du groupe A
- D. Escherichia coli

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

24. Quel est le traitement de référence de la crise d'éclampsie parmi les propositions suivantes ?

- A. Le Valium
- B. Le Célestène
- C. Le sulfate de magnésium
- D. L'Adalate

25. Quel est le geste à faire en cas de procidence du cordon non battant ? Cocher la réponse juste.

- A. Recouvrir le cordon avec des compresses sèches
- B. Installer la patiente en position de Trendelenburg
- C. Privilégier la voie basse
- D. Faire une césarienne en urgence
- E. Hospitaliser la patiente

26. Parmi les propositions suivantes, deux (02) ne font pas partie des complications secondaires des avortements provoqués : lesquelles ?

- A. Endométrite
- B. Tétanos du post-abortum
- C. Perforation utérine
- D. Dyspareunie
- E. Septicémie

27. La pré-éclampsie peut s'accompagner d'une des complications fœtales suivantes : laquelle ?

- A. Un retard de croissance intra-utérin
- B. Une anémie néonatale
- C. Une anasarque fœtoplacentaire
- D. Des ictères néonataux graves

28. Deux (02) gestes ne font pas partie des soins essentiels au nouveau-né. Lesquels ?

- A. Aspiration systématique du nouveau-né
- B. Désinfection oculaire
- C. Injection de dexaméthasone
- D. Soins du cordon
- E. Injection de vitamine K1

29. Parmi les propositions suivantes, deux (02) signes traduisent au mieux la rupture utérine : lesquels ?

- A. BDCF présents
- B. Col cerclé
- C. BDCF absents
- D. Fœtus perçu sous la peau
- E. Matelas placentaire

30. Deux (02) signes ne font pas partie du diagnostic positif de la grossesse extra-utérine non rompue. Lesquels ?

- A. Défense ou contracture abdominale
- B. Masse latéro-utérine
- C. Légères douleurs pelviennes
- D. État général conservé
- E. Choc hypovolémique

31. Concernant la procidence du cordon, quelles sont les deux (02) affirmations fausses ?

- A. Est la chute du cordon en avant de la présentation, membrane intacte
- B. Est la chute du cordon en avant de la présentation, membrane rompue
- C. Le 3e degré correspond à un cordon dans le vagin
- D. Il est important d'apprécier la vitalité fœtale
- E. La dessiccation se rencontre dans la procidence du cordon du 3e degré

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

32. Parmi les propositions suivantes, deux (02) sont des facteurs favorisant la survenue de la grossesse extra-utérine.

- A. Les infections génitales
- B. Le jeune âge maternel
- C. Les implants contraceptifs
- D. Les rapports sexuels à partir de 18 ans
- E. La consommation de tabac

33. La surveillance d'une accouchée récente se fait selon le rythme suivant : choisissez la réponse correcte.

- A. Toutes les 15 min pendant 1 heure puis toutes les 30 min pendant 2 heures
- B. Toutes les 30 min pendant deux heures et toutes les heures pendant 6 h
- C. Toutes les 30 min au cours de la 3e heure
- D. Toutes les heures pendant 6 heures
- E. La surveillance portera principalement sur l'état de conscience de la mère

34. Deux (02) signes font craindre l'imminence d'une crise d'éclampsie chez une femme enceinte hypertendue : lesquels ?

- A. Céphalées
- B. Réduction des mouvements actifs fœtaux
- C. Douleurs à l'épigastre
- D. Augmentation de la fréquence respiratoire
- E. Contractions utérines permanentes

35. Parmi les propositions suivantes, deux (02) sont des causes principales de rupture utérine : lesquelles ?

- A. Antécédent de myomectomie
- B. Abus d'antispasmodiques
- C. Grossesses multiples
- D. Oligoamnios
- E. Pré-éclampsie

36. Parmi les éléments suivants, deux ne font pas partie de la GATPA : lesquels ?

- A. Massage utérin
- B. Traction contrôlée du cordon
- C. Révision utérine
- D. Vidange vésicale
- E. Injection de 10 UI de Syntocinon en IM

37. Parmi les assertions suivantes, deux (02) sont des objectifs des CPN intermédiaires : lesquels ?

- A. Dater la grossesse
- B. Vérifier la bonne évolutivité de la grossesse
- C. Rechercher les facteurs de risque passés inaperçus
- D. Déterminer le pronostic d'accouchement
- E. Établir la déclaration de grossesse

38. Parmi les propositions suivantes, deux (02) mesures préventives sont proposées pour éviter la récurrence de la pré-éclampsie.

- A. Le régime sans sel
- B. La prise de 100 mg d'aspirine par jour jusqu'à 34 semaines
- C. La prise d'un antihypertenseur dès le début de la grossesse
- D. La prise de la tension artérielle à chaque CPN
- E. L'administration d'acide folique au cours de la grossesse
- F. La réalisation d'un ECBU à chaque CPN

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

39. Parmi les propositions suivantes, deux sont en faveur d'un syndrome de prérupture : lesquelles ?

- A. Utérus déformé en sablier
- B. État de choc en rapport avec les saignements
- C. Fœtus palpé sous la peau
- D. Contractions utérines subintrantes
- E. Segment inférieur tendu en sébile de bois

40. Quelle est la dose de charge pour le sulfate de magnésium à administrer en intraveineuse lors de la crise d'éclampsie ?

- A. 2 g en IV lente
- B. 4 g en IV lente
- C. 10 g en IV lente
- D. 5 g en IV lente

41. Parmi les propositions suivantes, une (01) ne fait pas partie des complications mammaires des suites de couches.

- A. Engorgement mammaire
- B. Adénofibrome du sein
- C. Galactophorite
- D. Crevasses

42. Selon les directives nationales, la chimioprophylaxie antipalustre chez la femme enceinte peut débuter à partir de : choisissez la réponse correcte.

- A. 07 SA
- B. 20 SA
- C. 16 SA
- D. 18 SA

43. Quel type d'anémie est souvent associé aux hémoglobinopathies ?

- A. Anémie hypochrome microcytaire
- B. Anémie macrocytaire
- C. Anémie normochrome normocytaire
- D. Anémie ferriprive

44. Quel test permet de dépister la présence d'anticorps irréguliers chez la mère ?

- A. Test de Kleihauer
- B. Test de Coombs direct
- C. Test de Coombs indirect
- D. Test d'agglutination

45. Quel test sérologique est utilisé pour le diagnostic de la syphilis ?

- A. VDRL et TPHA
- B. IgG et IgM
- C. Test de Coombs indirect
- D. Test de Kleihauer

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

QCM

1. Nouveau-né GG, sexe masculin, est âgé de 5 jours. Il vit avec sa mère à Grand Yapo. La mère réalise les soins du cordon avec une décoction de plante traditionnelle. L'examen somatique de GG est normal. La réalité personnelle de GG comporte :

- | | |
|---|-------------------------|
| a | 4 données de dépendance |
| b | 5 données de dépendance |
| c | 3 données de dépendance |
| d | 2 données de dépendance |

2. L'échographie réalisée au premier trimestre de la grossesse vise les objectifs suivants sauf un. Cocher l'intrus.

- | | |
|---|---|
| a | Confirmer la grossesse |
| b | Estimer le risque trisomie |
| c | Apprécier l'activité cardiaque de l'embryon |
| d | Rechercher des malformations |

3. Les signes suivants sont ceux du kwashiorkor sauf un. Lequel ?

- | | |
|---|----------------------------|
| a | Enfant grognon |
| b | Ulcération et desquamation |
| c | Alopécie |
| d | Bouffissure du visage |

4. Durant la prise en charge de l'enfant malnutri, je surveille tous les paramètres suivants sauf un. Cocher ce paramètre.

- | | |
|---|--------------------------|
| a | Le retour de l'appétit |
| b | La prise de poids |
| c | La guérison des lésions |
| d | La régression des œdèmes |

5. Les cellules qui produisent le lait maternel sont appelées :

- | | |
|---|--------------------------|
| a | Cellules souches |
| b | Cellule épidermique |
| c | Cellules épithéliales |
| d | Cellules myoépithéliales |

6. BH est âgé de 2 ans et pèse 12 kg. Il est correctement nourri. Sa surface corporelle est estimée à :

- | | |
|---|--------------------|
| a | 0,2 m ² |
| b | 0,4 m ² |
| c | 0,5 m ² |
| d | 0,6 m ² |

7. L'infection bactérienne du nouveau-né précoce survient entre :

- | | |
|---|----------------|
| a | 0 et 7 jours |
| b | 7 et 8 jours |
| c | 8 et 16 jours |
| d | 16 et 28 jours |

8. Vous collaborez à la réalisation des examens suivants en cas de fièvre aiguë, sauf un, lequel ?

- | | |
|---|----------------------------------|
| a | Hémoculture |
| b | ECBU |
| c | Analyse LCR |
| d | Sérodiagnostic de Widal et Félix |

9. Un enfant qui fait de la fièvre avec une bonne tolérance présente :

- | | |
|---|------------------------|
| a | Une conscience altérée |
| b | Des marbrures |
| c | Un faciès vultueux |
| d | Un teint grisâtre |

10. Une femme rhésus négatif accouche d'un enfant rhésus positif. Elle n'a pas eu le sérum anti-D. Dans une telle situation, le nouveau-né :

- | | |
|---|--|
| a | Doit téter les seins comme les autres enfants |
| b | Ne doit pas téter les seins comme les autres enfants |
| c | Doit être nourri au biberon |
| d | Doit recevoir le sérum antitétanique en sous-cutané |

11. Les facteurs de risque de survenue des convulsions, liés à l'enfant, sont les suivants, sauf un, lequel ?

- | | |
|---|---------------------------|
| a | Faible poids de naissance |
| b | Céphalématome |
| c | Traumatisme crânien |
| d | Malnutrition |

12. Les rôles de collaboration dans la prise en charge des convulsions sont :

- | | |
|---|--|
| a | Administrer le diazépam |
| b | Récupérer des résultats de laboratoire |
| c | Prendre une voie veineuse |
| d | Aider la mère à allaiter |

13. ML est âgé de 36 mois, sa mère l'amène aux urgences pour une diarrhée glaireuse. Le germe probable à l'origine de cette diarrhée est :

- | | |
|---|-------------------|
| a | Shigelles |
| b | Escherichia coli |
| c | Vibron cholérique |
| d | Rotavirus |

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

14. La mère de JK n'a pas respecté la prescription médicale et il présente, 4 jours plus tard, un poids de 8 kg, les yeux enfoncés, la bouche sèche et des signes évidents de déshydratation. Quelle est la quantité de SRO à administrer ?

a	500 ml
b	400 ml
c	600 ml
d	700 ml

15. La diarrhée aiguë concerne l'émission d'au moins 3 selles liquides par 24 heures depuis moins de :

a	21 jours
b	14 jours
c	10 jours
d	8 jours

16. Le plan de traitement des signes sévères de déshydratation est le :

a	Plan A
b	Plan B
c	Plan C
d	Plan D

17. DG est incapable de nouer les lacets de sa paire de tennis mais s'habille seul et raconte des petites histoires. Je conclus que DG est âgé de :

a	2 ans
b	3 ans
c	4 ans
d	5 ans

18. Les propositions suivantes concernent les signes d'un enfant souffrant de marasme. Cochez la proposition qui est retrouvée au stade de début de cette maladie.

a	Fonte graisseuse et musculaire
b	Retard pondéral inférieur à 60 % du poids idéal théorique
c	Affamé et porte le doigt à la bouche
d	Alopécie avec le reste des cheveux normaux non décolorés

19. Les propositions suivantes sont relatives à la bonne pratique de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance sauf une. Cocher cette proposition.

a	Essuyer l'enfant
b	Vérifier la respiration
c	Porter un bonnet
d	Pincer le mamelon

20. Les séquelles neurologiques et neurosensorielles au cours du paludisme sont les suivantes sauf une, laquelle ?

a	Paralysie
b	Troubles du tonus
c	Myosite
d	Hypoacousie

21. Le paludisme grave est causé par l'espèce plasmodiale suivante :

a	Vivax
b	Ovale
c	Knowlésie
d	Falciparum

22. Les facteurs de mauvais pronostic au cours de la méningite purulente sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Âge de moins de 5 ans
b	Virulence du germe
c	Malnutrition
d	Retard de diagnostic et prise en charge

23. Les principaux virus responsables des infections respiratoires aiguës sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Virus para influenzae
b	Herpès simplex virus
c	Rhinovirus
d	Virus respiratoire syncytial

24. Ces affirmations concernant la bronchiolite sont justes sauf une. Laquelle ?

a	Causée par le virus respiratoire syncytial
b	Respiration sifflante
c	Fièvre et rhume
d	Plus fréquent après 2 ans

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

QCD

25. Laisser l'enfant avec sa mère 10 heures par jour est l'une des conditions de l'initiative Hôpitaux Amis des Bébé (IHAB).

a	b
Vrai	Faux

26. L'électrophorèse de l'hémoglobine fait partie du bilan prénatal recommandé.

a	b
Vrai	Faux

27. Le nourrisson allaité qui émet 3 à 4 selles par jour souffre d'une diarrhée aiguë.

a	b
Vrai	Faux

28. La lèvre inférieure du bébé éversée et l'aréole peu visible en haut est un critère de bon positionnement au sein.

a	b
Vrai	Faux

29. Le surfactant est un film tensioactif sécrété par les cellules pneumocytes I des poumons.

a	b
Vrai	Faux

30. L'entérocite est un problème lié à la prématurité.

a	b
Vrai	Faux

31. Le manque de soutien psychologique de la mère est un facteur de déclin de l'allaitement exclusif.

a	b
Vrai	Faux

39. L'enveloppement humide est un rôle propre de l'agent de santé dans la prise en charge de la fièvre chez l'enfant.

a	b
Vrai	Faux

40. Des crises convulsives subintrantes sans reprise de la conscience intercritique réalisent un état de mal convulsif.

a	b
Vrai	Faux

41. L'hyperparasitémie supérieure à 4 % chez le sujet immun est un critère clinique de gravité du paludisme grave.

a	b
Vrai	Faux

42. JL a 4 ans, il présente seulement une fièvre et 2 vomissements ce jour. Le TDR paludisme réalisé est positif. Le traitement à administrer est l'artémether injectable.

a	b
Vrai	Faux

43. Le stress et le manque d'affection favorisent les vomissements du nourrisson.

a	b
Vrai	Faux

44. Le temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes est un signe de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

45. Les téguments chauds et érythrosiques sont des signes de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

46. Le syndrome extrapyramidal qui survient chez l'enfant après administration de l'antiémétique se traite avec du diazépam.

a	b
Vrai	Faux

47. Le nourrisson présentant une diarrhée aiguë sans signe de déshydratation boit avec avidité.

a	b
Vrai	Faux

48. L'Haemophilus influenzae est l'un des principaux germes responsables de la méningite bactérienne.

a	b
Vrai	Faux

49. Devant une fièvre aiguë, vous collaborez avec le médecin à la réalisation d'un tubage gastrique BK.

a	b
Vrai	Faux

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE PÉDIATRIE

50. La goutte épaisse et le frottis sanguin réalisés au lit du malade apportent la confirmation du paludisme à *Plasmodium falciparum*.

a	b
Vrai	Faux

51. La réaction fébrile postvaccinale est une étiologie des fièvres aiguës.

a	b
Vrai	Faux

52. La méningite est l'inflammation aiguë des méninges par des bactéries, responsable d'une suppuration donnant au liquide céphalorachidien un aspect clair.

a	b
Vrai	Faux

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE PLANNING FAMILIAL

Durée : 1 h 30

SUJET I - QUESTIONS À CHOIX DIRECT (QCD)

Consigne : répondre A = Vrai ou B = Faux. Bonne réponse : +1 pt ; mauvaise : -1 pt ; absence : 0.

1. Le pouvoir décisionnel est un élément des six notions-pivots des fonctions sociales du genre.
2. Le genre désigne les rôles, comportements et responsabilités attribués socialement aux hommes et aux femmes.
3. L'utilisatrice de la méthode de Billings doit savoir qu'après l'ovulation la couleur de sa glaire cervicale est mélangée.
4. Le genre permet d'identifier les différences entre les femmes et les hommes.
5. Le sexe est immuable.
6. L'utilisation de tampons à haut pouvoir absorbant en cas de perte légère de sang pendant les menstrues n'est pas un risque pour la santé.
7. La survenue de saignement tous les 21 à 35 jours s'appelle le cycle menstruel.
8. Le soutien social et environnemental est une des composantes de la gestion de l'hygiène menstruelle.
9. Le stock d'alerte = stock minimum + stock de sécurité.
10. Si le centre a plus que le minimum, il est surstocké et risque d'avoir des quantités qui périront avant leur utilisation.
11. La planification familiale est bénéfique pour la population car, sur le plan démographique, elle assure un bon équilibre entre population et ressources et contribue ainsi à résoudre les problèmes de développement.
12. La contraception chirurgicale volontaire est obligatoire chez les femmes ayant des antécédents médico-chirurgicaux ou obstétricaux contre-indiquant la grossesse.
13. Le DIU au cuivre peut être utilisé en contraception d'urgence.
14. La contraception d'urgence consiste à administrer une méthode contraceptive après un rapport sexuel non protégé, dans une période où le couple ne souhaite absolument pas de grossesse.
15. Les contraceptifs oraux combinés diminuent l'effet hypoglycémique.
16. Les COC peuvent être administrés à une allaitante de 6 semaines si elle le désire.
17. Les COC sont classés en 4 groupes en fonction du dosage.
18. Les adolescents et jeunes venant à la consultation ont le droit d'être reçus dans des conditions confortables.
19. Tous les COC contiennent 21 pilules actives.
20. Le fort taux de la prolactine dépend du nombre, de la qualité, de la fréquence et de la durée des tétées.
21. Une cliente qui n'a pas assez de lait ne peut pas faire la MAMA.
22. L'ancrage, les rapports sexuels douloureux et les infections pelviennes sont des complications qui peuvent survenir chez une cliente sous un dispositif intra-utérin.
23. Une cliente sous DIU peut avoir comme effet secondaire l'augmentation de son flux menstruel.
24. Devant une aménorrhée sous DIU, il faut immédiatement penser à une grossesse extra-utérine.
25. Le DIU au cuivre TCu 380 A utilisé en Côte d'Ivoire a une durée d'action allant de 5 à 12 ans.

SUJET II - QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES

Bonne réponse : 1 ; fausse ou incomplète : 0 ; absence : 0.

26. Quel est un bon principe de stockage pour les produits de santé ?

- A. Premier sorti, dernier entré
- B. Dernier entré, premier sorti
- C. Premier entré, premier sorti (PEPS / FIFO)
- D. Empiler les produits pour gagner de la place

27. Pour utiliser la Méthode des Jours Fixes, les femmes doivent avoir des cycles de quelle durée ?

- A. Inférieurs à 26 jours
- B. De 26 à 32 jours
- C. Supérieurs à 32 jours
- D. N'importe quelle durée de cycle

28. Comment la glaire cervicale se présente-t-elle à l'approche de l'ovulation ?

- A. Abondante, fine, gluante, filante et translucide
- B. Modérée, épaisse, trouble (jaune)
- C. Augmentée, un peu épaisse, glissante, opaque, peu abondante et non filante
- D. Minimale, épaisse (collante), trouble

29. Les outils ou paramètres d'analyse du genre sont : (choisir 3 bonnes réponses)

- A. Les rôles de genre
- B. Le pouvoir décisionnel
- C. Le rôle de production
- D. Le rôle communautaire
- E. L'accès et le contrôle des ressources
- F. Les attentes et l'évaluation sociale

CAS CLINIQUE N° 3 - Dans un lycée d'Abidjan, les garçons sont encouragés à suivre des filières scientifiques tandis que les filles sont orientées vers les filières littéraires et sociales. Aïcha L., brillante élève en mathématiques, souhaite intégrer la série scientifique, mais certains enseignants affirment que « les sciences sont faites pour les garçons ». Elle commence à perdre confiance en elle.

30. Identifiez deux stéréotypes présents dans cette situation.

- A. Les sciences sont réservées aux garçons
- B. Les sciences sont réservées aux filles
- C. Les filles sont patientes et douces
- D. Les filles réussissent mieux dans les matières littéraires
- E. Les hommes sont autoritaires

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE PLANNING FAMILIAL

31. Akissi et Akama sont un couple qui applique la méthode du calendrier ; sachant que le cycle le plus court de Akissi compte 25 jours, à partir de quel jour du cycle de Akissi doit-il se protéger en cas de rapport sexuel afin d'éviter que sa compagne soit enceinte ?

- A. À partir du 5ème jour du cycle
- B. À partir du 6ème jour du cycle
- C. À partir du 7ème jour du cycle
- D. À partir du 8ème jour du cycle

32. Pour une gestion de l'hygiène menstruelle efficace, notre démarche repose sur quatre piliers. Choisissez la bonne combinaison.

- 1. Inclusion ; 2. Durabilité ; 3. Transparence ; 4. Équité.**
- a. Promouvoir des solutions locales et pérennes, telles que la confection artisanale de serviettes hygiéniques réutilisables.
 - b. Garantir un accès universel à une information claire, honnête et adaptée à tous les membres de la communauté.
 - c. Mobiliser l'ensemble des acteurs (femmes, filles, hommes, leaders d'opinion, enseignants et soignants) pour un changement collectif.
 - d. Prioriser les besoins spécifiques des groupes les plus vulnérables, notamment les adolescentes, les femmes rurales et les personnes en situation de handicap.

- A. (1 ; d), (2 ; c), (3 ; a), (4 ; b)
- B. (1 ; c), (2 ; a), (3 ; b), (4 ; d)
- C. (1 ; a), (2 ; d), (3 ; b), (4 ; c)
- D. (1 ; b), (2 ; a), (3 ; c), (4 ; d)

33. L'implication des hommes dans la gestion de l'hygiène menstruelle permet : (2 bonnes réponses)

- A. De réduire les tabous
- B. De réduire les investissements dans les infrastructures et les produits
- C. D'augmenter les investissements dans les infrastructures et les produits
- D. Améliorer des infrastructures accessibles
- E. D'impliquer les personnes handicapées dans la prise des décisions

34. Quel est l'objectif principal de l'estimation des besoins en produits de santé ?

- A. Réduire le coût d'achat des produits
- B. Éviter les ruptures de stock et les surstocks
- C. Accroître la productivité du personnel
- D. Augmenter les ventes

35. Quelle est la bonne séquence des étapes dans la chaîne logistique pharmaceutique ?

- A. Commande, Réception, Stockage, Distribution
- B. Réception, Stockage, Commande, Distribution
- C. Stockage, Commande, Réception, Distribution
- D. Commande, Distribution, Réception, Stockage

36. L'examen de l'éjaculat pour la vasectomie se fait :

- A. Deux mois après l'intervention
- B. Un mois après l'intervention
- C. Trois mois après l'éjaculat
- D. 20 éjaculats après intervention

37. Les objectifs principaux des soins de suivi des clientes du DIU sont de :

- A. Rechercher un malaise intense dans la partie inférieure de l'abdomen
- B. Renforcer les messages clés concernant le retrait et la durée d'action
- C. Retirer le DIU quand elle le désire ou attendre 12 ans pour le retrait
- D. Surveiller le mois et l'année auxquels le DIU devra être retiré

38. En planification familiale, l'on peut être confronté à des obstacles d'ordre institutionnel tels que :

- A. Le coût des services de PF
- B. Insuffisance de personnel qualifié
- C. Manque ou insuffisances de motivation
- D. Le manque ou insuffisances de moyens financiers

39. Le genre est :

- A. Déterminé par les différences biologiques
- B. Un concept social
- C. Déterminé par les différences de sexe
- D. Concept démographique

40. Les méthodes contraceptives hormonales agissent sur : (choisir 3 bonnes réponses)

- A. Les spermatozoïdes
- B. La glaire cervicale
- C. Les trompes
- D. L'endomètre
- E. L'ovulation

41. L'orientation sexuelle désigne :

- A. L'attirance physique, romantique ou émotionnelle qu'une personne éprouve envers une autre personne
- B. Une personne qui ressent une attirance physique et émotionnelle pour autrui, peu importe son identité de genre
- C. Une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour personne

CAS CLINIQUE N° 2 - Vous recevez Mme Brou pour des douleurs. L'interrogatoire indique qu'elle porte un DIU depuis un an. Après un examen minutieux, vous retenez qu'il s'agit d'une infection de l'endomètre.

42. Quel traitement préconisez-vous ?

- A. Des antidouleurs
- B. Des antibiotiques à spectre large
- C. Des antispasmodiques et du repos
- D. Des antibiotiques et aspirine

43. 48 heures après le bon traitement, il y a une amélioration, quelle décision devez-vous prendre ?

- A. Rassurer la cliente et laisser le DIU en place
- B. Continuer son traitement pendant une semaine
- C. Continuer le traitement pendant 10 jours et laisser le DIU en place
- D. Continuer le traitement et lui proposer une autre méthode pour plus de sécurité

44. Qu'auriez-vous fait si le traitement avait échoué ?

- A. Retirer le DIU et référer Mme Brou
- B. Augmenter la dose du traitement et observer la cliente
- C. Changer le traitement et lui donner un RDV dans 8 jours
- D. Référer tout simplement Mme Brou

45. Dans le post-abortion, le DIU peut être inséré : (choisir les deux bonnes réponses)

- A. Immédiatement après l'avortement
- B. Dans les quatorze (14) premiers jours qui suivent l'avortement après avoir évalué et écarté un risque infectieux
- C. Au-delà de cette période, si on a l'accord de la cliente
- D. À n'importe quel moment après un bon counseling

46. Les éléments ci-dessous sont des complications qui surviennent après la pose d'un dispositif intra-utérin : (choisir les trois bonnes réponses)

- A. Migration du DIU
- B. Augmentation du flux menstruel
- C. Perforation pendant la pose (arrêter la manœuvre)
- D. Rapport sexuel douloureux
- E. Métrorragie

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE PLANNING FAMILIAL

47. Le DIU au cuivre (TCu 380 A) utilisé en CI agit en :

- A. Réduisant le nombre des spermatozoïdes dans le sperme au niveau du col
- B. Altérant les spermatozoïdes, les empêchant de parvenir jusqu'aux trompes
- C. Inactivant et diminuant le nombre de spermatozoïdes atteignant les trompes
- D. Atrophiante l'endomètre, rendant la nidation impossible
- E. Modifiant l'endomètre et provoquant un environnement défavorable à la nidation

48. Dans les caractéristiques de la contraception en post-partum, il est important de savoir que chez la femme non allaitante il faut tenir compte de :

- A. Retour des menstruations dans les 4 semaines
- B. Première ovulation dans une moyenne de 45 jours après l'accouchement
- C. 2 femmes sur 3 vont ovuler avant de revoir les règles
- D. Risque de survenue d'une grossesse : le plus tôt est vingt et un (21) jours

49. Concernant les méthodes contraceptives spécifiques pour les adolescents, dans l'ordre de préférence il faut recommander :

- A. Abstinence - Préservatifs masculin et féminin - Contraception d'urgence - Contraceptifs oraux combinés (COC)
- B. Abstinence - Préservatifs masculin et féminin - Contraceptifs oraux combinés (COC) - Contraception d'urgence
- C. Préservatifs masculin et féminin - Les implants - Les méthodes d'auto-observations - Abstinence
- D. Abstinence - Les injectables - Préservatifs masculin et féminin - Contraceptifs oraux progestatifs (COP)

50. En cas de vasectomie, il faut revoir le client : (choisir 3 bonnes réponses)

- A. Un mois après l'intervention pour l'examen de l'éjaculat
- B. Une semaine après l'intervention pour vérifier son consentement
- C. En cas de fièvre, de saignement au niveau des cicatrices et de douleurs ou inflammation au niveau du scrotum
- D. Un mois après l'intervention pour vérifier l'érection

51. Dans quelle classe de l'OMS se trouve une cliente qui a un cancer de l'endomètre pour les COC ?

- A. Classe 4
- B. Classe 3
- C. Classe 2
- D. Classe 1

52. La plaquette de MICROLUT contient :

- A. 45 comprimés
- B. 35 comprimés
- C. 30 comprimés
- D. 28 comprimés

53. L'un des modes d'action des COP est :

- A. Tue les spermatozoïdes
- B. Bloque le passage des spermatozoïdes dans les trompes de Fallope
- C. Diminue le transport des spermatozoïdes dans les trompes de Fallope

54. L'un des avantages sanitaires de la planification familiale est :

- A. Diminution de la délinquance juvénile
- B. Amélioration de la qualité de la vie
- C. Réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, périnatale et infantile
- D. Bonne hygiène de l'environnement

55. Le moment favorable pour administrer les COC aux clientes :

- A. Qui ont un bon état de santé
- B. À tout moment si elles le désirent
- C. 1 à 7 jours du cycle menstruel
- D. 1 à 5 jours du cycle menstruel

56. Sont énumérés ci-dessous les avantages pour l'enfant de la MAMA sauf un ; lequel ?

- A. Alimentation saine
- B. Bon développement psychomoteur
- C. Permet à la mère de faire des économies
- D. Immunise de façon passive

57. La MAMA est efficace si les conditions suivantes sont réunies (choisir 3 bonnes réponses).

- A. Abondance de lait maternel
- B. Allaitement exclusif
- C. Bonne succion du bébé
- D. Femme aménorrhéique
- E. Post-partum inférieur à 6 mois

58. La C.C.V. se définit comme une intervention (1) ... qui (2) ... et irréversible à (3) ... sans toutefois (4) ... la sexualité et (5) ... la fonction hormonale. Chez la femme, la CCV s'appelle ligature des trompes, chez l'homme c'est la vasectomie. a - Perturber ; b - met fin de façon définitive ; c - Troubler ; d - Chirurgicale ; e - Toute possibilité de reproduction sexuée. Comme vous le constatez, cette définition est incomplète, reconstituez-la en choisissant la bonne association.

- A. (1-d), (2-b), (3-e), (4-c), (5-a)
- B. (1-c), (2-d), (3-e), (4-a), (5-b)
- C. (1-a), (2-b), (3-c), (4-e), (5-d)
- D. (1-b), (2-c), (3-a), (4-e), (5-a)

CAS CLINIQUE N° 1 - Mlle CHIWA est une adolescente de 16 ans, élève, souhaite finir ses études avant de faire des enfants. Elle se rend dans un centre de santé pour rencontrer la sage-femme.

59. Que fera la sage-femme ?

- A. Une consultation
- B. Une causerie éducative
- C. Un counseling
- D. Une communication

60. Choisir un de ses principes de base nécessaires au client.

- A. La liberté de s'exprimer
- B. La maîtrise du sujet
- C. Tirer les leçons du passé
- D. L'éducation par l'exemple

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

QCM

1. L'un des critères du logement visant principalement la protection contre la contagion est :

- a. L'approvisionnement en eau potable et en eau courante
- b. La construction avec des matériaux appropriés
- c. La possibilité d'assurer l'hygiène du logement
- d. Une température adéquate dans les chambres

2. Quels critères servent principalement à sélectionner un problème prioritaire de santé ?

- a. L'ampleur
- b. La gravité
- c. La vulnérabilité aux interventions
- d. L'ancienneté du responsable
- e. La taille du bâtiment sanitaire

3. Parmi les méthodes suivantes de traitement des ordures ménagères, laquelle pollue directement l'air lorsqu'elle est mal maîtrisée ?

- a. Le recyclage
- b. L'incinération
- c. Le compostage
- d. Le stockage contrôlé

4. Le système national de santé ivoirien est organisé :

- a. En deux niveaux et trois versants
- b. En trois niveaux et deux versants
- c. En trois niveaux et trois versants
- d. En deux niveaux et deux versants

5. Un goulot entre l'utilisation des services et la couverture adéquate signifie principalement que :

- a. Le service est géographiquement inaccessible
- b. Les intrants n'ont jamais été disponibles
- c. Les bénéficiaires utilisent le service sans recevoir complètement la prestation selon les normes
- d. La population ignore l'existence du service

6. La pollution de l'eau provoquée par les activités d'orpaillage clandestin est classée principalement comme une pollution :

- a. Domestique
- b. Agricole
- c. Diffuse
- d. Industrielle ou minière

7. Quelles fonctions relèvent du district sanitaire ?

- a. Coordonner les activités sanitaires
- b. Élaborer seul la politique nationale
- c. Appuyer la mise en œuvre des soins de santé primaires
- d. Suivre et évaluer les structures périphériques
- e. Autoriser la mise sur le marché des médicaments

8. Les trois actions fondamentales de l'hygiène appliquée à un milieu sont :

- a. Le nettoyage
- b. Le stockage
- c. Le ramassage
- d. La désinfection
- e. Le compostage
- f. La conservation dans un état de propreté

9. Disponibilité 65 %, accessibilité 70 %, utilisation 80 %, couverture adéquate 50 % et couverture effective 30 %. À quels niveaux observe-t-on une diminution, donc un goulot ?

- a. Entre la cible et la disponibilité
- b. Entre la disponibilité et l'accessibilité
- c. Entre l'accessibilité et l'utilisation
- d. Entre l'utilisation et la couverture adéquate
- e. Entre la couverture adéquate et la couverture effective

10. La lutte défensive contre les rongeurs repose principalement sur :

- a. L'utilisation des pièges
- b. L'utilisation du chat
- c. L'élimination des ordures et des sources de nourriture
- d. L'emploi de germes microbiens

11. Deux régions reçoivent chacune dix sages-femmes. La première est déjà bien dotée ; la seconde, rurale, présente une forte mortalité maternelle et un déficit important en personnel. Quelle appréciation est la plus juste ?

- a. La répartition est équitable parce que les effectifs sont identiques
- b. Elle est inéquitable parce qu'elle ne tient pas compte des besoins différents
- c. Elle est efficiente parce qu'aucune région n'est exclue
- d. Elle est acceptable si les établissements sont de même catégorie

12. La conférence internationale ayant consacré la stratégie des soins de santé primaires s'est tenue :

- a. Du 4 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata
- b. Du 6 au 12 septembre 1978 à Ata-Alma
- c. Du 6 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata
- d. Du 8 au 12 septembre 1978 à Alma-Ata

13. Deux districts atteignent l'objectif de 95 % de couverture vaccinale. Le district A mobilise deux équipes et 2 millions de FCFA ; le district B, quatre équipes et 5 millions. Comment comparer leurs performances ?

- a. Seul A est efficace, car il utilise moins d'équipes
- b. Seul B est efficace, car il mobilise davantage de ressources
- c. Les deux sont efficaces et également efficaces
- d. Les deux sont efficaces, mais A est plus efficient

14. Le niveau principal de mise en œuvre opérationnelle des activités de soins de santé primaires est :

- a. Le niveau central
- b. Le niveau intermédiaire
- c. Le niveau périphérique

15. Un flacon multidose de vaccin liquide ouvert peut être réutilisé si :

- a. Sa date de péremption n'est pas dépassée
- b. Sa PCV n'a pas atteint le point de rejet
- c. Les conditions de conservation et d'asepsie ont été respectées
- d. Il a été immergé dans l'eau
- e. Son étiquette est devenue illisible

16. Le démarrage effectif des activités de soins de santé primaires à la base du secteur de santé rurale de Bouaflé date de :

- a. 1991
- b. 1993
- c. 1994
- d. 1996

17. Le ministère recrute des infirmiers, construit des centres et acquiert des vaccins. Ces activités relèvent principalement de :

- a. La mobilisation des ressources
- b. La gouvernance du système
- c. Le financement de la santé
- d. La prestation des services

18. Parmi les obstacles à la communication suivants, lequel est principalement lié au récepteur ?

- a. Le mauvais accueil
- b. Le non-respect des autres
- c. Le refus du message
- d. Un message inapproprié

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

19. Quels vaccins sont particulièrement sensibles à la lumière ?

- a. BCG
- b. RR
- c. VAA
- d. Penta
- e. Td

20. Lequel des éléments suivants n'est pas, en lui-même, l'une des huit composantes essentielles des soins de santé primaires ?

- a. L'approche préventive
- b. La promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles
- c. L'approvisionnement suffisant en eau saine et l'assainissement de base
- d. La protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale
- e. La fourniture de médicaments essentiels

21. Quelles sources sont directement utiles au monitoring de la vaccination ?

- a. Le registre de vaccination
- b. La fiche de stock des vaccins
- c. Le relevé de température du réfrigérateur
- d. Le registre de consultation curative
- e. Le cahier de présence des élèves

22. Le but principal de la mobilisation communautaire est de :

- a. Améliorer automatiquement le bien-être de la société
- b. Influencer uniquement un changement de politique
- c. Réaliser un but social commun grâce aux efforts de tous
- d. Définir les besoins sans organiser l'action collective

23. Un centre possède le personnel et le matériel nécessaires au dépistage du cancer du col. Le besoin est reconnu, mais les femmes utilisent très peu le service. Cette situation correspond à :

- a. Aucun besoin identifié et aucune réponse
- b. Un besoin ressenti et exprimé sans réponse
- c. Un besoin identifié avec une réponse disponible, mais une demande faible
- d. Une demande supérieure à une offre pleinement utilisée

24. Lequel des éléments suivants constitue surtout un obstacle à la participation communautaire ?

- a. La méfiance au cours d'un échange interpersonnel
- b. Le mauvais accueil d'un usager
- c. Le non-respect d'un interlocuteur
- d. Les rivalités entre villages

25. Un nourrisson de 14 semaines a reçu DN-Hep B, BCG et VPO0 à la naissance, mais aucun vaccin depuis. Sans contre-indication, il faut aujourd'hui :

- a. Administrer directement les troisièmes doses selon son âge
- b. Commencer les premières doses de Penta, VPO, PCV13, Rota et VPI, puis poursuivre selon les intervalles
- c. Administrer seulement les vaccins de 14 semaines
- d. Attendre 24 semaines pour reprendre avec le VAA-1

26. Parmi les fiches suivantes, quelles sont les deux fiches de comptage habituellement remplies de façon hebdomadaire ?

- a. Morbidité
- b. Accouchement
- c. Consultations pré- et postnatales
- d. Cabinet dentaire
- e. Planification familiale
- f. Réhydratation

27. Un nourrisson de 9 mois présentant des signes avérés de SIDA n'a reçu ni BCG ni vaccin antiamaril ; ses autres vaccins sont à jour. Il faut :

- a. Administrer tous les vaccins de 9 mois, y compris BCG et VAA
- b. Différer tous les vaccins
- c. Ne pas administrer BCG et VAA, mais donner les autres vaccins indiqués
- d. Administrer uniquement VAA et Men A

28. L'ensemble des actions mises en œuvre pour maîtriser ou résoudre un problème de santé détecté constitue :

- a. Le seuil épidémique
- b. La riposte
- c. Le seuil d'action
- d. Le seuil d'alerte

29. Une femme a reçu Td1, Td2 quatre semaines plus tard et Td3 six mois après. Elle revient exactement un an après Td3. Quelle proposition est correcte ?

- a. Elle doit recevoir Td4, qui porte la protection à dix ans
- b. Elle doit recevoir Td5
- c. Elle ne doit recevoir aucune dose avant cinq ans
- d. Elle doit recommencer par Td1

30. La surveillance intégrée de la maladie et la riposte (SIMR) vise notamment à :

- a. Collecter les données épidémiologiques
- b. Analyser et interpréter les données
- c. Détecter des situations inhabituelles
- d. Mesurer les changements dans le temps

31. Un enfant de 30 mois a reçu uniquement Penta1 et VPO1 au cours de sa première année. Il faut :

- a. Recommencer toutes les séries
- b. Poursuivre sans recommencer, donner en priorité les vaccins dus après 9 mois et programmer la suite selon les intervalles
- c. Donner uniquement Penta2 et VPO2 puis attendre 59 mois
- d. Le considérer comme complètement vacciné

32. À 6 semaines, un nourrisson reçoit Penta1, VPO1, PCV13-1 et Rota1, mais VPI1 est oublié. Selon les dispositions enseignées, il faut :

- a. Administrer VPI1 dès le lendemain
- b. Attendre 14 semaines et administrer directement VPI2
- c. Programmer le vaccin oublié au moins quatre semaines après le contact incomplet
- d. Ne plus administrer VPI1

QCD

33. Une forte couverture vaccinale suffit, à elle seule, pour conclure à une bonne gestion des vaccins et des stocks.

- a. Vrai b. Faux

34. Une eau potable se caractérise uniquement par trois qualités physiques.

- a. Vrai b. Faux

35. En monitoring, les indicateurs servent à mesurer le niveau atteint par les différents déterminants de couverture.

- a. Vrai b. Faux

36. Le mode de transmission du paludisme par le moustique Anopheles femelle est une transmission mécanique.

- a. Vrai b. Faux

EXAMEN BLANC INFAS AGBOVILLE - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

37. Lorsque le taux de perte d'un vaccin augmente, son facteur de perte augmente également.

a. Vrai b. Faux

38. Le niveau périphérique de la pyramide sanitaire ivoirienne est chargé d'élaborer la politique nationale de santé.

a. Vrai b. Faux

39. Une catastrophe est une situation d'urgence dont les effets dépassent les capacités de réponse de la communauté touchée.

a. Vrai b. Faux

40. Les vaccins reconstitués non utilisés peuvent être conservés jusqu'à la séance suivante si la chaîne du froid a été respectée.

a. Vrai b. Faux

41. La communication pour le changement social et comportemental et le plaidoyer poursuivent exactement la même finalité et s'adressent aux mêmes publics.

a. Vrai b. Faux

42. La couverture adéquate correspond à la proportion de la population cible ayant bénéficié de l'activité selon l'intensité et la fréquence requises.

a. Vrai b. Faux

43. Les bruits intenses ou prolongés peuvent entraîner des lésions organiques de l'appareil auditif.

a. Vrai b. Faux

44. Un goulot d'étranglement entre l'accessibilité géographique et l'utilisation des services signifie qu'une partie de la population peut accéder au service, mais ne l'utilise pas.

a. Vrai b. Faux

ÉTUDE DE CAS

Le CSR d'Akakro, situé dans le district sanitaire de Bongouanou, desservait une population de 14 600 habitants en 2024. Le taux d'accroissement annuel (TAA) de cette population est estimé à 2,5 %. Dans le cadre de l'évaluation de ses performances, l'équipe du centre procède, en 2026, au monitoring des activités de vaccination, puis à la budgétisation des ressources propres de l'établissement. À la veille de ces opérations, le solde bancaire s'élève à 3 840 000 FCFA. Ce montant ne tient pas compte des intérêts bancaires, estimés à 48 000 FCFA, mais inclut 27 000 FCFA d'agios. Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels représentent 35 % du solde bancaire avant mouvement, tandis que celles provenant des actes de santé correspondent à 45 % du solde après mouvement. Les dépenses obligatoires représentent un cinquième des ressources propres. Concernant le vaccin Penta, l'inventaire fait état de 620 doses, dont 80 présentent une PCV au point de rejet et 60 sont arrivées à expiration avant la période d'utilisation. Au cours de l'année, 800 enfants ont reçu le BCG, 840 le Penta1, 720 le Penta2, 630 le Penta3 et 600 le vaccin RR. Par ailleurs, l'analyse des données de morbidité révèle que 900 personnes étaient déjà connues comme hypertendues au début de l'année 2026. Durant cette même année, 420 nouveaux cas d'hypertension artérielle ont été diagnostiqués et 12 décès imputables à cette maladie ont été enregistrés parmi l'ensemble des personnes hypertendues suivies.

45. Le solde bancaire après mouvement correspond nécessairement au montant des ressources propres à budgétiser.

a. Vrai b. Faux

46. Les agios constituent une recette du centre au même titre que les intérêts bancaires.

a. Vrai b. Faux

47. Les 620 doses inventoriées doivent être entièrement déduites du besoin réel pour déterminer la quantité à commander.

a. Vrai b. Faux

48. Le montant des dépenses de fonctionnement local est de :

- a. 2 417 760 FCFA
- b. 2 438 160 FCFA
- c. 2 465 160 FCFA
- d. 2 492 160 FCFA

49. Le taux d'abandon de Penta est de :

- a. 20,00 %
- b. 23,81 %
- c. 25,00 %
- d. 33,33 %

50. Le besoin réel annuel en vaccin Penta est approximativement de :

- a. 2 980 doses
- b. 3 425 doses
- c. 3 725 doses
- d. 4 025 doses

51. La population projetée de l'aire sanitaire en 2026 est approximativement de :

- a. 14 965 habitants
- b. 15 330 habitants
- c. 15 339 habitants
- d. 15 700 habitants

52. Le taux de prévalence de l'hypertension artérielle en 2026 est approximativement de :

- a. 2,74 %
- b. 5,87 %
- c. 8,61 %
- d. 9,14 %

53. Le taux d'incidence de l'hypertension artérielle en 2026 est approximativement de :

- a. 0,91 %
- b. 2,74 %
- c. 5,87 %
- d. 8,61 %

54. Le taux de létalité lié à l'hypertension artérielle en 2026 est approximativement de :

- a. 0,42 %
- b. 0,91 %
- c. 2,74 %
- d. 8,61 %

55. Si le TAA reste constant, l'année approximative de doublement de la population, à partir de 2024, est :

- a. 2048
- b. 2050
- c. 2052
- d. 2054

56. Le taux global d'abandon est de :

- a. 25,00 %
- b. 26,19 %
- c. 28,57 %
- d. 30,00 %