



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

تمرین چهارم
دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
نیم سال دوم ۹۹-۰۰

استاد:

جناب آقای دکتر منظوری شلمانی

نام و نام خانوادگی:

امیرمهدی نامجو - ۹۷۱۰۷۲۱۲



۱ سوال اول

.۱

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}} = \frac{1 + \frac{1}{2}\cos(\omega) - j\frac{1}{2}\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{4}\cos(\omega) - j\frac{1}{4}\sin(\omega)}$$

$$\begin{aligned} |H_1(e^{j\omega})| &= \frac{(1 + \frac{1}{2}\cos(\omega))^2 + (\frac{1}{2}\sin(\omega))^2}{(1 + \frac{1}{4}\cos(\omega))^2 + (\frac{1}{4}\sin(\omega))^2} \\ &= \frac{\frac{5}{4} + \cos(\omega)}{\frac{17}{16} + \frac{1}{2}\cos(\omega)} \end{aligned}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2} + e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}} = \frac{\frac{1}{2} + \cos(\omega) - j\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{4}\cos(\omega) - j\frac{1}{4}\sin(\omega)}$$

$$\begin{aligned} |H_2(e^{j\omega})| &= \frac{(\frac{1}{2} + \cos(\omega))^2 + \sin^2(\omega)}{(1 + \frac{1}{4}\cos(\omega))^2 + (\frac{1}{4}\sin(\omega))^2} \\ &= \frac{\frac{5}{4} + \cos(\omega)}{\frac{17}{16} + \frac{1}{2}\cos(\omega)} \end{aligned}$$

$$|H_1(e^{j\omega})| = |H_2(e^{j\omega})|$$

یعنی برابرند.

.۲

$$\angle H_1(e^{j\omega}) = -\tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{2}\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{2}\cos(\omega)}\right) - \left(-\tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{4}\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{4}\cos(\omega)}\right)\right)$$

$$= -\tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{2}\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{2}\cos(\omega)}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{4}\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{4}\cos(\omega)}\right)$$

$$\angle H_2(e^{j\omega}) = -\tan^{-1}\left(\frac{\sin(\omega)}{\frac{1}{2} + \cos(\omega)}\right) - \left(-\tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{4}\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{4}\cos(\omega)}\right)\right)$$

$$= -\tan^{-1}\left(\frac{\sin(\omega)}{\frac{1}{2} + \cos(\omega)}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{4}\sin(\omega)}{1 + \frac{1}{4}\cos(\omega)}\right)$$

تاخیر گروه به نوعی منفی نرخ تغییرات فاز نسبت به ω است.

اگر از عامل مشترک دوم در هر دو عبارت برای سادگی محاسبات صرف نظر کنیم و با $\xi(\omega)$ نمایش بدهیم، داریم:



$$\tau_1 = \frac{1 + 2 \cos(\omega)}{5 + 4 \cos(\omega)} + \xi(\omega)$$

$$\tau_2 = \frac{2(2 + \cos(\omega))}{5 + 4 \cos(\omega)}$$

به راحتی با عدد گذاری ساده می توان متوجه شد که در بازه $[-\pi, \pi]$:

$$\tau_2 > \tau_1$$

و این موضوع برای سایر تناوب ها هم برقرار است. یعنی تاخیر گروه H_2 بزرگتر از H_1 است.

۳.

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$h_1[n] = \mathcal{F}^{-1}(H_1(e^{j\omega})) = \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

$$H_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}} + \frac{e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$$h_2[n] = \mathcal{F}^{-1}(H_2(e^{j\omega})) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} u[n-1]$$

برای پاسخ پله داریم:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1/4)^m u[m] u[n-m] = \sum_{m=0}^n (-1/4)^m = \frac{4 + (-\frac{1}{4})^n}{5}$$

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1/4)^{m-1} u[m-1] u[n-m] = \sum_{m=1}^n (-1/4)^{m-1} = \frac{4 - (-\frac{1}{4})^n}{5}$$

$$s_1[n] = \frac{4 + (-\frac{1}{4})^n}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{4 - (-\frac{1}{4})^n}{5}, n \geq 0$$

$$s_2[n] = \frac{1}{2} \times \frac{4 + (-\frac{1}{4})^n}{5} + \frac{4 - (-\frac{1}{4})^n}{5}, n \geq 0$$

هر دو مورد برای مقادیر کمتر از 0 برابر 0 هستند.







تمرین چهارم

امیرمهدی نامجو

شکل در صفحه بعد قرار دارد. به دلیل کوچک بودن مقادیر، طول خطوط به مقیاس نیست تا بتوان آنان را در صفحه نمایش داد. به همین دلیل هم شکل به صورت کامپیوتری رسم نشده و دستی رسم شده است.



اسریسی نامجو ۹۷۱.۷۲۱۲





۲ سوال دوم

۱. می‌توانیم فیلتر بالاگذر را به صورت زیر بنویسیم:

$$H(j\omega) = 1 - H_0(j\omega)$$


که H_0 مربوط به فیلتر پایین گذر است. با توجه به این که طبق کتاب فرمول مربوط به فیلتر پایین گذر را می‌دانیم داریم:

$$h[n] = \delta(t) - h_0(t) = \delta(t) - \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$$

۲. برای فشردگی نمودار کافیت به رفتار

$$\frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$$

نگاه کنیم. دو شکل زیر اولی برای $\omega_c = 4.6$ و دومی برای $\omega_c = 3.41$ هستند. اولین نقاط برخورد نمودار با محور t برابر $\pm \frac{\pi}{\omega_c}$ هستند. با توجه به این موضوع با افزایش ω_c متمرکزتر می‌شود.



۳.

$$s(t) = h(t) \star u(t) = [\delta(t) - h_0(t)] \star u(t) = u(t) - s_0(t)$$

که $s_0(t)$ به شکل کامل در شکل 6.14 کتاب رسم شده است.



$$s(0+) = u(0+) - s_0(0+) = 1 - 0.5 = 0.5$$

$$s(\infty) = u(\infty) - s_0(\infty) = 1 - 1 = 0$$

مقدار $s_0(0+)$, $s_0(\infty)$ از شکل کتاب استخراج شده‌اند.
شکل کتاب در تصویر زیر هم قرار گرفته است:

