

Curso: Métodos Numéricos II
Professor: Creto Augusto Vidal
Semestre: 2020.1
Aula # 8

Objetivo: Exemplo de aplicação das fórmulas de integração de Newton-Cotes

Problema: Calcular a integral definida mostrada na equação (1).

$$(1) I = \int_a^b f(x) dx$$

onde a e b são o início e o fim do intervalo de integração e $f(x)$ é uma função dada, por exemplo, $f(x) = (\sin(2x) + 4x^2 + 3x)^2$.


Exemplo: $\int_0^1 (\sin(2x) + 4x^2 + 3x)^2 dx$

Essa integral não é tão difícil de calcular usando seus conhecimentos de Cálculo II. Na verdade, a solução exata é a seguinte:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (\sin(2x) + 4x^2 + 3x)^2 dx \\ &= \frac{1}{40} (428 + 220\sin(2) - 5\sin(4)) - 5\cos(2) = 17.8764703 \end{aligned}$$

Vamos tentar obter uma aproximação do valor 17.876, usando nossas fórmulas de integração nas duas abordagens Fechada e Aberta com polinômios de substituição de graus 1, 2 e 3.

Neste exercício nós não vamos subdividir o problema. Veja o gráfico da função a ser integrada e tente imaginar qual polinômio poderia ser uma boa aproximação desse gráfico (uma linha reta, uma parábola, um polinômio do terceiro grau?).



Fórmulas de Newton-Cotes Fechadas

. Polinômio de substituição de grau 1 (Regra do Trapézio)

$$I = \int_0^1 (\sin(2x) + 4x^2 + 3x)^2 dx \approx \frac{\Delta x}{2} (f(0) + f(1)) = \frac{(1-0)}{2} (0 + 62.557) = 31.28$$

. Polinômio de substituição de grau 2 (Regra de Simpson 1/3)

$$I \approx \frac{h}{3} (f(0) + 4f(0.5) + f(1)) = \frac{(1-0)}{3} (0 + 44.6617 + 62.557) = 17.87$$

. Polinômio de substituição de grau 3 (Regra de Simpson 3/8)

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{3h}{8} \left(f(0) + 3f\left(\frac{1}{3}\right) + 3f\left(\frac{2}{3}\right) + f(1) \right) \\ &= \frac{3(1-0)}{8} (0 + 12.766 + 67.679 + 62.557) = 17.86 \end{aligned}$$

Fórmulas de Newton-Cotes Abertas

. Polinômio de substituição de grau 1 (Regra do Trapézio Aberta)

$$I \approx \frac{\Delta x}{2} \left(f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{2}{3}\right) \right) = \frac{(1-0)}{2} (4.2552 + 22.5598) = 13.41$$

. Polinômio de substituição de grau 2 (Fórmula de Milne)

$$I \approx \frac{4h}{3} \left(2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right) = \frac{4(1-0)}{3} (4.3774 - 11.1654 + 60.4449) = 17.89$$

. Polinômio de substituição de grau 3

$$\begin{aligned} I &\approx \frac{5h}{24} \left(11f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{2}{5}\right) + f\left(\frac{3}{5}\right) + 11f\left(\frac{4}{5}\right) \right) \\ &= \frac{5(1-0)}{24} (14.5328 + 6.5401 + 17.4059 + 390.682) = 17.88 \end{aligned}$$

Tarefa: Implemente as fórmulas Fechadas e Abertas da Aula#7 bem como as fórmulas que você desenvolveu para polinômios de substituição de grau 4 (Fechada e Aberta) e teste os resultados com tolerância de 10^{-6} . O seu código (como já discutido em sala de aula) implementa a estratégia de partição do problema. Veja, em cada caso, quantas iterações foram necessárias até atingir a tolerância especificada.