

EL TIZÓN TARDIO

EN PANAMÁ





Área papera de Panamá.

Coordenadas:

8° 51' 09" de Latitud Norte;

82° 34`19" de Longitud Oeste

Altura de 1900 y 2600 msnm

Temperaturas promedio mensual de 17.10 °C

Precipitación promedio mensual 196.23 mm

Precipitación anual 2353.97 mm

Promedio mensual de HR 80.0 %.

Se siembra papa durante todo el año.

Phytophthora infestans se constituye en la principal limitante del cultivo de la papa en Panamá, como en la mayoría de las áreas donde se cultiva este rubro

Las pérdidas ocasionadas por la misma pueden alcanzar el 100% en cualquier etapa del ciclo.



22/9/2014 9:00pm

El 95% del área lo ocupa la variedad Granola, susceptible, al P. infestans.




En la época lluviosa, para el manejo del tizón tardío los productores aplican fungicidas cada tres días durante el ciclo del cultivo

Se realizó una investigación en búsqueda de información sobre la presencia o no de los tipos de apareamiento del oomyceto *P. infestans*. (Ing. Rodrigo Morales)



En las pruebas de apareamiento no fueron observadas las estructuras sexuales Anteridio y Oogonio.

No se formaron las estructuras de conservación Oosporas.




No se ha demostrado la
resistencia al metalaxil



Se encuentra en
evaluación un grupo de
clones de la población
LBHT, con muy buen
comportamiento

22/9/2014 9:22pm

EFICACIA DEL FUNGICIDA FLUOPICOLIDE + PROPINEB



EFICACIA DEL FUNGICIDA CABRIO TEAM




Figura 1. Curvas de progreso del Tizón tardío para los





Figura 1. Curvas de progreso del Tizón tardío para los



Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas Gracias

