

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Tjaša Vrhovnik

**Fareyevo zaporedje in Riemannova hipoteza**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2019

## KAZALO

1. Uvod	4
2. Fareyevo zaporedje	4
2.1. Zgodovina Fareyevega zaporedja	4
2.2. O Fareyevem zaporedju	5
2.3. Dolžina Fareyevega zaporedja	7
3. Fordovi krogi	9
3.1. Fordovi sosedi	10
3.2. Posplošeni Fordovi krogi	13
3.3. Fordove krogle	13
3.4. Möbiusove transformacije na Fordovih krogih	14
Slovar strokovnih izrazov	17
Literatura	17

# Fareyevo zaporedje in Riemannova hipoteza

POVZETEK

# The Farey Sequence and The Riemann Hypothesis

ABSTRACT

Math. Subj. Class. (2010):

Ključne besede:

Keywords:

## 1. UVOD

Zgodovina Fareyvega zaporedja sega v London 18. stoletja. Med letoma 1704 in 1841 je izhajal letni zbornik *The Ladies Diary: or, the Woman's Almanack*, ki je povezoval ljubitelje matematičnih ugank. Bralce so namreč nagovarjali k pošiljanju in reševanju aritmetičnih problemov, ki so bili v zborniku objavljeni. Leta 1747 se je pojavilo naslednje vprašanje: Najti je potrebno število ulomkov različnih vrednosti, manjših od 1, katerih imenovalec ni večji od 100.

## 2. FAREYEVO ZAPOREDJE

**2.1. Zgodovina Fareyvega zaporedja.** Vrnimo se k v uvodu omenjeni nalogi o številu ulomkov različnih vrednosti, manjših od 1, z imenovalci kvečjemu 100. Prvi odgovor na članek je bila tabela ulomkov z imenovalci manjšimi od 10, nato pa še dve tabeli z rezultatoma 3055 in 4851. Leta 1751 je R. Flitcon objavil pravilni odgovor 3003, kateremu je dodal tudi opis postopka. Preden ga razložimo, si oglejmo Eulerjevo funkcijo in njene lastnosti, ki nas bo pripeljala do rešitve.

**Definicija 2.1.** Preslikava  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , ki za vsako naravno število  $n$  prešteje števila, manjša od  $n$ , ki so  $n$  tuja, se imenuje *Eulerjeva funkcija*  $\varphi$ .

**Trditev 2.2.** Če sta  $k$  in  $l$  tuji si števili, velja  $\varphi(kl) = \varphi(k)\varphi(l)$ , torej je Eulerjeva funkcija multiplikativna.

*Dokaz.* V dokazu multiplikativnosti si bomo pomagali z lastnostmi grup. Naj  $\mathbb{Z}_k^*$  označuje grupo vseh obrnljivih elementov grupe  $\mathbb{Z}_k$ . Vemo, da so obrnljivi elementi grupe  $\mathbb{Z}_k$  tista števila iz množice  $\{0, 1, \dots, k-1\}$ , ki so tuja  $k$ , zato je  $|\mathbb{Z}_k^*| = \varphi(k)$ . Dobimo zvezi

$$|\mathbb{Z}_{kl}^*| = \varphi(kl),$$

$$|\mathbb{Z}_k^*||\mathbb{Z}_l^*| = \varphi(k)\varphi(l).$$

Znano je, da je preslikava  $\psi: \mathbb{Z}_{kl}^* \rightarrow \mathbb{Z}_k^* \times \mathbb{Z}_l^*$  za tuji naravni števili  $k$  in  $l$  izomorfizem grup. Ker je moč kartezičnega produkta dveh množic enaka produktu njunih moči, sledi

$$\varphi(kl) = |\mathbb{Z}_{kl}^*| = |\mathbb{Z}_k^*||\mathbb{Z}_l^*| = \varphi(k)\varphi(l),$$

s čimer je multiplikativnost dokazana. □

**Trditev 2.3.** Vrednost Eulerjeve funkcije je enaka

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

kjer so  $p$  prafaktorji števila  $n$ .

*Dokaz.* Zapišimo  $n$  kot produkt prafaktorjev,  $n = \prod_{i=1}^m p_i^{r_i}$ , kjer so  $r_i \in \mathbb{N}$  in  $p_i$  praštevila. Funkcija  $\varphi(p^r)$  prešteje vsa števila, manjša od  $p^r$ , ki so tuja  $p^r$ . To so natanko tista, ki niso deljiva s praštevilom  $p$ . Večkratnikov  $p$  med števili  $1, 2, \dots, p^r - 1$  je toliko kot večkratnikov  $p$  med števili  $1, 2, \dots, p^r$ , teh pa je  $\frac{p^r}{p} = p^{r-1}$ . Torej je

$$\varphi(p^r) = (p^r - 1) - (p^{r-1} - 1) = p^r - p^{r-1} = p^r \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Z upoštevanjem multiplikativnosti funkcije  $\varphi$  dobimo

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi\left(\prod_{i=1}^m p_i^{r_i}\right) = \prod_{i=1}^m \varphi(p_i^{r_i}) = \prod_{i=1}^m p_i^{r_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= \prod_{i=1}^m p_i^{r_i} \times \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),\end{aligned}$$

kar smo želeli dokazati.  $\square$

**Trditev 2.4.** *Obstajajo 3003 racionalna števila  $\frac{p}{q}$ , za katera velja  $0 < \frac{p}{q} < 1$  ter je  $q \leq 100$ .*

Namesto formalnega dokaza trditve bomo predstavili Flitconovo rešitev. Naredimo tabelo s tremi stolpci in 99 vrsticami. V prvi stolpec vsake vrstice napišemo po eno izmed naravnih števil od 2 do 100. V drugi stolpec posamezne vrstice zapišemo naravno število iz prvega stolpca kot produkt prafaktorjev, v tretji stolpec pa vrednost  $\varphi(n)$ . Pomagamo si s trditvama 2.2 in 2.3. Vsota vrednosti v tretjem stolpcu nam da število iskanih ulomkov. Res, vsak  $\varphi(n)$  nam pove število okrajšanih ulomkov med 0 in 1 z imenovalcem  $n$ , vsota vrednosti Eulerjeve funkcije  $\varphi(n)$  za vsa števila  $n$  med 2 in 100 pa število vseh okrajšanih ulomkov med 0 in 1 z imenovalci med 2 in 100.<sup>1</sup>

Neodvisno od Flitconove rešitve je francoski matematik Charles Haros leta 1802 sestavil enak seznam ulomkov, vendar na precej bolj zanesljiv način. Haros se dela ni lotil z željo po reševanju aritmetične naloge, pač pa je pisal tabele za pretvarjanje med ulomki in decimalnim zapisom ter obratno. V Franciji so namreč v času revolucije konec 18. stoletja uvajali nov metrični sistem, ki je med drugim zahteval uporabo decimalnega zapisa. Tabele so bile objavljene v časniku *Journal de l'Ecole Polytechnique*, primerom ter algoritmom za pretvarjanje pa so bile dodane skice dokazov in nekatere lastnosti zaporedja ulomkov, ki so kasneje postali znani pod imenom Fareyevo zaporedje.

Posebej zanimiva je zgodba o pivovarju in ljubiteljskemu matematiku Henryju Goodwynu. Čeprav ni imel formalne izobrazbe, se je navduševal nad znanostjo in tehniko, sestavljal različne tabele in računal, kako izboljšati svoje poslovanje. Po upokojitvi se je vse bolj posvečal matematiki – tako je med letoma 1816 in 1823 objavil več člankov s tabelami okrajšanih ulomkov. Njegovo delo sta opazila znameniti francoski matematik Augustin Louis Cauchy in John Farey, geolog, po komer se obravnavano zaporedje okrajšanih ulomkov imenuje. Vemo, da je Cauchy prispeval nekaj dokazov lastnosti Fareyvega zaporedja, v nasprotju pa ostaja neznano, ali sta Goodwyn in Farey zaporedje in nekatere njegove lastnosti odkrila neodvisno od Harosa, bodisi sta vedela za njegove ugotovitve. Farey je najverjetneje na podlagi Goodwynovih tabel maja 1816 v pismu časopisu *The Philosophical Magazine and Journal* z naslovom *On a curious Property of vulgar Fractions* predstavil medianto, najpomembnejšo lastnost zaporedja. Čeprav zaporedje morda neupravičeno nosi ime Johna Fareya, pa ne smemo spregledati njegovega prispevka k raziskovanju matematike v glasbi, vzorcev, astronomije in seveda geologije.

## 2.2. O Fareyevem zaporedju.

<sup>1</sup>Čeprav Flitcon ne omenja Eulerjeve funkcije  $\varphi$ , je uporabil njene lastnosti v svoji matematično manj formalni metodi.

**Definicija 2.5.** *Fareyevo zaporedje reda  $n$  oz.  $n$ -to Fareyevo zaporedje* je množica racionalnih števil  $\frac{p}{q}$  urejenih po velikosti, kjer sta  $p$  in  $q$  tuji si števili, ter velja  $0 \leq p \leq q \leq n$ . Označimo ga z  $F_n$ .

Ekvivalentno,  $F_n$  vsebuje vse okrajšane ulomke med 0 in 1 z imenovalci, kvečjemu enakimi  $n$ .

**Primer 2.6.** Poglejmo si prvih nekaj Fareyevih zaporedij.

$$\begin{aligned} F_1 &= \left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{1} \right\} \\ F_2 &= \left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1} \right\} \\ F_3 &= \left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1} \right\} \\ F_4 &= \left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1} \right\} \\ F_5 &= \left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{1}{1} \right\} \end{aligned} \quad \diamond$$

**Opomba 2.7.** Če pogoj  $0 \leq p \leq q \leq n$  v definiciji 2.5 omilimo v pogoj  $0 \leq p, q \leq n$ , okrajšane ulomke z intervala  $[0, 1]$  razširimo na interval  $[0, \infty)$ . V primeru, ko za  $p$  in  $q$  dovoljujemo tudi negativna cela števila, dobimo okrajšane ulomke na celotni realni osi.

V zgornjih primerih opazimo, da za vsaka sosednja člena Fareyvega zaporedja velja naslednje. Če števec prvega ulomka množimo z imenovalcem drugega in nato vlogi ulomkov zamenjamo, je razlika obeh produktov po absolutni vrednosti enaka 1. To se bo izkazalo za pomembno opazko, zato vpeljemo pojem, ki sledi.

**Definicija 2.8.** Sosednja člena v Fareyevem zaporedju imenujemo *Fareyeva soseda*.

**Definicija 2.9.** Naj bosta  $\frac{a}{b}$  in  $\frac{c}{d}$  sosednja člena nekega Fareyvega zaporedja. Člen

$$\frac{a+c}{b+d}$$

imenujemo *medianta*.

**Trditev 2.10.** Za medianto okrajšanih ulomkov  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$  velja  $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$ .

*Dokaz.* Poračunajmo razliki med členoma

$$\frac{a+c}{b+d} - \frac{a}{b} = \frac{ab+bc-ab-ad}{b(b+d)} = \frac{bc-ad}{b(b+d)} > 0$$

in

$$\frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc+cd-ad-cd}{d(b+d)} = \frac{bc-ad}{d(b+d)} > 0.$$

Obe neenakosti sledita iz dejstva, da je  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ , kjer so  $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ , zato je  $ad < bc$ . Zveza torej velja.  $\square$

Kako dobimo člen Fareyvega zaporedja reda  $(n+1)$ ? Označimo iskani okrajšan ulomek s  $\frac{k}{n+1}$ . Seveda sta  $k, n \in \mathbb{N}, k < n+1$  tuji si števili. Zato obstajata enolično določeni naravni števili  $a < b$ , da velja  $a(n+1) - bk = 1$ . S preoblikovanjem zadnje enakosti dobimo zvezo  $a(n+1-b) - b(k-a) = 1$ , kar pomeni, da sta si tudi naravni števili  $k-a$  in  $n+1-b$  tuji. Brez škode za splošnost naj bo  $k-a < n+1-b$ . Zato lahko tvorimo okrajšan ulomek  $\frac{k-a}{n+1-b}$ , ki pripada nekemu Fareyevemu zaporedju. Prav tako je okrajšan ulomek  $\frac{a}{b}$  element nekega Fareyvega zaporedja. Sedaj prepišimo ulomek  $\frac{k}{n+1}$  v  $\frac{a+(k-a)}{b+(n+1-b)}$ , kar pa je medianta ulomkov  $\frac{a}{b}$  in  $\frac{k-a}{n+1-b}$ . Dokazali smo naslednjo lemo.

**Lema 2.11.** *Dano naj bo Fareyevo zaporedje. Elemente zaporedja višjega reda dobimo z računanjem mediant elementov danega zaporedja.*

**Trditev 2.12.** *Naj velja  $0 \leq \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \leq 1$ . Ulomka  $\frac{a}{b}$  in  $\frac{c}{d}$  sta Fareyeva soseda v nekem Fareyevem zaporeju natanko tedaj, ko velja  $bc - ad = 1$ .*

*Dokaz.* ( $\Rightarrow$ ) Dokaz bo potekal z indukcijo na  $n$ . Za  $n = 1$  je  $F_n = \{\frac{0}{1}, \frac{1}{1}\}$ ,  $bc - ad = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1$ , zato osnovni korak velja. Po indukcijski predpostavki za zaporedje  $F_n = \{\dots, \frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \dots\}$  velja  $bc - ad = 1$ . Dokažimo, da velja tudi za  $F_{n+1}$ . Vemo, da nove člene zaporedja dobimo z računanjem mediant. Če je  $b + d > n + 1$ , potem  $\frac{a+c}{b+d} \notin F_{n+1}$  in je  $F_{n+1} = \{\dots, \frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \dots\}$  ter po indukcijski predpostavki  $bc - ad = 1$ . Če je  $b + d < n + 1$ , je  $\frac{a+c}{b+d}$  že nek člen v zaporedju  $F_n$  in uporabimo indukcijsko predpostavko. Če je  $b + d = n + 1$ , je  $F_{n+1} = \{\dots, \frac{a}{b}, \frac{a+c}{b+d}, \frac{c}{d}, \dots\}$  in  $b(a+c) - a(b+d) = ba + bc - ab - ad = bc - ad = 1$ , kjer smo v zadnji enakosti uporabili indukcijsko predpostavko. Podobno je  $(b+d)c - (a+c)d = bc + dc - ad - cd = bc - ad = 1$ . Indukcijski korak je s tem končan. Torej sklep velja za vsa Fareyeva zaporedja.

( $\Leftarrow$ ) Obratno, naj bodo  $\frac{a}{b}, \frac{p}{q}$  in  $\frac{c}{d}$  členi poljubnega Fareyevga zaporedja, za katere velja  $\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d}$  in  $bp - aq = qc - pd = 1$ . S preureditvijo te enakosti dobimo

$$bp + pd = aq + qc,$$

$$p(b + d) = q(a + c),$$

$$\frac{p}{q} = \frac{a + c}{b + d}.$$

Vidimo, da je  $\frac{p}{q}$  medianta ulomkov  $\frac{a}{b}$  in  $\frac{c}{d}$ , od tod pa sledi, da sta  $\frac{a}{b}$  in  $\frac{p}{q}$  ter  $\frac{p}{q}$  in  $\frac{c}{d}$  Fareyeva soseda.  $\square$

**Lema 2.13.** *Medianta je okrajšan ulomek.*

*Dokaz.* Naj za  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$  velja  $bc - ad = 1$ . Dokazati želimo, da je  $\frac{a+c}{b+d}$  okrajšan ulomek, z drugimi besedami, da sta si števili  $a + c$  in  $b + d$  tuji. Če preoblikujemo zgornjo enakost, dobimo

$$1 = bc - ad = ba + bc - ab - ad = b(a + c) - a(b + d),$$

kar pomeni, da  $b + d$  in  $a + c$  nimata skupnega faktorja. Ulomek  $\frac{a+c}{b+d}$  je torej okrajšan.  $\square$

**2.3. Dolžina Fareyevga zaporedja.** Flitconova metoda za izračun števila okrajšanih ulomkov nas pripelje do naslednje rekurzivne formule dolžine Fareyevga zaporedja.

**Trditev 2.14.** *Naj bo  $\varphi$  Eulerjeva funkcija. Dolžina Fareyevga zaporedja reda  $n$  je*

$$|F_n| = |F_{n-1}| + \varphi(n).$$

**Opomba 2.15.** Z upoštevanjem vrednosti  $|F_1| = 2$  iz trditve 2.14 sledi

$$|F_n| = \sum_{i=1}^n \varphi(i) + 1.$$

**Trditev 2.16.** *Asimptotično se dolžina Fareyevga zaporedja obnaša kot*

$$|F_n| \sim \frac{3n^2}{\pi^2}.$$

**Opomba 2.17.** Simbol  $\sim$  v trditvi 2.16 označuje asimptotično ekvivalentno obnašanje dveh funkcij. Po definiciji za funkciji  $f(x)$  in  $g(x)$  velja  $f(x) \sim g(x)$  natanko tedaj, ko je  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ .

Preden dokažemo zgornjo trditev, definirajmo naslednjo oznako in dve funkciji, ki jih bomo v dokazu potrebovali.

**Definicija 2.18.** *Notacija veliki O* predstavlja množico funkcij, ki so po absolutni vrednosti do multiplikativne konstante manjše od dane funkcije.

Natančneje, funkcija  $f$  pripada razredu  $O(g)$ , če obstajata taki konstanti  $M$  in  $x_0$ , da za vsak  $x > x_0$  velja  $|f(x)| \leq M \cdot |g(x)|$ .

Pišemo  $f \in O(g)$  oziroma  $f = O(g)$ .

**Definicija 2.19.** Preslikava  $\mu: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , definirana kot

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & ; n \text{ je deljiv s kvadratom praštevila} \\ (-1)^p & ; n \text{ je produkt } p \text{ različnih praštevil,} \end{cases}$$

se imenuje *Möbiusova funkcija*.

**Primer 2.20.** Izračunajmo vrednosti Möbiusove funkcije za nekaj naravnih števil.

$$\mu(1) = 1$$

$$\mu(2) = (-1)^1 = -1 = \mu(3)$$

$$\mu(4) = \mu(2^2) = 0$$

$$\mu(6) = \mu(2 \cdot 3) = (-1)^2 = 1$$

$$\mu(8) = \mu(2 \cdot 2^2) = 0$$

$$\mu(18) = \mu(2 \cdot 3^2) = 0$$

◇

**Definicija 2.21.** *Riemannova funkcija zeta* je za  $s \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$  definirana kot

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Sedaj lahko dokažemo trditev 2.16.

*Dokaz.* Asimptotično obnašanje bomo izračunali s pomočjo ocene vrednosti vsote  $\sum_{i=1}^n \varphi(i)$ . Spomnimo se, da je

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n - \sum \frac{n}{p} + \sum \frac{n}{pp'} - \dots,$$

kjer so  $p, p'$  praštevilske delitelji števila  $n$ . Z upoštevanjem Möbiusove funkcije je zadnja vsota enaka

$$\varphi(n) = n \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d}.$$



Sedaj računajmo vsoto

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n \varphi(i) &= \sum_{i=1}^n i \sum_{d|i} \frac{\mu(d)}{d} = \sum_{dd' \leq n} d' \mu(d) = \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{d'=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} d' \\
&= \frac{1}{2} \sum_{d=1}^n \mu(d) \left( \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor^2 + \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \right) = \frac{1}{2} \sum_{d=1}^n \mu(d) \left( \frac{n^2}{d^2} + O\left(\frac{n}{d}\right) \right) \\
&= \frac{1}{2} n^2 \sum_{d=1}^n \frac{\mu(d)}{d^2} + O\left(n \sum_{d=1}^n \frac{1}{d}\right) \\
&\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2} n^2 \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} - \frac{1}{2} n^2 \sum_{d=n+1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} + O(n \ln n) \\
&= \frac{1}{2} n^2 \sum_{d=1}^{\infty} \frac{\mu(d)}{d^2} + O\left(n^2 \sum_{d=n+1}^{\infty} \frac{1}{d^2}\right) + O(n \ln n) \\
&\stackrel{(2)}{=} \frac{n^2}{2\zeta(2)} + O(n) + O(n \ln n) \stackrel{(3)}{=} \frac{3n^2}{\pi^2} + O(n \ln n).
\end{aligned}$$

V enakosti (1) smo zadnji sumand ocenili navzgor s pomočjo Taylorjevega razvoja funkcije  $\ln$  kot

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}.$$

V enakosti (2) smo uporabili naslednjo oceno:

$$n^2 \sum_{d=n+1}^{\infty} \frac{1}{d^2} \leq n^2 \sum_{d=n+1}^{\infty} \frac{1}{d(d-1)} = n^2 \sum_{d=n+1}^{\infty} \left( -\frac{1}{d} + \frac{1}{d-1} \right) = n^2 \frac{1}{n} = n.$$

V enakosti (3) smo za izračun funkcije  $\zeta(2)$  uporabili znano vrednost

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Po opombi 2.15 sledi, da je  $|F_n| = \frac{3n^2}{\pi^2} + O(n \ln n) \sim \frac{3n^2}{\pi^2}$ . □

### 3. FORDOVI KROGI

**Definicija 3.1.** Naj bosta  $p$  in  $q$  tuji si števili v množici celih števil. *Fordov krog*  $C(\frac{p}{q})$  je krog v zgornji polravnini, ki se abscisne osi dotika v točki  $\frac{p}{q}$ , njegov polmer pa meri  $\frac{1}{2q^2}$ .

Ker so Fordovi krogi definirani za vsak okrajšan ulomek, lahko poljubnemu racionalnemu številu enolično priredimo Fordov krog. Iz analize vemo, da je množica racionalnih števil gosta podmnožica množice realnih števil, abscisna os pa je geometrijska predstavitev le-te. Zato poljubno majhen interval na abscisni osi vsebuje neskončno mnogo dotikališč Fordovih krogov.

Zaradi simetrije je Fordove kroge dovolj obravnavati na intervalu  $[0, 1]$ , obenem pa se zavedati, da jih lahko induktivno razširimo na celotno realno os.

**Opomba 3.2.** Iz definicije zaradi pogoja o tujosti števil  $p$  in  $q$  neposredno sledi, da je množica Fordovih krogov v bijekciji s Fareyevim zapredjem.

**Trditev 3.3.** *Fordova kroga, ki pripadata različnima okrajšanima ulomkoma, sta bodisi tangentna bodisi disjunktna.*

*Dokaz.* Naj za Fordova kroga  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  velja  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ . Naj bodo A središče kroga  $C(\frac{a}{b})$ , B središče kroga  $C(\frac{c}{d})$  in C presečišče navpične premice skozi točko B z vodoravno premico skozi točko A. Naj bosta še D in E presečišči daljice AB s Fordovima krogoma  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$ .

Vemo, da se kroga dotikata abscisne osi zaporedoma v točkah  $\frac{a}{b}$  in  $\frac{c}{d}$ , njuna polmera pa merita  $\frac{1}{2b^2}$  in  $\frac{1}{2d^2}$ . Od tod lahko izračunamo razdalje  $|AB|$ ,  $|AC|$  in  $|BC|$ . Po konstrukciji je trikotnik  $ABC$  pravokoten s pravim kotom v oglišču C, zato velja Pitagorov izrek

$$|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2.$$

Če dolžine izrazimo z  $a, b, c$  in  $d$ , dobimo enakost

$$\begin{aligned} |AB|^2 &= \left( \left| \frac{1}{2b^2} - \frac{1}{2d^2} \right| \right)^2 + \left( \frac{c}{d} - \frac{a}{b} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4b^4} - \frac{1}{2b^2d^2} + \frac{1}{4d^4} + \left( \frac{bc - ad}{bd} \right)^2 \\ &= \left( \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2} \right)^2 - \frac{1}{b^2d^2} + \frac{(bc - ad)^2}{b^2d^2} \\ &= (|AD| + |EB|)^2 + \frac{(bc - ad)^2 - 1}{b^2d^2}. \end{aligned}$$

Če je  $|bc - ad| > 1$ , je  $|AB|^2 > (|AD| + |EB|)^2$ , zato  $|AB| > |AD| + |EB|$  in Fordova kroga  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  sta disjunktna.

Če je  $|bc - ad| = 1$ , je  $|AB|^2 = (|AD| + |EB|)^2$ , zato  $|AB| = |AD| + |EB|$  in Fordova kroga  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  sta tangentna.

Če je  $|bc - ad| < 1$ , je  $|bc - ad| = 0$ , saj smo v množici celih števil. Sledi  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ , kar vodi v protislovje s predpostavko trditve.  $\square$

**3.1. Fordovi sosedi.** Za tangentne Fordove kroge veljata naslednji lastnosti, ki lastnosti Fareyevih sosedov preneseta v jezik geometrije.

**Trditev 3.4.** *Fordova kroga  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  sta tangentna natanko tedaj, ko velja  $|bc - ad| = 1$ .*

*Dokaz.* Ponovno vpeljimo točke na Fordovih krogih kot v dokazu trditve 3.3. Implikacijo v levo smo že izpeljali, zato si oglejmo še implikacijo v desno.

Denimo, da sta Fordova kroga  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  tangentna. Potem za pravokotni trikotnik, ki ga določata, velja Pitagorov izrek

$$|AC|^2 + |BC|^2 = |AB|^2$$

oziroma

$$\left( \left| \frac{1}{2b^2} - \frac{1}{2d^2} \right| \right)^2 + \left( \frac{c}{d} - \frac{a}{b} \right)^2 = \left( \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2} \right)^2.$$

Ko odpravimo oklepaje, opazimo, da se nekateri členi odštejejo. Nato odpravimo ulomke in dobljeno enakost poenostavimo.

$$\frac{1}{4b^4} - \frac{1}{2b^2d^2} + \frac{1}{4d^4} + \frac{c^2}{d^2} - \frac{2ac}{bd} + \frac{a^2}{b^2} = \frac{1}{4b^4} + \frac{1}{2b^2d^2} + \frac{1}{4d^4},$$

$$\begin{aligned}
b^2c^2 - 2abcd + a^2d^2 &= 1, \\
(bc - ad)^2 &= 1, \\
|bc - ad| &= 1.
\end{aligned}$$

Trditev je s tem dokazana.  $\square$

**Definicija 3.5.** Tangentna Fordova kroga imenujemo *Fordova soseda*.

**Trditev 3.6.** Naj bosta  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  Fordova soseda. Tedaj obstaja enolično določen Fordov krog  $C(\frac{a+c}{b+d})$  in je tangenten na izbrana kroga.

*Dokaz.* Po definiciji Fordovih krogov vemo, da sta  $\frac{a}{b}$  in  $\frac{c}{d}$  okrajšana ulomka in zaradi tangentnosti Fareyeva soseda v nekem Fareyevem zaporedju (razširjenem na celotno realno os). Po lemi 2.13 je njuna medianta  $\frac{a+c}{b+d}$  tudi okrajšan ulomek, torej obstaja natanko en Fordov krog  $C(\frac{a+c}{b+d})$ .

Dokažimo še, da je  $C(\frac{a+c}{b+d})$  tangenten na izbrana kroga. Ker sta  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  Fordova soseda, velja zveza  $|bc - ad| = 1$ . Če jo nekoliko preoblikujemo, dobimo

$$|bc - ad| = |bc - ad + cd - cd| = |(b+d)c - (a+c)d| = 1,$$

od koder sledi, da sta Fordova kroga  $C(\frac{a+c}{b+d})$  in  $C(\frac{c}{d})$  tangentna. Podobno

$$|bc - ad| = |bc - ad + ab - ab| = |(a+c)b - (b+d)a| = 1$$

pomeni, da sta Fordova kroga  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{a+c}{b+d})$  tangentna.  $\square$

Naslednji izrek pove, kako konstruiramo množico vseh Fordovih sosedov danega Fordovega kroga.

**Izrek 3.7.** Naj bosta kroga  $C(\frac{p}{q})$  in  $C(\frac{P}{Q})$  Fordova soseda. Vse Fordove sosedbe Fordovega kroga  $C(\frac{p}{q})$  lahko zapišemo v obliki  $C(\frac{P_n}{Q_n})$ , kjer je  $\frac{P_n}{Q_n} = \frac{P+np}{Q+nq}$  in  $n$  preteče vsa cela števila.

*Dokaz.* Najprej dokažimo, da sta Fordova kroga  $C(\frac{p}{q})$  in  $C(\frac{P}{Q})$  res Fordova soseda. Računajmo

$$|qP_n - pQ_n| = |q(P+np) - p(Q+nq)| = |qP + qnp - pQ - pnq| = |qP - pQ| = 1.$$

Zadnja enakost velja po predpostavki, da sta  $C(\frac{p}{q})$  in  $C(\frac{P}{Q})$  Fordova soseda.

Sedaj preverimo, če obstajajo še Fordovi sosedbi, ki niso zgornje oblike. Opazovali bomo zaporedje Fordovih krogov  $\mathcal{M} = \{C(\frac{P_n}{Q_n}); n \in \mathbb{Z}\}$ . Iz računa

$$\begin{aligned}
|Q_n P_{n+1} - P_n Q_{n+1}| &= |(Q+nq)(P+(n+1)p) - (P+np)(Q+(n+1)q)| \\
&= |QP + (n+1)Qp + nPq + n(n+1)pq \\
&\quad - PQ - (n+1)Pq - npQ - n(n+1)pq| \\
&= |Qp - pQ| \\
&= 1
\end{aligned}$$

sledi, da sta zaporedna elementa zaporedja  $\mathcal{M}$  Fordova soseda. Ulomek  $\frac{P_n}{Q_n}$ , ki predstavlja Fordov krog  $C(\frac{P_n}{Q_n})$ , lahko zapišemo kot

$$\begin{aligned}
\frac{P_n}{Q_n} &= \frac{P+np}{Q+nq} = \frac{Pq+npq}{q(Q+nq)} = \frac{Pq+npq+pQ-pQ}{q(Q+nq)} = \frac{p(Q+nq) + (Pq-pQ)}{q(Q+nq)} \\
&= \frac{p}{q} + \frac{Pq-pQ}{q(Q+nq)} = \frac{p}{q} \pm \frac{1}{q(Q+nq)} = \frac{p}{q} \pm \frac{1}{q^2 \left(n + \frac{Q}{q}\right)}.
\end{aligned}$$

V limiti, ko gre  $n$  preko vseh meja, gre  $\frac{P_n}{Q_n}$  proti  $\frac{p}{q}$ . Ugotovili smo, da Fordovi krogi oblike  $C(\frac{P_n}{Q_n})$  geometrijsko tvorijo obroč okoli Fordovega kroga  $C(\frac{p}{q})$ . Z njim so namreč vsi tangentni, prav tako pa so tangentni tudi na svojega predhodnika in naslednika v zaporedju  $\mathcal{M}$ . Njihova dotikališča z abscisno osjo konvergirajo proti točki  $\frac{p}{q}$ , ki je dotikališče danega Fordovega kroga  $C(\frac{p}{q})$ , zaradi medsebojne tangentnosti pa so njihovi polmeri vse manjši. Zato ne obstaja Fordov krog, tangen na  $C(\frac{p}{q})$ , ki ni zgornje oblike in ne seka katerega izmed krogov iz zaporedja  $\mathcal{M}$ .  $\square$

V dokazu trditve 3.3 smo konstruirali pravokotni trikotnik, določen s središčema tangentnih Fordovih krogov in presečiščem premic skozi središči. Spomnimo se znane definicije iz teorije števil, ki izhaja iz evklidske geometrije.

**Definicija 3.8.** Trojica naravnih števil  $(a, b, c)$ , za katero velja  $a^2 + b^2 = c^2$ , se imenuje *pitagorejska trojica*<sup>2</sup>. Pitagorejska trojica je *primitivna*, če števila  $a$ ,  $b$ , in  $c$  nimajo skupnega faktorja.

**Trditev 3.9.** *Pravokotna trikotnika, ki pripadata poljubnima paroma Fordovih sosedov, določata različni primitivni pitagorejski trojici.*

*Dokaz.* Naj bosta  $C(\frac{a}{b})$  in  $C(\frac{c}{d})$  ter  $C(\frac{a'}{b'})$  in  $C(\frac{c'}{d'})$  poljubna različna para Fordovih sosedov. Brez škode za splošnost naj velja  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$  in  $\frac{a'}{b'} < \frac{c'}{d'}$ . Naj prvemu paru Fordovih sosedov pripada pravokotni trikotnik  $ABC$ , drugemu paru pa pravokotni trikotnik  $A'B'C'$ . Dokazati želimo, da si trikotnika nista podobna.

Pa denimo, da sta si trikotnika  $ABC$  in  $A'B'C'$  podobna. Tedaj obstaja tako naravno število  $\lambda \neq 1$ , da za dolžine stranic obeh pravokotnih trikotnikov veljajo naslednje zveze:

$$(1) \quad \frac{1}{2b^2} - \frac{1}{2d^2} = \lambda \left( \frac{1}{2b'^2} - \frac{1}{2d'^2} \right),$$

$$(2) \quad \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2} = \lambda \left( \frac{1}{2b'^2} + \frac{1}{2d'^2} \right),$$

$$(3) \quad \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \lambda \left( \frac{c'}{d'} - \frac{a'}{b'} \right).$$

Če seštejemo prvi dve enačbi, dobimo

$$(4) \quad \begin{aligned} \frac{1}{b^2} &= \lambda \frac{1}{b'^2}, \\ b'^2 &= \lambda b^2, \\ b' &= \sqrt{\lambda} b. \end{aligned}$$

Enačbo (3) lahko poenostavimo, saj gre za para Fordovih sosedov. Velja

$$(5) \quad \frac{1}{bd} = \frac{bc - ad}{bd} = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \lambda \left( \frac{c'}{d'} - \frac{a'}{b'} \right) = \lambda \frac{b'c' - a'd'}{b'd'} = \lambda \frac{1}{b'd'}.$$

---

<sup>2</sup>Pojem pitagorejska trojica nosi ime slavnega starogrškega matematika Pitagore (okoli 570 pr. n. št.–495 pr. n. št.), ki ga poznamo predvsem po Pitagorovem izreku.

Iz (4) in (5) sledi

$$\begin{aligned} \frac{1}{bd} &= \lambda \frac{1}{\sqrt{\lambda}bd'}, \\ \frac{1}{d} &= \frac{\sqrt{\lambda}}{d'}, \\ d' &= \sqrt{\lambda}d. \end{aligned} \tag{6}$$

Nazadnje še v pogoj za tangentnost Fordovih krogov  $C(\frac{a'}{b'})$  in  $C(\frac{c'}{d'})$  vstavimo zvezi (4) in (6):

$$\begin{aligned} b'c' - a'd' &= 1, \\ \sqrt{\lambda}bc' - a'\sqrt{\lambda}d &= 1, \\ \sqrt{\lambda}(bc' - a'd) &= 1. \end{aligned} \tag{7}$$

To pa je možno le tedaj, ko je  $\lambda = 1$ . Prispeli smo do protislovja, kar pomeni, da si trikotnika nista podobna. Zakaj so pitagorejske trojice primitivne? Če so dolžine stranic posameznega pravokotnega trikotnika paroma tuja si cela števila, že določajo primitivno pitagorejsko trojico. Če imajo ta cela števila skupni celoštevilski faktor, jih z njim delimo (to geometrijsko pomeni, da konstruiramo podobni trikotnik), kar nam da primitivno pitagorejsko trojico. Če pa so dolžine stranic racionalna števila, jih pomnožimo z najmanjšim skupnim večkratnikom njihovih imenovalcev in dobimo enega izmed zgornjih primerov.  $\square$

**3.2. Posplošeni Fordovi krogi.** V prejšnjem razdelku smo se ukvarjali s Fordovimi krogi, ki so bili enolično določeni z racionalnim številom. Natančneje, za dan okrajšan ulomek  $\frac{p}{q}$  smo konstruirali Fordov krog na zgornji polravnini evklidske ravnine, ki se abscisne osi dotika v točki  $\frac{p}{q}$ , njegov polmer pa meri  $\frac{1}{2q^2}$ . Nadaljujemo lahko s splošnejšimi Fordovimi krogi, ki so definirani na povsem enak način, le da imajo polmer enak  $\frac{1}{2hq^2}$ , pri čemer je  $h$  poljubno realno število. Imenujemo jih tudi Speiserjevi<sup>3</sup> krogi. Če izberemo  $h = 1$ , dobimo običajne Fordove kroge.

**3.3. Fordove krogle.** Tokrat naj bosta števili  $p$  in  $q$  elementa množice Gaussovih celih števil, ki je definirana kot  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi; a, b \in \mathbb{Z}\}$ . Zapišimo  $p = p' + ip''$  in  $q = q' + iq''$ , kjer so  $p', p'', q', q'' \in \mathbb{Z}$ . Definirajmo ulomek

$$\frac{p}{q} = \frac{p' + ip''}{q' + iq''} = \frac{(p' + ip'')(q' - iq'')}{(q' + iq'')(q' - iq'')} = \frac{p'q' + p''q''}{q'^2 + q''^2} + i \frac{p''q' - p'q''}{q'^2 + q''^2},$$

ki pripada kompleksnim številom, in ga okrajšajmo. Geometrijsko predstavlja točko v Gaussovi  $xy$ -ravnini z realno in imaginarno koordinato. Gaussovo ravnino postavimo v prostor, določen z osjo  $z$ , pravokotno na Gaussovo ravnino, in opazujemo podprostor, ki pripada pozitivnim vrednostim na  $z$ -osi. Analogno Fordovim krogom v ravnini pridemo do naslednjega pojma.

**Definicija 3.10.** *Fordova krogla*  $S(\frac{p}{q})$ , kjer je  $\frac{p}{q}$  okrajšan ulomek v množici kompleksnih števil, je krogla v zgornjem polprostoru, definiranem kot zgoraj, ki se  $xy$ -ravnine dotika v točki, določeni s  $\frac{p}{q}$ , njen polmer pa meri  $\frac{1}{2|q|^2}$ .

<sup>3</sup>Andreas Speiser, 10. 6. 1885–12. 10. 1970, švicarski matematik, ki se je ukvarjal s teorijo števil in teorijo grup.

Na analogen način trditvam, ki opisujejo lastnosti Fordovih krogov, lahko izpeljemo in dokažemo lastnosti Fordovih krogel. Omenimo le nekatere izmed njih.

Poljubno majhen zaprt pravokotnik v  $xy$ -ravnini vsebuje neskončno mnogo dotikališč Fordovih krogel.

V dokazu trditve 3.3 smo konstruirali pravokotni trikotnik, določen z dvema Fordovima krogoma. Naj točki  $\frac{p}{q}$  in  $\frac{P}{Q}$  določata Fordovi krogi ter konstruirajmo pravokotni trikotnik  $ABC$  kot prej. Iz zveze

$$|AB|^2 = \left| \frac{P}{Q} - \frac{p}{q} \right|^2 + \left| \frac{1}{2|Q|^2} - \frac{1}{2|q|^2} \right|^2 = \frac{|Pq - pQ|^2 - 1}{|Q|^2|q|^2} + (|AD| + |EB|)^2$$

sledi: če je  $|Pq - pQ| > 1$ , je  $|AB| > |AD| + |EB|$  in krogi sta disjunktni; sicer je  $|Pq - pQ| = 1$ , zato je  $|AB| = |AD| + |EB|$  in krogi sta tangentni.

Naj bosta  $S(\frac{p}{q})$  in  $S(\frac{P}{Q})$  tangentni Fordovi krogi. Kot prej tangentne Fordove krogle na kroglo  $S(\frac{p}{q})$  konstruiramo s pomočjo formule

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{P + np}{Q + nq},$$

le da tokrat  $n$  pripada množici Gaussovih celih števil. Nadalje nas zanima, koliko Fordovih krogel je tangentnih na kroglo  $S(\frac{P}{Q_n})$ . Uporabimo pogoj za tangentnost, izpeljan zgoraj. Računamo

$$\begin{aligned} |P_n Q_m - P_m Q_n| &= |(P + np)(Q + mq) - (P + mp)(Q + nq)| \\ &= |PQ + mPq + npQ + mnpq - PQ - nqP - mpQ - mnpq| \\ &= |Pq - pQ||m - n| = 1. \end{aligned}$$

Sledi, da je  $|m - n| = 1$ , torej je  $m - n \in \{1, -1, i, -i\}$ . Ugotovili smo, da je vsaka Fordova kroglja, ki je tangentna na dano Fordovo kroglo, tangentna še na štiri druge Fordove krogle. Velja, da so te edine tangentne krogle.

**3.4. Möbiusove transformacije na Fordovih krogih.** Do sedaj smo Fordove kroge obravnavali s pomočjo geometrijskih sredstev. V tem poglavju si bomo z algebro pomagali do nekaterih že znanih rezultatov o Fordovih krogih. Geometrijske objekte si bomo predstavljali v kompleksni ravnini, torej bo točka s koordinatama  $(x, y)$  opisana s kompleksnim številom  $z = x + iy$ .

Najprej se spomnimo naslednjega pojma iz kompleksne analize.

**Definicija 3.11.** Preslikava  $f: \mathbb{CP}^1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$ , definirana s predpisom  $f(z) = \frac{az+c}{bz+d}$ , kjer so  $a, b, c, d \in \mathbb{C}$  in  $ad - bc \neq 0$ , se imenuje *Möbiusova transformacija*.

**Opomba 3.12.** Simbol  $\mathbb{CP}^1$  označuje *Riemannovo sfero*, to je kompakifikacijo kompleksne ravnine z eno točko, kar zapišemo kot  $\mathbb{CP}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ .

**Opomba 3.13.** Števila  $a, b, c, d$  lahko pomnožimo s poljubnim neničelnim kompleksnim številom, zato lahko predpostavimo, da je  $ad - bc = 1$ .

V našem primeru bo dovolj obravnavati le  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ .

Möbiusova transformacija je meromorfna in bijektivna preslikava z inverzom, ki je spet take oblike, identična preslikava  $id(z) = z$  je Möbiusova transformacija, prav tako je kompozitum Möbiusovih transformacij Möbiusova transformacija. Množica takih preslikav tako tvori grupo za kompozitum. Preslikavo  $f$  lahko zapišemo v matrični obliki

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix},$$

kjer so  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ . Ker velja  $ad - bc = 1$ , je matrika  $A \in SL_2(\mathbb{Z})$ . Zato bomo Möbiusove transformacije predstavljali s splošno linearno grupo  $SL_2(\mathbb{Z})$ .

Ključen pri izpeljavi rezultatov o Fordovih krogih je pojem, ki ga v algebri pogosto uporabljamo.

**Definicija 3.14.** *Delovanje grupe  $G$  na množico  $M$  je taka preslikava  $\circ: G \times M \rightarrow M$ , za katero velja:*

- (1)  $e \circ \alpha = \alpha$  za vsak  $\alpha \in M$ , kjer je  $e$  enota grupe  $G$ ,
- (2)  $g \circ (h \circ \alpha) = (gh) \circ \alpha$  za vsak  $\alpha \in M$  in vsaka  $g, h \in G$ .

Ekvivalentno, delovanje grupe  $G$  na množico  $M$  je homomorfizem iz grupe  $G$  v grupo permutacij množice  $M$ .

**Primer 3.15.** Naj bo  $G$  grupa permutacij  $n$  elementov, torej  $G = S_n$ ,  $M$  pa naj bo množica  $M = \{1, 2, \dots, n\}$ . Delovanje grupe  $G$  na množico  $M$  je preslikava  $\circ: G \times M \rightarrow M$  s predpisom  $(\pi, \alpha) \mapsto \pi(\alpha) = \pi \circ \alpha$ .  $\diamond$

**Definicija 3.16.** Fordov krog  $C(\frac{1}{0})$ , katerega polmer je neskončen, je premica  $\mathbb{R} + i$ .

**Izrek 3.17.** *Möbiusova transformacija slika Fordove kroge v Fordove kroge.*

*Dokaz.* Naj bo Möbiusova transformacija dana z matriko

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}).$$

Vemo, da tovrstna preslikava slika premice in krožnice v premice in krožnice. Ideja dokaza je pokazati, da grupa  $SL_2(\mathbb{Z})$  deluje na množico Fordovih krogov.

S krajšim računom se lahko prepričamo, da je grupa  $SL_2(\mathbb{Z})$  generirana z matrikama  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  in  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ . To pomeni, da je vsako Möbiusovo transformacijo moč zapisati kot kompozitum preslikav  $z \mapsto z + 1$  in  $z \mapsto -\frac{1}{z}$ , ki ustrezata generatorjema. Trdimo, da Möbiusova transformacija preslika Fordov krog z intervala  $[0, 1]$  v Fordov krog z intervala  $[n, n + 1]$ , kjer  $n$  pripada množici celih števil.

Preslikava  $z \mapsto z + 1$  je translacija, zato zgornje očitno velja.

Kaj pa preslikava  $z \mapsto -\frac{1}{z}$ ? Najprej si oglejmo splošen primer. Naj bo original Fordov krog s polmerom  $r$  in središčem v  $\alpha$ , predstavljen z enačbo  $|z - \alpha| = r$ . Prepišimo enačbo v

$$(8) \quad \begin{aligned} (z - \alpha)(\bar{z} - \bar{\alpha}) &= r^2, \\ z\bar{z} - \alpha\bar{z} - \bar{\alpha}z + \alpha\bar{\alpha} - r^2 &= 0 \end{aligned}$$

in označimo  $R = \alpha\bar{\alpha} - r^2$ . Polmer lahko izrazimo kot  $r = \sqrt{|\alpha|^2 - R}$ . Preslikajmo original s preslikavo  $z \mapsto -\frac{1}{z}$ . Enačba slike se glasi

$$(9) \quad \begin{aligned} \left(-\frac{1}{z}\right)\left(-\frac{1}{\bar{z}}\right) + \alpha\frac{1}{\bar{z}} + \bar{\alpha}\frac{1}{z} + R &= 0, \\ 1 + \alpha z + \bar{\alpha}\bar{z} + Rz\bar{z} &= 0, \\ z\bar{z} + \frac{\bar{\alpha}}{R}\bar{z} + \frac{\alpha}{R}z + \frac{1}{R} &= 0. \end{aligned}$$

Sedaj vzemimo Fordov krog  $C(\frac{p}{q})$ . Njegov polmer meri  $\frac{1}{2q^2}$ , središče pa je v točki  $\frac{p}{q} + i\frac{1}{2q^2}$ . Izračunajmo

$$R = \alpha\bar{\alpha} - r^2 = \left(\frac{p}{q} + i\frac{1}{2q^2}\right)\left(\frac{p}{q} - i\frac{1}{2q^2}\right) - \frac{1}{4q^4} = \frac{p^2}{q^2} + \frac{1}{4q^4} - \frac{1}{4q^4} = \frac{p^2}{q^2}$$

in preverimo, da je slika izbranega Fordovega kroga tudi Fordov krog. Res, središče slike je po enačbi (9) v točki

$$-\frac{\bar{\alpha}}{R} = -\frac{\frac{p}{q} - i\frac{1}{2q^2}}{\frac{p^2}{q^2}} = -\frac{q}{p} + i\frac{1}{2p^2},$$

polmer pa meri

$$\sqrt{\left|-\frac{\bar{\alpha}}{R}\right|^2 - \frac{1}{R}} = \sqrt{\frac{\bar{\alpha}\alpha}{R^2} - \frac{1}{R}} = \frac{1}{R}\sqrt{|\alpha|^2 - R} = \frac{1}{R}\frac{1}{2q^2} = \frac{q^2}{2p^2q^2} = \frac{1}{2p^2}.$$

Dokazali smo, da preslikavi, ki generirata grupo Möbiusovih transformacij, Fordov krog preslikata v Fordov krog z intervala  $[n, n+1]$  za  $n \in \mathbb{Z}$ . Da dobimo Fordov krog z intervala  $[0, 1]$ , moramo prvotno preslikavo komponirati z  $n$  translacijami v levo (za  $-1$ ). Ker identiteta slika Fordov krog vase in je kompozitum Möbiusovih transformacij dobro definiran, grupa  $SL_2(\mathbb{Z})$  res deluje na množico Fordovih krogov.  $\square$

**Trditev 3.18.** *Möbiusova transformacija s predpisom*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

*ohranja tangentnost Fordovih krogov.*

*Dokaz.* Kot v definiciji 3.11 zapišimo Möbiusovo transformacijo v obliki  $f(z) = \frac{az+c}{bz+d}$ , kjer so  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  in velja  $ad - bc = 1$ . Vzemimo Fordova kroga  $C(\frac{e}{f})$  in  $C(\frac{g}{h})$  in pogledajmo, kam se preslikata. Ker velja izrek 3.17 in je Fordov krog enolično določen s točko, v kateri se dotika realne osi v kompleksni ravnini, je dovolj poznati sliko te točke. Izračunajmo

$$f\left(\frac{e}{f}\right) = \frac{a\frac{e}{f} + c}{b\frac{e}{f} + d} = \frac{ae + cf}{be + df},$$

od koder sledi, da se Fordov krog  $C(\frac{e}{f})$  preslika v Fordov krog  $C(\frac{ae+cf}{be+df})$ . Podobno,

$$f\left(\frac{g}{h}\right) = \frac{a\frac{g}{h} + c}{b\frac{g}{h} + d} = \frac{ag + ch}{bg + dh},$$

in  $C(\frac{g}{h})$  se preslika v  $C(\frac{ag+ch}{bg+dh})$ . Označimo  $e' = ae + cf$ ,  $f' = be + df$ ,  $g' = ag + ch$  in  $h' = bg + dh$ . Računajmo

$$e'h' - f'g' = (ae + cf)(bg + dh) - (be + df)(ag + ch) = (ad - bc)(eh - fg),$$

$$|e'h' - f'g'| = |ad - bc||eh - fg| = |eh - fg|.$$

Iz zadnje enakosti in trditve 3.4 sledi, da sta Fordova kroga tangentna natanko tedaj, ko sta tangentni njuni sliki, kar smo želeli pokazati.  $\square$

**Primer 3.19.** V naslednjih primerih si bomo ogledali, kam Möbiusova transformacija preslika nekatere Fordove kroge. Kot smo videli v zgornjem dokazu, je dovolj poznati sliko točke v dotikališču Fordovega kroga in realne osi.

Fordov krog  $C(\frac{0}{1})$  se realne osi dotika v točki  $(0, 0)$ , kar je v jeziku kompleksnih števil enako 0, njegov polmer pa meri  $\frac{1}{2}$ . Ker je  $f(0) = \frac{a \cdot 0 + c}{b \cdot 0 + d} = \frac{c}{d}$ , se  $C(\frac{0}{1})$  preslika v Fordov krog  $C(\frac{c}{d})$ .

Fordov krog  $C(\frac{1}{1})$  vsebuje točko  $(1, 0)$  na realni osi oziroma kompleksno število 1. Vrednost  $f(1) = \frac{a \cdot 1 + c}{b \cdot 1 + d} = \frac{a+c}{b+d}$ , zato je slika Fordov krog  $C(\frac{a+c}{b+d})$ .



Kaj pa Fordov krog  $C(\frac{1}{0})$ ? Ta je poseben predstavnik obravnavane množice, saj je njegov polmer neskončen in ga edinega predstavimo s premico v kompleksni ravnini. Ker se ne dotika realne osi, zgornja strategija ne deluje. Raje vzemimo poljubno točko na premici, Fordovemu krogu  $C(\frac{1}{0})$ , ki jo zapišemo kot  $x+i$ , kjer je  $x \in \mathbb{R}$ . Ta se preslika v točko  $f(x+i) = \frac{ax+ai+c}{bx+bi+d}$ , ki leži na krožnici z enačbo  $|z - (\frac{a}{b} + i\frac{1}{2b^2})| = \frac{1}{2b^2}$ , ta pa ustreza Fordovemu krogu  $C(\frac{a}{b})$ .  $\diamond$

## SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV

### LITERATURA

- [1] J. Ainsworth, M. Dawson, J. Pianta in J. Warwick, *The Farey sequence*, diplomsko delo, School of Mathematics, University of Edinburgh, 2012; dostopno tudi na <https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/fareyproject.pdf>.
- [2] L. R. Ford, *Fractions*, v: The American Mathematical Monthly (ur. E. J. Moulton) **45**, Mathematical Association of America, 1938, str. 586–601.
- [3] S. B. Guthery, *A motif of mathematics*, Docent Press, Boston, 2011; dostopno tudi na <https://www.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/farey.pdf>.
- [4] G. H. Hardy in E. M. Wright, *An introduction to the theory of numbers*, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 1960.
- [5] A. Hatcher, *Topology of numbers*, verzija junij 2018, [ogled 31. 10. 2018], dostopno na <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/TN/TNpage.html>.
- [6] M. Strnad, *Pitagorov izrek pred Pitagorom*, Presek **17** (1989) 8–11; dostopno tudi na <http://www.presek.si/17/966-Strnad.pdf>.