

# Projekt pri predmetu Matematično modeliranje

TJAŠA VRHOVNIK  
Fakulteta za matematiko in fiziko  
Oddelek za matematiko

17. avgust 2019

## 1 Naloga

Rešujemo naslednji problem: V ravnini sta dani dve točki,  $T_1(x_1, y_1)$  in  $T_2(x_2, y_2)$ , kjer je  $y_1 > y_2$  in  $x_1 < x_2$ . Med vsemi kubičnimi polinomi, ki potekajo skozi točke  $T_1, T_2$  in  $T_3 = T_1 + \frac{1}{2}(T_2 - T_1)$ , iščemo tistega, ki minimizira čas potovanja kroglice po njegovem grafu od  $T_1$  do  $T_2$ .

## 2 Rešitev

Naloga se zdi podobna znamenitemu problemu o brahistohroni, ki ga je zastavil Jacob Bernoulli. Označimo iskan polinom s  $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ . Polinom  $p$  bo določen, ko bomo poznali njegove koeficiente  $a, b, c$  in  $d$ . Za lažje računanje za začetek prestavimo točke tako, da bo  $T_1$  v koordinatnem izhodišču. Označimo nove točke:

$$\begin{aligned}T'_1 &= (0, 0), \\T'_2 &= T_2 - T_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1), \\T'_3 &= T_3 - T_1 = \frac{1}{2}(T_2 - T_1) = \frac{1}{2}T'_2.\end{aligned}$$

S tem bo graf polinoma med  $T'_1$  in  $T'_2$  ves čas pod abscisno osjo. Če bi graf dosegel nenegativno vrednost med točkama  $T'_1$  in  $T'_3$ , bi bil vodilni koeficient polinoma  $p$  pozitiven. To bi pomenilo, da bi se kroglica iz začetne točke dvigala, kar fizikalno ni mogoče. Predvidevamo tudi, da so vrednosti polinoma med točkama  $T'_3$  in  $T'_2$  povsod negativne; to bomo kasneje potrdili z numeričnimi primeri.

Izračunajmo koeficiente polinoma  $p$ . Vemo, da je kubični polinom enolično določen s štirimi točkami v ravnini. V našem primeru so znane tri točke na polinomu, kar pomeni, da bomo imeli en prost parameter. Vstavimo koordinate točk  $T'_1, T'_2$  in  $T'_3$  v izraz za polinom  $p$  in računajmo:

$$p(0) = d = 0, \quad (1)$$

$$p(x_2 - x_1) = a(x_2 - x_1)^3 + b(x_2 - x_1)^2 + c(x_2 - x_1) = y_2 - y_1, \quad (2)$$

$$p\left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right) = a\left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right)^3 + b\left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right)^2 + c\frac{x_2 - x_1}{2} = \frac{y_2 - y_1}{2}. \quad (3)$$

Pomnožimo enačbo (3) z 2 in jo odštejmo od enačbe (2). Dobimo

$$\begin{aligned}\frac{3}{4}a(x_2 - x_1)^3 + \frac{1}{2}b(x_2 - x_1)^2 &= 0, \\ \frac{3}{2}a(x_2 - x_1) + b &= 0, \\ b &= -\frac{3}{2}a(x_2 - x_1).\end{aligned} \quad (4)$$

Koeficient  $c$  izrazimo iz enačbe(2), pri čemer upoštevamo zgornji izraz za  $b$ .

Računamo

$$\begin{aligned}
 c(x_2 - x_1) &= y_2 - y_1 - a(x_2 - x_1)^3 - b(x_2 - x_1)^2 \\
 &= y_2 - y_1 - a(x_2 - x_1)^3 + \frac{3}{2}a(x_2 - x_1)^3 \\
 &= y_2 - y_1 + \frac{1}{2}a(x_2 - x_1)^3, \\
 c &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} + \frac{1}{2}a(x_2 - x_1)^2.
 \end{aligned} \tag{5}$$

Koeficiente polinoma  $p$  smo izrazili s koeficientom  $a$ , ki je še neznan parameter. Tega bomo določili z minimizacijo časa potovanja po grafu polinoma.

Čas, ki ga kroglica potrebuje za pot med točkama  $T'_1$  in  $T'_2$  se izraža z integralom

$$t = \int_{T'_1}^{T'_2} \frac{ds}{v}. \tag{6}$$

Upoštevajmo zakon o ohranitvi energije. V našem primeru pravi, da se vsota kinetične in potencialne energije kroglice med potovanjem ohranja. Uporabimo razmislek, da je graf polinoma ves čas pod abscisno osjo – enačba se tako glasi

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(-p),$$

od koder izrazimo hitrost

$$v = \sqrt{2g(-p)}.$$

Vemo še, da je ločna dolžina enaka  $ds^2 = dx^2 + dp^2$ . Označimo parcialni odvod polinoma  $p$  po spremenljivki  $x$  z  $\frac{dp}{dx} = p'$ . Enačba (6) torej dobi obliko

$$T(a) = \int_0^{x_2-x_1} \sqrt{\frac{1+p'^2}{-2gp}} dx, \tag{7}$$

kjer smo s  $T$  označili funkcijo časa, odvisno od parametra  $a$ . Naša naloga je poiskati njen minimum.

## Literatura

- [1] Zapiski s predavanj prof. E. Žagarja pri predmetu Matematično modeliranje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (študijsko leto 2018/2019).