

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 2. stopnja

Tjaša Vrhovnik

## **MINIMALNE PLOSKVE**

Magistrsko delo

Mentor: prof. dr. Franc Forstnerič

Ljubljana, 2021



# Zahvala



# Kazalo

Program dela	vii
<b>1 Uvod</b>	<b>1</b>
<b>2 Osnovni pojmi</b>	<b>1</b>
2.1 Mnogoterosti . . . . .	1
2.2 Vektorska polja in diferencialne 1-forme . . . . .	4
2.3 Ukrivljenost ploskve . . . . .	6
2.4 Holomorfne in harmonične funkcije . . . . .	7
2.5 Aproksimacijski in interpolacijski izreki za Riemannove ploskve . . . .	8
<b>3 Minimalne ploskve</b>	<b>10</b>
3.1 Grafi z minimalno ploščino . . . . .	10
3.2 Variacija ploščine . . . . .	13
3.3 Weierstrassova formula . . . . .	16
3.3.1 Plateaujev problem in Dirichletov energijski integral . . . . .	16
3.3.2 Rezultati . . . . .	17
3.4 Gaussova preslikava . . . . .	20
3.5 Primeri minimalnih ploskev . . . . .	21
3.5.1 Katenoida . . . . .	22
3.5.2 Helikoid . . . . .	24
3.5.3 Enneperjeva ploskev . . . . .	25
<b>4 Izreki o aproksimaciji in interpolaciji minimalnih ploskev</b>	<b>25</b>
4.1 Prostori preslikav in posplošene minimalne imerzije . . . . .	26
4.2 Periodno dominantni spreji . . . . .	29
4.3 Aproksimacija in interpolacija preslikav v punktirano ničelno kvadriko	32
4.4 Glavni izrek . . . . .	35
4.4.1 Nekritični primer . . . . .	35
4.4.2 Konstrukcija poti s predpisanimi integrali . . . . .	37
4.4.3 Morsejeva teorija in ročajniki . . . . .	38
4.4.4 Glavni izrek . . . . .	41
4.5 Mittag-Lefflerjev izrek . . . . .	45
4.6 Komplettnost . . . . .	49



# Program dela

## Osnovna literatura

Literatura mora biti tukaj posebej samostojno navedena (po pomembnosti) in ne le citirana. V tem razdelku literature ne oštevilčimo po svoje, ampak uporabljamo okolje itemize in ukaz plancite, saj je celotna literatura oštevilčena na koncu.

[?]

[?]

[?]

[?]

Podpis mentorja:





## Minimalne ploskve

### POVZETEK

Tukaj napišemo povzetek vsebine. Sem sodi razlaga vsebine in ne opis tega, kako je delo organizirano.

### English translation of the title

### ABSTRACT

An abstract of the work is written here. This includes a short description of the content and not the structure of your work.

**Math. Subj. Class. (2010):** oznake kot 74B05, 65N99, na voljo so na naslovu <http://www.ams.org/msc/msc2010.html>

**Ključne besede:**

**Keywords:**



# 1 Uvod

## 2 Osnovni pojmi

### 2.1 Mnogoterosti

**Definicija 2.1** (Topološka mnogoterost). Naj bo  $n \in \mathbb{N}$ . Topološki prostor  $M$  z lastnostmi:

1.  $M$  je Hausdorffov,
2.  $M$  je 2-števen,
3.  $M$  je lokalno Evklidski prostor dimenzije  $n$  (za vsak  $p \in M$  obstajata odprta okolica  $U \subset M$  in homeomorfizem  $\phi: U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ , kjer je  $V$  odprta množica),

imenujemo *topološka mnogoterost* dimenzije  $n$ .

Na topološki mnogoterosti  $M$  dimenzije  $n$  definiramo *atlas*  $\mathcal{U} = \{(U_i, \phi_i); i \in I\}$  kot družino parov  $(U_i, \phi_i)$ , kjer je  $\{U_i\}_{i \in I}$  odprto pokritje mnogoterosti  $M$ , preslikave  $\phi_i: U_i \rightarrow \phi_i(U_i) \subset \mathbb{R}^n$  pa so homeomorfizmi za vse  $i$ . Par  $(U_i, \phi_i)$  imenujemo *lokalna karta*. Vzemimo lokalni karti  $(U_i, \phi_i)$  in  $(U_j, \phi_j)$ ,  $i \neq j$ , za kateri velja  $U_{ij} = U_i \cap U_j \neq \emptyset$ . Difeomorfizmu  $\phi_{ij} = \phi_j \circ \phi_i^{-1}: \phi_i(U_{ij}) \rightarrow \phi_j(U_{ij})$  med odprtima podmnožicama  $\mathbb{R}^n$  pravimo *prehodna preslikava* med lokalnima kartama. Atlas je razreda  $\mathcal{C}^r$  za  $r \geq 1$ , kadar so prehodne preslikave med vsemi lokalnimi kartami difeomorfizmi razreda  $\mathcal{C}^r$ . V tem primeru rečemo, da je  $M$  *mnogoterost razreda  $\mathcal{C}^r$* . V posebnem gladek atlas določa gladko mnogoterost.

**Definicija 2.2.** Naj bo  $X$  mnogoterost razreda  $\mathcal{C}^r$  razsežnosti  $\dim X = n$  in  $M \subset X$  njena podmnožica. Če za vsako točko  $p \in M$  obstaja lokalna karta  $(U, \phi)$  glede na atlas  $\mathcal{U}$  mnogoterosti  $X$ , tako da je preslikava  $\phi: U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$  homeomorfizem in velja  $\phi(M \cap U) = V \cap (\mathbb{R}^m \times \{0\}^{n-m})$ , potem  $M$  imenujemo *podmnogoterost* razreda  $\mathcal{C}^r$  razsežnosti  $\dim M = m$ .

**Definicija 2.3** (Orientacija mnogoterosti). Naj bo  $M$  gladka mnogoterost in  $\mathcal{U}$  pripadajoč gladek atlas. Lokalni karti  $(U, \phi)$  in  $(V, \psi)$  določata isto orientacijo na  $M$ , če za poljubno točko  $p \in U \cap V \neq \emptyset$  velja  $\det(d(\psi \circ \phi^{-1})_{\phi(p)}) > 0$ . Kadar poljubni lokalni karti glede na izbrani atlas  $\mathcal{U}$  določata isto orientacijo, pravimo, da je atlas  $\mathcal{U}$  *orientiran*. Nadalje je mnogoterost *orientabilna*, če premore orientiran atlas. *Orientacija* mnogoterosti  $M$  je izbor maksimalnega orientiranega atlasa na  $M$ .

Definirati želimo še tangentni prostor mnogoterosti. Naj bo  $M$  gladka mnogoterost in izberimo atlas  $\mathcal{U} = \{(U_i, \phi_i); i \in I\}$  na njej. Naj bo točka  $p \in U_i \subset M$  za nek indeks  $i$ . Gladki krivulji<sup>1</sup>  $\gamma_1, \gamma_2: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$  sta *ekvivalentni*, če izpolnjujeta pogoja  $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = p$  in  $\frac{d}{dt}|_{t=0} \phi_i(\gamma_1(t)) = \frac{d}{dt}|_{t=0} \phi_i(\gamma_2(t))$  za vse  $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ . Ekvivalenco krivulj označimo z  $\gamma_1 \sim \gamma_2$ <sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Krivulja  $\gamma_j$  je gladka, če je preslikava  $\phi_i \circ \gamma_j: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $j = 1, 2$ , gladka v običajnem smislu.

<sup>2</sup>Relacija  $\sim$  je ekvivalenčna relacija.

**Definicija 2.4.** Naj bo  $M$  mnogoterost in  $p \in M$  točka na njej. *Tangentni vektor*  $v_p$  na  $M$  v točki  $p$  ustreza ekvivalenčnemu razredu  $[\gamma]$  krivulje  $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ , za katero velja  $\gamma(0) = p$ .

Unija vseh tangentnih vektorjev na  $M$  v točki  $p$  določa *tangentni prostor*  $T_p M$  mnogoterosti  $M$  v točki  $p$ .

Naj bosta  $M$  in  $N$  mnogoterosti dimenzij  $\dim M = m$ ,  $\dim N = n$  ( $m, n \in \mathbb{N}$ ). Naj bo  $r \geq 0$ . Pravimo, da je zvezna preslikava  $f: M \rightarrow N$  *razreda  $\mathcal{C}^r$  v točki  $p \in M$* , če obstajata taki  $\mathcal{C}^r$  karti  $(U, \phi)$  na  $M$  v okolici točke  $p \in M$  in  $(V, \psi)$  na  $N$  v okolici točke  $f(p) \in N$ , da je preslikava  $F = \psi \circ f \circ \phi^{-1}$  razreda  $\mathcal{C}^r$  v okolici točke  $\phi(p)$ . Če to velja za poljubno točko  $p \in M$ , je  $f$  *razreda  $\mathcal{C}^r$* ; pišemo  $f \in \mathcal{C}^r(M, N)$ .

Vzemimo gladki (oz. razreda  $\mathcal{C}^r$ ,  $r \geq 1$ ) mnogoterosti  $M$  in  $N$  ter točko  $p \in M$ . *Diferencial* gladke (oz. razreda  $\mathcal{C}^r$ ) preslikave  $f: M \rightarrow N$  je linearna preslikava  $df: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ , definirana s predpisom

$$(df_p)[\gamma] = [f \circ \gamma]. \quad (2.1)$$

**Definicija 2.5.** Naj bo  $f: M \rightarrow N$  gladka preslikava med gladkima mnogoterostima. Preslikava  $f$  se imenuje

1. *imerzija* v točki  $p \in M$ , če je njen diferencial  $df_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$  injektiven;
2. *submerzija* v točki  $p \in M$ , če je njen diferencial  $df_p$  surjektiven;
3. *lokalni difeomorfizem* v točki  $p \in M$ , če obstajata taki okolici  $U \subset M$  za  $p$  in  $V \subset N$  za  $f(p)$ , da je zožitev  $f|_U: U \rightarrow V$  difeomorfizem;
4. *vložitev*, če je  $f$  injektivna preslikava in slika  $f(M) \subset N$  podmnogoterost.

**Opomba 2.6.** Z uporabo izreka o implicitni preslikavi dokažemo naslednje: Če je  $f: M \rightarrow N$  submerzija v okolici točke  $p \in U$  ( $U \subset M$  odprta), potem je prasluka  $f^{-1}(f(p))$  podmnogoterost v  $M$  razsežnosti  $\dim M - \dim N$ .

**Definicija 2.7** (Riemannova mnogoterost). Naj bo  $M$  gladka mnogoterost. Za vsako točko  $p \in M$  definiramo simetrično pozitivno-definitno bilinearno preslikavo  $g_p: T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ , ki je gladko odvisna od  $p$ . Družino preslikav  $g_p$  imenujemo *Riemannova metrika*  $g$  na mnogoterosti  $M$ . Gladki mnogoterosti, opremljeni z Riemannovo metriko, pravimo *Riemannova mnogoterost*, in jo označimo z  $(M, g)$ .

Izkaže se, da vsaka mnogoterost razreda  $\mathcal{C}^{r+1}$  premore Riemannovo metriko razreda  $\mathcal{C}^r$ .

Naj bo  $M$  domena v  $\mathbb{R}^n$  s koordinatami  $x = (x_1, \dots, x_n)$ . Riemannova metrika na  $M$  je tedaj oblike

$$g_p = \sum_{i,j=1}^n g_{i,j}(p) dx_i dx_j, \quad p \in M, \quad (2.2)$$

kjer je  $G(p) = [g_{i,j}(p)]_{i,j=1}^n$  simetrična pozitivno-definitna matrika za vse  $p \in M$ . Za tangentna vektorja  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ ,  $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n) \in \mathbb{R}^n$  velja

$$g_p(\xi, \eta) = \sum_{i,j=1}^n g_{i,j}(p) \xi_i \eta_j = G(p) \xi \cdot \eta. \quad (2.3)$$

Vzemimo gladko imerzijo  $x: M \rightarrow \widetilde{M}$  in Riemannovo metriko  $\tilde{g}$  na  $\widetilde{M}$ . *Povlečeno metriko*  $g = x^*\tilde{g}$  na  $M$ , definirano na paru tangentnih vektorjev  $\xi, \eta \in T_p M$ , podaja predpis

$$g_p(\xi, \eta) = \tilde{g}_{x(p)}(dx_p(\xi), dx_p(\eta)). \quad (2.4)$$

Če je metrika  $\tilde{g}$  razreda  $\mathcal{C}^r$  in imerzija  $x$  razreda  $\mathcal{C}^{r+1}$ , potem je tudi povlečena metrika  $g = x^*\tilde{g}$  razreda  $\mathcal{C}^r$ .

**Primer 2.8** (Prva fundamentalna forma). Oglejmo si primer Riemannove metrike na realnem  $n$ -razsežnem Evklidskem prostoru  $\mathbb{R}^n$ . Če izberemo standardne koordinate  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , *Evklidsko metriko* definira predpis

$$ds^2 = (dx_1)^2 + \dots + (dx_n)^2; \quad (2.5)$$

to je Riemannova metrika, ki ustreza identični matriki  $I_n$ . Naj bo  $D$  domena v  $\mathbb{R}^2$  in  $x: D \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija, podana s predpisom  $x(u_1, u_2) = (x_1(u_1, u_2), \dots, x_n(u_1, u_2))$  za  $(u_1, u_2) \in D$ . Pripadajoča metrika na  $D$  je enaka

$$g = x^*ds^2 = g_{1,1}du_1^2 + g_{1,2}du_1du_2 + g_{2,1}du_2du_1 + g_{2,2}du_2^2, \\ g_{1,1} = |x_{u_1}|^2, \quad g_{1,2} = g_{2,1} = x_{u_1} \cdot x_{u_2}, \quad g_{2,2} = |x_{u_2}|^2$$

in jo imenujemo *prva fundamentalna forma* ploskve  $M = x(D)$ .

**Definicija 2.9.** *Riemannova ploskev* je kompleksna mnogoterost kompleksne dimenzije 1.

**Definicija 2.10.** Naj bo  $M$  mnogoterost brez roba in  $K$  njena zaprta podmnožica. Povezano komponento v  $M \setminus K$ , katere zaprtje je kompaktno v  $M$ , imenujemo *luknja* množice  $K$  v  $M$ .

**Definicija 2.11.** *Jordanov lok* je pot v ravnini, ki je topološko izomorfna intervalu  $[0, 1]$ . *Jordanova krivulja* je ravninska krivulja, ki je topološko ekvivalentna enotski krožnici.

**Definicija 2.12** (Transverzalnost). Naj bo  $X$  gladka mnogoterost in  $M, N \subset X$  njeni vloženi podmnogoterosti, katerih presek je neprazen. Če za točko  $p \in M \cap N$  velja

$$T_p M + T_p N = T_p X,$$

potem rečemo, da se mnogoterosti  $M$  in  $N$  sekata *transverzalno* v  $p$ . V tem primeru pišemo  $M \pitchfork_p N$ .

Splošneje, diferenciable preslikava  $f: M \rightarrow X$  je *transverzalna* na podmnogoterost  $N \subset X$  v točki  $p \in M$ , če velja ali  $f(p) \notin N$  ali  $f(p) \in N$  in je

$$df_p(T_p M) + T_{f(p)} N = T_{f(p)} X.$$

To označimo z  $f \pitchfork_p N$ . Kadar zgornji pogoj velja v vsaki točki  $p \in M$ , pravimo, da je preslikava  $f$  transverzalna na podmnogoterost  $N$ ;  $f \pitchfork N$ .

Spomnimo se še enega topološkega pojma. Naj bo  $M$  povezana mnogoterost in  $x_0 \in M$  izbrana točka. Zanimajo nas zanke v  $M$ , ki gredo skozi izbrano točko, natančneje, zvezne preslikave  $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ ,  $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$ . Označimo množico vseh takih zank z  $\Gamma(x_0)$  in na njej vpeljimo ekvivalenčno relacijo  $\sim$  na naslednji način:

$\gamma_1 \sim \gamma_2 \iff$  obstaja zvezna preslikava  $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow M$ , ki zadošča

- $H(0, s) = H(1, s) = x_0$  za vse  $s \in [0, 1]$ ,
- $H(t, 0) = \gamma_1(t)$  in  $H(t, 1) = \gamma_2(t)$  za vse  $t \in [0, 1]$ .

Preslikavo  $H$  imenujemo *homotopija*, zanki, ki premoreta homotopijo pa *homotopsko ekvivalentni*. Kvocient  $\pi_1(M, x_0) = \Gamma(x_0)/\sim$  imenujemo *prva fundamentalna grupa* mnogoterosti  $M$  glede na točko  $x_0$ , njeno abelizacijo  $H_1(M, \mathbb{Z})$  pa *prva homološka grupa* mnogoterosti  $M$  s celimi koeficienti.

## 2.2 Vektorska polja in diferencialne 1-forme

**Definicija 2.13.** Naj bo  $r \geq 1$  ter  $E$  in  $B$  mnogoterosti razreda  $\mathcal{C}^r$ . Surjektivno preslikavo  $\pi: E \rightarrow B$  imenujemo realen *vektorski sveženj* ranga  $n$  in razreda  $\mathcal{C}^r$ , če

1. je vsako vlakno  $\pi^{-1}(b) = E_b$ ,  $b \in B$ ,  $n$ -razsežen realen vektorski prostor:  $E_b \cong \mathbb{R}^n$ ,
2. za vsak  $b \in B$  obstajata okolica  $b \in U \subset B$  in difeomorfizem  $\tau: E|_U \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r$ , tako da je za vsak  $x \in U$  preslikava  $\tau_x: E_x \rightarrow \{x\} \times \mathbb{R}^n$  linearni izomorfizem. Preslikavi  $\tau_x$  pravimo *lokalna trivializacija*.

Če ima vlakno strukturo kompleksnega vektorskega prostora, na ustreznih mestih v definiciji zamenjamo  $\mathbb{R}^n$  s  $\mathbb{C}^n$  – v tem primeru dobimo kompleksen vektorski sveženj.

**Definicija 2.14.** *Prerez* vektorskega svežnja  $\pi: E \rightarrow B$  je preslikava  $s: B \rightarrow E$ , za katero velja  $\pi \circ s = id_B$ . Ekvivalentno, za vsak  $b \in B$  je  $s(b) \in \pi^{-1}(b) = E_b$ , torej prerez vsako točko baznega prostora slika v točko v vlaknu nad  $b$ .

Omenimo poseben primer vektorskega svežnja, ki bo pomemben v nadaljevanju. Naj bo  $X$  mnogoterost razreda  $\mathcal{C}^r$  z  $r \geq 1$ . Njen *tangentni sveženj* je disjunktna unija tangentnih prostorov na  $X$  v točkah  $x \in X$ :

$$TX = \bigsqcup_{x \in X} T_x X. \quad (2.6)$$

Tangentni sveženj je vektorski sveženj ranga  $n = \dim X$  in razreda  $\mathcal{C}^{r-1}$ .

**Definicija 2.15.** Naj bo  $X$  mnogoterost razreda  $\mathcal{C}^r$ , kjer je  $r \geq 1$ . Prerez njenega tangentnega svežnja, to je preslikava

$$V: X \rightarrow TX, \quad V(x) = V_x \in T_x X, \quad x \in X, \quad (2.7)$$

se imenuje *vektorsko polje* na  $X$ . Prostor vektorskih polj na  $X$  označimo z  $\Gamma(X)$ .

**Definicija 2.16.** Naj bo  $V$  vektorsko polje na mnogoterosti  $X$  in  $x \in X$  točka, v kateri je vektorsko polje neničelno. Pot  $\gamma_x: (-\varepsilon, \varepsilon) \subset \mathbb{R} \rightarrow X$  razreda  $\mathcal{C}^1$  je *integralna krivulja* vektorskega polja  $V$  skozi  $x$ , če je  $\gamma_x(0) = x$  in

$$\dot{\gamma}_x(t) = V(\gamma_x(t)) \in T_{\gamma_x(t)}X, \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon). \quad (2.8)$$

Naj bo  $U \subset X$  odprta množica, na kateri je vektorsko polje  $V$  neničelno. Tok vektorskega polja  $V$  na  $U$  je 1-parametrična družina preslikav  $\Phi_t: U \rightarrow \Phi_t(U)$ , definiranih s predpisi  $\Phi_t(x) = \gamma_x(t)$ .

Vektorsko polje  $V$  lahko v lokalnih koordinatah  $x = (x_1, \dots, x_n)$  na odprti podmnožici  $U \subset X$  zapišemo kot

$$V(m) = \sum_{i=1}^n V_i(m) \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_m, \quad (2.9)$$

kjer so  $V_i$  realne funkcije na  $U$ , diferenciali  $\frac{\partial}{\partial x_i}$  pa v vsaki točki  $m \in U$  sestavljajo bazo tangentnega prostora  $T_mX$ . Pot  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$  na  $X$  je po definiciji integralna krivulja vektorskega polja  $V$  natanko takrat, ko zadošča enakosti

$$\dot{\gamma}(t) = \sum_{i=1}^n V_i(\gamma(t)) \frac{\partial}{\partial x_i}.$$

Rešujemo sistem  $n$  navadnih diferencialnih enačb ( $i \in \{1, \dots, n\}$ )

$$\dot{\gamma}_i(t) = V_i(\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)),$$

katerega lokalna rešitev je tok vektorskega polja  $V$  na  $X$ ,  $\Phi_t(m)$ . Po eksistenčnem izreku za navadne diferencialne enačbe lokalna rešitev vedno obstaja.

Zanimajo nas dualni tangentnih prostorov ter prerezi pripradajočih svežnjev.

**Definicija 2.17.** Naj bo  $X$  gladka mnogoterost. Dualni sveženj njenega tangentnega svežnja imenujemo *kotangentni sveženj*

$$T^*X = (TX)^* = \bigsqcup_{x \in X} T_x^*X. \quad (2.10)$$

Tu je  $T_x^*X$  *kotangentni prostor* mnogoterosti  $X$  v točki  $x \in X$ , ki je sestavljen iz linearnih funkcionalov  $T_x^*X \rightarrow \mathbb{R}$ .

(Diferencialna) 1-forma na mnogoterosti  $X$  je prerez  $\alpha: X \rightarrow T^*X$  kotangentnega svežnja. Prostor diferencialnih 1-form na  $X$  označimo z  $\Omega^1(X)$ .

Diferencialno 1-formo  $\omega \in \Omega^1(X)$  imenujemo *eksaktna*, če velja  $\omega = df$  za neko funkcijo  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ .

Podobno kot vektorska polja lahko tudi 1-forme predstavimo lokalno. Naj bo  $U$  odprta podmnožica v  $X$  z lokalnimi koordinatami  $x = (x_1, \dots, x_n)$ . Če so  $a_i$  realne funkcije na  $U$  in  $dx_i$  diferenciali koordinatnih funkcij, ki v vsaki točki  $m \in U$  tvorijo bazo kotangentnega prostora  $T_m^*X$ , potem ima poljubna 1-forma na  $U$  obliko

$$\alpha(m) = \sum_{i=1}^n a_i(m) dx_i \Big|_m. \quad (2.11)$$

Baza kotangentnega prostora je dualna bazi tangentnega prostora; natančneje,

$$dx_i(m) \left( \frac{\partial}{\partial x_j}(m) \right) = \delta_{ij},$$

kjer  $\delta_{ij}$  označuje Kroneckerjev delta.

## 2.3 Ukrivljenost ploskve

Naj bo  $M$  ploskev,  $n \geq 3$  in  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Izberimo lokalno karto  $(U, \phi)$  na  $M$  in koordinate  $u = (u_1, u_2) \in U$ , tako da je zožitev  $x|_U: U \rightarrow \mathbb{R}^n$  vložitev na orientabilno ploskev  $S = x(U) \subset \mathbb{R}^n$ . Izberimo točko  $q \in U$  in  $p = x(q) \in S$  označimo njeno sliko na ploskvi  $S$ . Naj bo  $t \mapsto (u_1(t), u_2(t)) \in U$  parametrizacija krivulje razreda  $\mathcal{C}^2$  ter  $q = (u_1(t_0), u_2(t_0))$  za nek  $t_0 \in \mathbb{R}$ . Vsaka krivulja, vložena v  $S$ , ki vsebuje točko  $p$ , je tedaj oblike

$$\alpha(t) = x(u_1(t), u_2(t)). \quad (2.12)$$

Označimo z  $s = s(t)$  ločno dolžino krivulje  $\alpha$ . Predpostavimo, da izbrana točka  $p$  ustreza  $p = \alpha(s_0) \in S$ , označimo pripadajoč tangentni vektor  $\nu = \alpha'(s_0) \in T_p S$  ter enotsko normalo  $N \in N_p S$  v točki  $p$ . Količino

$$\kappa^N(p, \nu) = \alpha''(s_0) \cdot N \quad (2.13)$$

imenujemo *normalna ukrivljenost* ploskve  $S$  v točki  $p$  v tangentni smeri  $\nu$  in smeri enotske normale  $N$ .

Oglejmo si preslikavo  $\kappa^N(p, \cdot): \{\nu \in T_p S; |\nu| = 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\nu \mapsto \kappa^N(p, \nu)$ , kjer je  $p \in S$  izbrana fiksna točka. Kot zvezna preslikava na kompaktni množici doseže minimalno in maksimalno vrednost,

$$\kappa_1^N(p) = \min_{|\nu|=1} \kappa^N(p, \nu), \quad \kappa_2^N(p) = \max_{|\nu|=1} \kappa^N(p, \nu), \quad (2.14)$$

katerima pravimo *glavni ukrivljenosti* ploskve  $S$  (v točki  $p$  in normalni smeri  $N$ ).

**Definicija 2.18.** 1. *Povprečna ukrivljenost* ploskve  $S$  v točki  $p$  in normalni smeri  $N$  je povprečje glavnih ukrivljenosti,

$$H^N(p) = \frac{1}{2} (\kappa_1^N(p) + \kappa_2^N(p)). \quad (2.15)$$

2. Njun produkt

$$K^N(p) = \kappa_1^N(p) \cdot \kappa_2^N(p) \quad (2.16)$$

definira *Gaussovo ukrivljenost* ploskve  $S$  v točki  $p$  in normalni smeri  $N$ .

3. Projekcijo povprečne ukrivljenosti na normalni prostor  $N_p S$  v smeri tangentnega prostora  $T_p S$  imenujemo *vektor povprečne ukrivljenosti* ploskve  $S$  v točki  $p$  in označimo s  $\mathbf{H}$ . Enačba (2.15) se v tej notaciji glasi  $H^N(p) = \mathbf{H} \cdot N$  za vsak  $N \in N_p S$ .



**Primer 2.19** (Vektor povprečne ukrivljenosti v trirazsežnem prostoru.). Naj bo  $U \subset M$  odprta podmnožica,  $x: U \rightarrow \mathbb{R}^3$  imerzija in označimo z  $S = x(U)$  sliko, ki je ploskev, vložena v  $\mathbb{R}^3$ . V poljubni točki  $p \in S$  je zato normalni prostor  $N_p S$  enorazsežen, torej premore natanko dve enotski normalni vektorski polji, ki se razlikujeta za predznak ( $\pm N$ ). Izbor orientacije na  $U$  enolično določa enotsko normalno vektorsko polje, zato ga lahko predstavimo kot preslikavo

$$N: S \rightarrow \mathbb{S}^2,$$

imenovano *Gaussova preslikava* vložene ploskve  $S$ . Če je  $x = x(u_1, u_2)$  za  $(u_1, u_2) \in U$  lokalna parametrizacija ploskve, dobimo eksplicitno formulo  $N = \frac{x_{u_1} \times x_{u_2}}{|x_{u_1} \times x_{u_2}|}$ .

Vektor povprečne ukrivljenosti je po definiciji pravokoten na  $S$ , zato obstaja funkcija  $\lambda$ , da velja  $\mathbf{H} = \lambda N$ . Vemo še, da je normalni vektor enotski, kar nam da zvezo

$$\begin{aligned} H &= H^N = \mathbf{H} \cdot N = \lambda N \cdot N = \lambda, \\ \mathbf{H} &= H \cdot N. \end{aligned} \tag{2.17}$$

Z besedami je vektor povprečne ukrivljenosti enak produktu povprečne ukrivljenosti in Gaussove preslikave.

Glavni ukrivljenosti sta odvisni od enotske normale; če namesto pozitivno predznačene izberemo negativno enotsko normalo, se glavnima ukrivljenostma in posledično povprečni ukrivljenosti spremeni predznak. Po zgornji formuli pa vidimo, da je vektor povprečne ukrivljenosti neodvisen od izbora enotskega normalnega vektorskega polja.

**Lema 2.20.** Naj bo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Teda velja

$$\Delta x = 2\mathbf{H}, \tag{2.18}$$

kjer je  $\Delta$  Laplaceov operator glede na Riemannovo metriko  $g = x^* ds^2$  v točki  $q \in M$  in  $\mathbf{H}$  vektor povprečne ukrivljenosti v točki  $p = x(q) \in S$ .

## 2.4 Holomorfne in harmonične funkcije

Naj bo  $M$  Riemannova ploskev in  $\zeta = u + iv$  lokalna holomorfná koordinata na njej. Definiramo *diferencial*

$$d = \frac{\partial}{\partial u} du + \frac{\partial}{\partial v} dv = \partial + \bar{\partial} = \frac{\partial}{\partial \zeta} d\zeta + \frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}} d\bar{\zeta} \tag{2.19}$$

in *konjugirani diferencial*

$$d^c = 2\Im(\partial) = i(\bar{\partial} - \partial). \tag{2.20}$$

Velja

$$\begin{aligned} d + id^c &= 2\partial, \quad d - id^c = 2\bar{\partial}, \\ dd^c &= 2i\partial\bar{\partial} = \left( \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) du \wedge dv = \Delta du \wedge dv, \end{aligned}$$

kjer je  $\Delta$  Laplaceov operator glede na Evklidsko metriko.

Po definiciji je diferenciable funkcija  $f = x + iy: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  holomorfná ( $\bar{\partial}f = 0$ ) natanko tedaj, ko v poljubnih lokalnih holomorfnih koordinatah reši Cauchy-Riemannov sistem enačb  $x_u = y_v$ ,  $x_v = -y_u$ .

Funkcija  $x: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  razreda  $\mathcal{C}^2(M)$  je harmonična, če velja  $dd^c x = 0$ . Kadar zadošča neenakosti  $dd^c x \geq 0$ , ji pravimo subharmonična, oziroma strogo subharmonična v primeru stroge neenakosti. Harmonične funkcije karakteriziramo z naslednjimi ekvivalentnimi pogoji:

$$x \in \mathcal{C}^2(M) \text{ je harmonična} \iff dd^c x = 0 \iff \partial\bar{\partial}x = 0 \iff \Delta x = 0.$$

Vsaka holomorfná funkcija je torej harmonična. Vzemimo realno harmonično funkcijo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^2(M)$  in naj bo  $D \subset M$  enostavno povezana<sup>3</sup> domena. Zaradi pogoja o harmoničnosti vemo, da je 1-forma  $d^c x$  eksaktná. Za izbrano fiksno točko  $p_0 \in D$  definirajmo funkcijo  $y: D \rightarrow \mathbb{C}^n$  razreda  $\mathcal{C}^2(D)$  s predpisom

$$y(p) = \int_{p_0}^p d^c x + C, \quad (2.21)$$

kjer je  $C$  konstanta. Imenujemo jo harmonična konjugiranka funkcije  $x$ . Velja enakost  $dy = d^c x$ , nova funkcija  $z: D \rightarrow \mathbb{C}^n$ ,  $z = x + iy$ , imenovana kompleksna krivulja v  $\mathbb{C}^n$ , pa je holomorfná. Zaključimo, da je zožitev realne harmonične funkcije na enostavno povezano domeno v  $M$  enaka realnemu delu holomorfné funkcije  $x + iy$ , pri čemer je  $y$  harmonična konjugiranka od  $x$ , ki jo definira enakost (2.21).

**Definicija 2.21** (Pretok). Naj bo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  harmonična preslikava. Njen pretok je homomorfizem grup  $\text{Flux}_x: H_1(M, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ , definiran s predpisom

$$\text{Flux}_x([C]) = \int_C d^c x. \quad (2.22)$$

V definiciji pretoka je  $[C] \in H_1(M, \mathbb{Z})$ , integral pa je po Greenovi formuli odvisen le od homološkega razreda poti  $C \subset M$ , zato bomo v nadaljevanju pisali kar  $\text{Flux}_x(C)$ . V zgornjem smislu lahko rečemo, da pretok meri, koliko 1-formi  $d^c x$  manjka do eksaktnosti. Realna harmonična preslikava  $x$  premore harmonično konjugiranko na  $M$  natanko tedaj, ko je  $d^c x$  eksaktná 1-forma na  $M$ , to pa je ekvivalentno pogoju  $\text{Flux}_x(C) = 0$  za vsako sklenjeno krivuljo  $C \subset M$ .

## 2.5 Aproksimacijski in interpolacijski izreki za Riemannove ploskve

Najbolj klasična izreka v teoriji aproksimacije holomorfnih funkcij sta Weierstrassov izrek, ki pravi, da zvezne funkcije na zaprtih intervalih v  $\mathbb{R}$  lahko aproksimiramo s polinomi (K. Weierstrass, 1885), ter izrek C. Rungeja iz istega leta o aproksimaciji holomorfnih funkcij v okolici kompaktne množice v  $\mathbb{C}$  z racionalnimi funkcijami oziroma holomorfnimi polinomi v posebnem primeru. Razširitev Rungejevega izreka

<sup>3</sup>Topološki prostor  $X$  je enostavno povezan natanko tedaj, ko je s potmi povezan in ima v vsaki točki trivialno prvo fundamentalno grupo,  $\pi_1(X) = 0$ .

na odprte Riemannove ploskve sta dokazala H. Behnke in K. Stein (1949), povsem enak izrek pa velja tudi za kompaktne Riemannove ploskve z robom (H. L. Royden, 1967).

**Izrek 2.22** (Rungejev aproksimacijski izrek za Riemannove ploskve). *Naj bo  $M$  Riemannova ploskev in  $K$  njena kompaktna podmnožica. Potem lahko vsako funkcijo  $f$ , ki je holomorfnna v okolici  $K$ , aproksimiramo enakomerno na  $K$  z meromorfnimi funkcijami  $F$  na  $M$  brez polov na  $K$ , ter s holomorfnimi funkcijami na  $M$ , če  $K$  nima lukenj. Funkcije  $F$  lahko izberemo tako, da se z dano funkcijo  $f$  na končni množici točk v  $K$  ujemajo do izbranega končnega reda in da ima  $F$  pole v podmnožici  $E \subset M \setminus K$ , kjer  $E$  vsebuje točko v vsaki luknji množice  $K$ .*

**Definicija 2.23.** Naj bo  $K$  kompaktna podmnožica Riemannove ploskve  $M$ . Njena holomorfnna ogrinjača je množica

$$\widehat{K}_{\mathcal{O}(M)} = \{p \in M; |f(p)| \leq \max_K |f| \text{ za vse } f \in \mathcal{O}(M)\}. \quad (2.23)$$

Če velja  $K = \widehat{K}_{\mathcal{O}(M)}$ , potem  $K$  imenujemo *Rungejeva* ali tudi  $\mathcal{O}(M)$ -konveksna množica.

Kompaktne množice  $K \subset M$ , ki so Rungejeve podmnožice Riemannove ploskve  $M$ , pogosto karakteriziramo z lastnostjo, da nimajo lukenj v  $M$ .

Velik napredek v razvoju je pomenil Mergelyanov izrek o aproksimaciji holomorfnih funkcij (S. N. Mergelyan, 1951). Pove, da je zvezne funkcije na kompaktni množici  $K \subset \mathbb{C}$  brez lukenj, ki so holomorfne v notranjosti  $K^\circ$ , tj. razreda  $\mathcal{A}(K)$ , na kompaktnu  $K$  mogoče enakomerno aproksimirati s holomorfnimi polinomi. Različica velja tudi za odprte Riemannove ploskve (E. Bishop, 1958).

**Izrek 2.24** (Bishop-Mergelyanov aproksimacijski izrek). *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $K$  njena kompaktna podmnožica brez lukenj ( $K$  je Rungejeva v  $M$ ). Potem lahko vsako funkcijo v  $\mathcal{A}(K)$  aproksimiramo enakomerno na  $K$  s funkcijami v  $\mathcal{O}(M)$ .*

Izrek se da posplošiti na dopustne množice (Definicija 4.4), kar bo pomembno pri aproksimaciji konformnih minimalnih imerzij.

Omenimo še vprašanje, povezano z Mergelyanovim izrekom. Karakterizirati želimo kompaktne množice  $K \subset M$  Riemannove ploskve  $M$ , za katere velja, da funkcije razreda  $\mathcal{A}(K)$  lahko aproksimiramo z meromorfnimi funkcijami na  $M$  s poli izven kompakta  $K$ . Problem je rešil A. G. Vitushkin leta 1966. Primeri kompaktnih množic, za katere to ne drži, so množice tipa *Swiss cheese*. Tako množico dobimo iz para  $(D, \mathcal{D})$ , kjer je  $D$  zaprt disk in  $\mathcal{D}$  števna družina paroma disjunktnih odprtih diskov v  $D^\circ$  (ki zadoščajo še pogojem o legah središč in velikostih polmerov), tako, da zaprtemu disku  $D$  odstranimo unijo diskov iz družine  $\mathcal{D}$ . Nastala množica ima neskončno lukenj.

Oglejmo si še interpolacijo. Osnovni rezultat o interpolaciji holomorfnih funkcij je izrek K. Weierstrassa iz leta 1876. Pokaže, da obstaja cela holomorfnna funkcija  $f \in$

$\mathcal{O}(\mathbb{C})$  z ničlami natanko v predpisanih točkah in izbranih stopenj za poljuben izbor točk  $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  (ki so ničle funkcije) in naravnih števil  $\{k_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  (stopnje ničel). Pove tudi eksplisitno obliko funkcije kot neskončnega produkta. Nadgrajen Weierstrassov izrek za preslikave na odprtih Riemannovih ploskvah je dokazal H. Florack (1949).

**Izrek 2.25** (Weierstrassov izrek za odprte Riemannove ploskve). *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev,  $A = \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset M$  njena zaprta diskretna podmnožica in  $k_i \in \mathbb{N}$ , dana naravna števila za vse  $i \in \mathbb{N}$ . Tedaj obstaja holomorfná funkcija  $f \in \mathcal{O}(M)$ , ki ima ničle natanko v točkah množice  $A$ , stopnja ničle  $a_i$  pa je enaka  $k_i$  za vse indekse  $i \in \mathbb{N}$ .*

Naslednji, Weierstrass-Florackov interpolacijski izrek, je natančnejša različica prejšnjega skupaj z Rungejevo aproksimacijo.

**Izrek 2.26** (Weierstrass-Florackov interpolacijski izrek). *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $K$  njena Rungejeva podmnožica. Naj bo  $A = \{a_i\}_{i=1}^{\infty}$  zaprta diskretna podmnožica v  $M$ ,  $U$  odprta podmnožica  $M$ , tako da je  $A \cup K \subset U$  in  $f$  meromorfná funkcija na  $U$  z ničlami in poli le v točkah množice  $A$ . Potem za izbrane  $\varepsilon > 0$  in števila  $k_i \in \mathbb{N}$  obstaja meromorfná funkcija  $F$  na  $M$ , za katero velja:*

1.  $|F(z) - f(z)| < \varepsilon$  za vse  $z \in K$ ,
2. v točkah  $a_i$  je razlika  $F - f$  ničelna do reda  $k_i$ ,
3.  $F$  nima ničel in polov na  $M \setminus A$ .

G. Mittag-Leffler je leta 1884 dokazal rezultat, ki je soroden Weierstrassovemu izreku o interpolaciji holomorfnih funkcij. Pove naslednje: naj bo  $A \subset \mathbb{C}$  zaprta diskretna množica in  $f$  meromorfná funkcija v okolici množice  $A$ . Potem obstaja meromorfná funkcija  $F$  na  $\mathbb{C}$ , ki je holomorfná na  $\mathbb{C} \setminus A$ , razlika  $F - f$  pa je holomorfná v vsaki točki množice  $A$ .

Splošnejši rezultat za odprte Riemannove ploskve je prispevek H. Floracka iz leta 1948.

V nadaljevanju bo naš cilj formulirati ustrezne različice zgornjih izrekov za minimalne ploskve.

## 3 Minimalne ploskve

### 3.1 Grafi z minimalno ploščino

Kot motivacijo pred študijem minimalnih ploskev si oglejmo primer v nižji razsežnosti – obravnavajmo minimalne grafe v  $\mathbb{R}^3$ , tj. funkcije z minimalno ploščino pod grafom. Le-te so zanimale že J. L. Lagrange, ki je l. 1760 napravil naslednji izračun.

Vzemimo domeno  $D \subset \mathbb{R}^2$  z odsekoma zvezno odvedljivim robom  $\partial D$  in funkcijo  $f: \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$  razreda  $\mathcal{C}^2$ , kjer  $\overline{D}$  označuje zaprtje domene  $D$ . Graf funkcije  $f$  je množica

$$\Gamma_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in \overline{D}, z = f(x, y)\}, \quad (3.1)$$

njena ploščina pod grafom pa je enaka

$$\text{Area}(f) = \int_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy. \quad (3.2)$$

Poiskati želimo funkcije na  $\overline{D}$ , ki imajo najmanjšo ploščino pod grafom, pri čemer vnaprej predpišemo vrednosti na robu domene  $bD$  (ta naj bo  $f|_{bD}$  za zgoraj izbrano funkcijo  $f$ ). Z drugimi besedami, iščemo stacionarne točke funkcionala  $\text{Area}$  (3.2) med grafi nad  $\overline{D}$  s predpisanimi robnimi vrednostmi.

Ker nas zanimajo funkcije, bližnje  $f$ , s fiksnimi robnimi vrednostmi, si oglejmo deformacije naslednje oblike: izberimo zvezno odvedljivo funkcijo  $h: \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}$ , ki je ničelna na robu ( $h|_{bD} = 0$ ), ter opazujemo družino funkcij  $\{f + sh; s \in \mathbb{R}\}$ . Izbrana  $f$  je stacionarna točka funkcionala  $\text{Area}$  natanko tedaj, ko za poljubno funkcijo  $h$  (z zgornjimi lastnostmi) velja

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \text{Area}(f + sh) = 0. \quad (3.3)$$

Poenostavimo enačbo. Računamo

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \text{Area}(f + sh) &= \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \int_D \sqrt{1 + ((f + sh)_x)^2 + ((f + sh)_y)^2} dx dy \\ &= \int_D \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \sqrt{1 + (f_x + sh_x)^2 + (f_y + sh_y)^2} dx dy \\ &= \int_D \frac{f_x h_x + f_y h_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} dx dy \\ &= \left. \frac{(f_x + f_y)h}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \right|_{bD} \\ &\quad - \int_D \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \right) h dx dy \\ &= - \int_D \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \right) h dx dy, \end{aligned}$$

pri čemer v zadnji enakosti upoštevamo pogoj, da je  $h|_{bD} = 0$ . Po zveznosti je izraz enak 0 za vse izbore  $h$  natanko takrat, ko na domeni  $D$  velja

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} = 0. \quad (3.4)$$

Poenostavimo še slednji izraz:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \frac{f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} &= \frac{f_{xx}(1 + f_x^2 + f_y^2) - f_x(f_x f_{xx} + f_y f_{xy})}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^{3/2}} \\ &\quad + \frac{f_{yy}(1 + f_x^2 + f_y^2) - f_y(f_x f_{xy} + f_y f_{yy})}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^{3/2}} \\ &= \frac{f_{xx}(1 + f_y^2) - 2f_x f_y f_{xy} + f_{yy}(1 + f_x^2)}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Dobimo ekvivalentno enačbo k enačbi (3.3),

$$f_{xx}(1 + f_y^2) - 2f_x f_y f_{xy} + f_{yy}(1 + f_x^2) = 0, \quad (3.5)$$

ki jo imenujemo *enačba za minimalne grafe*. To je eliptična kvazilinearna parcialna diferencialna enačba drugega reda.

Prešli smo na naslednji Dirichletov problem: iščemo rešitve enačbe za minimalne grafe (3.5) z robnim pogojem, ki je zvezna funkcija na robu  $bD$ . T. Radó je leta 1930 pokazal, da rešitev Dirichletovega problema obstaja za vsako konveksno omejeno domeno  $D \subset \mathbb{R}^2$ , iz principa maksima za minimalne grafe pa sledi, da je rešitev tudi enolična.

Zakaj je dovolj, da smo v zgornji izpeljavi enačbe za minimalne grafe obravnavali le deformacije dane funkcije  $f$ , ki so linearne v parametru  $s \in \mathbb{R}$ ?

Naj bo  $\varepsilon > 0$ ,  $D$  ter  $f$  kot prej, in vzemimo funkcijo  $F(x, y, s): \bar{D} \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$  razreda  $\mathcal{C}^2$ , za katero velja:

- $F(x, y, 0) = f(x, y)$  za  $(x, y) \in \bar{D}$ ;
- $F(x, y, s) = f(x, y)$  za  $(x, y, s) \in bD \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ .

Pišimo  $F_s(x, y) = F(x, y, s)$  in razvijmo do 1. reda. Dobimo

$$\begin{aligned} F_s(x, y) &= F(x, y, 0) + s \frac{\partial}{\partial s} \Big|_{s=0} F_s(x, y) + O(s^2) \\ &= f(x, y) + sh(x, y) + O(s^2), \end{aligned}$$

pri čemer smo v drugi enakosti vpeljali  $h(x, y) = \frac{\partial}{\partial s} \Big|_{s=0} F_s(x, y)$ . Tedaj je

$$\frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \text{Area}(F_s) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \text{Area}(f + sh),$$

kar utemelji izbiro linearnih deformacij.

**Opomba 3.1.** Biti minimalen graf je lokalna lastnost v naslednjem smislu. Če poljubna točka  $(x_0, y_0) \in D$  premore odprto okolico  $U \subset D$  z lastnostjo, da za vsako zvezno odvedljivo funkcijo  $h_U$  z nosilcem na množici  $U$  velja  $\frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \text{Area}(f + sh) = 0$ , potem funkcija  $f$  reši enačbo za minimalne grafe (3.5). Zaključimo, da je graf minimalen natanko tedaj, ko je minimalen v okolici vsake točke.

**Trditev 3.2.** Naj bo  $D \subset \mathbb{R}^2$  domena. Funkcija  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  razreda  $\mathcal{C}^2$  reši enačbo za minimalne grafe

$$f_{xx}(1 + f_y^2) - 2f_x f_y f_{xy} + f_{yy}(1 + f_x^2) = 0$$

natanko tedaj, ko ima njen graf  $S = \Gamma_f$  v vsaki točki ničelno povprečno ukrivljenost, tj.  $\mathbf{H} = 0$ .

*Dokaz.* Izberimo točko  $(x_0, y_0) \in D$ . Brez škode za splošnost lahko postavimo  $(x_0, y_0) = (0, 0)$  in  $f(0) = 0$ , saj v nasprotnem ustrezno transliramo koordinate. Ekvivalenco iz trditve je zato dovolj dokazati v točki  $(0, 0)$ .

Najprej si oglejmo poseben primer, ko je točka  $(0, 0)$  kritična točka funkcije  $f$ . To pomeni, da za parcialna odvoda velja  $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ , enačba za minimalne grafe pa se tedaj glasi

$$f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0) = \Delta f(0, 0) = 0. \quad (3.6)$$

Po Lemi 2.20 vemo, da je  $\Delta f = 2\mathbf{H}$ , zato je enakost (3.6) ekvivalentna pogoju  $\mathbf{H}(0, 0) = 0$ . Trditev v posebnem primeru drži.

Poglejmo si še splošno situacijo, ki jo bomo rešili s pomočjo posebnega primera. Izberimo enotski vektor  $N = (N_1, N_2, N_3) \in \mathbb{R}^3$ ,  $N_3 > 0$ , ki je pravokoten na tangentno ravnino  $T_{(0,0)}S$  v točki  $(0, 0)$ . Obstaja ortogonalna rotacija  $R$  v prostoru  $\mathbb{R}^3$  z lastnostmi

$$R(N) = (0, 0, 1), \quad R(T_{(0,0)}S) = \mathbb{R}^2 \times \{0\}.$$

Opazujemo graf  $S$  v okolici točke  $(0, 0)$  (in to zožitev imenujmo kar  $S$ ). Njegova slika  $\tilde{S} = R(S)$  je graf  $z = \tilde{f}(x, y)$  funkcije  $\tilde{f}$  s kritično točko  $(0, 0)$ . Naj bo  $h$  funkcija razreda  $\mathcal{C}^1$  z nosilcem v okolici  $U \subset \mathbb{R}^2$  točke  $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$  in naj  $\{\tilde{S}_s; s \in \mathbb{R}\}$  označuje družino grafov, ki pripadajo deformacijam  $s \mapsto \tilde{f} + sh$  grafa  $\tilde{S} = \tilde{S}_0$  v smeri vektorja  $(0, 0, 1)$ . Inverzna preslikava  $R^{-1}$ , ki je prav tako ortogonalna rotacija v  $\mathbb{R}^3$ , družino  $\{\tilde{S}_s; s \in \mathbb{R}\}$  preslika v družino  $\{S_s; s \in \mathbb{R}\}$  deformacij grafa  $S$  v smeri vektorja  $N$  z nosilcem v okolici točke  $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$ .

Če funkcija  $f$  reši enačbo za minimalne grafe, tj. je  $f$  minimalni graf, kar pomeni, da velja  $\left.\frac{d}{ds}\right|_{s=0} \text{Area}(S_s) = 0$ , iz ortogonalnosti rotacije  $R$  sledi  $\left.\frac{d}{ds}\right|_{s=0} \text{Area}(\tilde{f} + sh) = 0$  za vse funkcije  $h$  kot zgoraj. Torej je  $\tilde{S}$  minimalni graf v okolici točke  $(0, 0)$ . Po prvem delu dokaza je to ekvivalentno pogoju  $\mathbf{H}_{\tilde{S}}(0, 0) = 0$ . Ker je rotacija  $R$  ortogonalna, tedaj tudi za prasliko  $S = R^{-1}(\tilde{S})$  velja  $\mathbf{H}_S(0, 0) = 0$ .

Obraten razmislek, ki ob predpostavki  $\mathbf{H}_S(0, 0) = 0$  implicira minimalnost grafa  $f$ , je povsem analogen.  $\square$

Trditev lahko geometrijsko interpretiramo na naslednji način: gladka ploskev  $S \subset \mathbb{R}^3$  ima identično ničelni vektor povprečne ukrivljenosti natanko tedaj, ko je  $S$  v vsaki svoji točki  $x \in S$  minimalni graf nad pripadajočo tangentno ravnino  $T_x S$ . Če opazujemo deformacije ploskve  $S$  v normalni smeri z nosilci na relativno kompaktnih podmnožicah  $U \Subset S^\circ$ , je slednje ekvivalentno pogoju, da je ploskev  $S$  stacionarna točka ploskovnega funkcionala  $\text{Area}$ .

To posplošimo na ploskve, ki so slike domen v  $\mathbb{R}^2$  z imerzijami v Evklidske prostore poljubnih razsežnosti  $n \geq 3$ . Le-to motivira definicijo minimalne ploskve, ki jo bomo spoznali v naslednjem razdelku.

## 3.2 Variacija ploščine

V tem razdelku bomo navedli klasično definicijo minimalne ploskve ter variacijski formuli, s katerima minimalne ploskve opišemo kot ploskve z ničelnim vektorjem povprečne ukrivljenosti.

**Definicija 3.3.** 1. Naj bo  $M$  gladka kompaktna ploskev z robom,  $n \geq 3$  in naj bo preslikava  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Variacija preslikave  $x$  s fiksnim robom je 1-parametrična družina  $\mathcal{C}^2$  preslikav

$$x^t: M \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \subset \mathbb{R}, \quad (3.7)$$

če je  $x^0 = x$  in za vse  $t$  z intervala velja  $x^t = x$  na  $bM$ .

2. Naj bo  $p \in M$ . Variacijsko vektorsko polje preslikave  $x^t$  je vektorsko polje, definirano s predpisom

$$E(p, t) = \frac{\partial x^t(p)}{\partial t} \in \mathbb{R}^n. \quad (3.8)$$

Opazimo, da je za dovolj majhne vrednosti  $t$  preslikava  $x^t$  imerzija. Po definiciji je na množici  $bM \times (-\varepsilon, \varepsilon)$  variacijsko vektorsko polje  $E$  konstantno ničelno.

**Definicija 3.4** (Minimalna ploskev). Naj bo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Sliko  $x(M)$  imenujemo *minimalna ploskev*, če za vsako kompaktno domeno  $D \subset M$  z glatkim robom  $bD$  in vsako gladko variacijo  $x^t$  preslikave  $x$  s fiksnim robom velja

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Area}(x^t(D)) = 0. \quad (3.9)$$

Ekvivalentno pravimo, da je minimalna ploskev stacionarna točka ploskovnega funkcionala Area.

Levo stran enakosti (3.9) imenujemo *prva variacija ploščine* pri  $t = 0$ . Slednjo z geometrijskimi lastnostmi preslikave  $x$ , natančneje z ukrivljenostjo, povezuje *prva variacijska formula* v naslednjem izreku.

**Izrek 3.5** (Prva variacijska formula). Naj bo  $M$  gladka kompaktna ploskev z robom,  $n \geq 3$  in  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Naj bo  $E = \partial x^t / \partial t|_{t=0}$  variacijsko vektorsko polje preslikave  $x^t$  pri  $t = 0$ ,  $\mathbf{H}$  vektorsko polje povprečne ukrivljenosti preslikave  $x$  in  $dA$  ploščinski element glede na Riemannovo metriko  $x^*ds^2$ , definirano na  $M$ . Potem za vsako gladko variacijo  $x^t: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzije  $x$  s fiksnim robom velja

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Area}(x^t(M)) = -2 \int_M E \cdot \mathbf{H} dA. \quad (3.10)$$

Kaj nam prva variacijska formula pove, če se osredotočimo na poseben razred variacij imerzije? Predpostavimo, da je imerzija  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^4$ , tj. je preslikava  $\mathbf{H}$  vsaj razreda  $\mathcal{C}^2$ . Variacijo definirajmo s predpisom

$$x^t = x + t f \mathbf{H}, \quad (3.11)$$

kjer za  $f$  izberimo gladko nenegativno funkcijo na  $M$ , ki je ničelna na robu  $bM$ . Po definiciji je  $x^t \in \mathcal{C}^2(M)$  variacija imerzije  $x$  s fiksnim robom. Računajmo

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Area}(x^t(M)) &= -2 \cdot \int_M E \cdot \mathbf{H} dA = -2 \cdot \int_M f \mathbf{H} \cdot \mathbf{H} dA \\ &= -2 \cdot \int_M f |\mathbf{H}|^2 dA \leq 0. \end{aligned}$$



Če je  $\mathbf{H} = 0$  na  $M$ , je ploščina konstantna ( $x^t = x$ ). Sicer obstaja točka, v kateri je  $\mathbf{H} \neq 0$ , in dodatno zahtevajmo, da je  $f > 0$  v okolici neke take točke. Potem je  $\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Area}(x^t(M)) < 0$ . To pomeni, da z deformacijo ploskve  $x(M) \subset \mathbb{R}^n$  v smeri vektorja povprečne ukrivljenosti  $\mathbf{H}$  ploščina za majhne  $t > 0$  strogo pada.

Po prvi variacijski formuli (3.10) v primeru  $\mathbf{H} = 0$  na  $M$  imerzija  $x$  očitno da minimalno ploskev. V nasprotnem z ustrezno izbiro vektorskega polja  $E$  na  $M$  ploščina variiranih ploskev  $x^t(M)$  za majhne  $t > 0$  in  $x^t = x + tE$  strogo pada. Ta razmislek združuje naslednji rezultat.

**Izrek 3.6.** *Naj bo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Ploskev  $x(M)$  je minimalna natanko tedaj, ko je na  $M$  vektor povprečne ukrivljenosti  $\mathbf{H}$  preslikave  $x$  identično enak 0.*

Po zadnjem izreku je vsaka točka minimalne ploskve sedlo. Ker je  $\mathbf{H} = 0$ , je  $\kappa_2 = -\kappa_1$ , torej sta glavni ukrivljenosti v vsaki točki enako veliki, a nasprotnega predznaka. Geometrijsko to pomeni, da je minimalna ploskev v vsaki točki enako ukrivljena v obeh glavnih smereh, ti pa kažeta v nasprotni normalni smeri.

Gaussova ukrivljenost minimalne ploskve  $x(M) = S$  je povsod nepozitivna, saj je  $K = -\kappa_1^2 \leq 0$ . Njen integral,

$$TC(x) = \int_M K dA \in [-\infty, 0], \quad (3.12)$$

imenujemo *totalna Gaussova ukrivljenost*. Pri tem  $dA$  označuje ploščinski element glede na Riemannovo metriko  $g = x^*ds^2$  na Riemannovi mnogoterosti  $(M, g)$ . Vrednost je enaka 0 natanko takrat, ko je ploskev del ravnine. Res,  $TC(x) = 0$  natanko tedaj, ko je Gaussova ukrivljenost  $K = 0$ , kar je ekvivalentno  $\kappa_1 = \kappa_2 = 0$ . Vemo pa, da imajo le kosi ravnine obe glavni ukrivljenosti ničelni v vsaki točki. Minimalne ploskve s *končno totalno Gaussovo ukrivljenostjo*, tj.  $TC(x) > -\infty$ , so najpreprostejše in jih običajno preučujemo ločeno, saj zanje velja več lastnosti, ki jih splošnejše minimalne ploskve (z neskončno totalno Gaussovo ukrivljenostjo) ne premorejo.

S podobnimi tehnikami kot v dokazu Izreka 3.5 izpeljemo *drugo variacijsko formulo*: naj bo  $M$  kompaktna ploskev z robom, preslikava  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  pa gladka minimalna imerzija. Potem velja

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} \text{Area}(x^t(M)) = \int_M (4|E|^2 K^E + |\nabla E|^2) dA, \quad (3.13)$$

kjer  $K^E = K^N$  označuje Gaussovo ukrivljenost ploskve  $x(M)$ .

**Opomba 3.7.** Za  $M$  in  $x$  kot zgoraj definirajmo funkcijo  $f = |E|$  ter enotsko normalno vektorsko polje  $N = \frac{E}{|E|}$  na množici  $M^* = \{x \in M; f(x) \neq 0\}$ . Sledi  $E = f \cdot N$ ,  $\nabla E = (\nabla f \cdot N, f \cdot \nabla N)$  in  $|\nabla E|^2 = |\nabla f|^2 + f^2 \cdot |\nabla N|^2$ . Enakost (3.13) se zato glasi

$$\left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} \text{Area}(x^t(M)) = \int_M (|\nabla f|^2 + f^2(4K^N + |\nabla N|^2)) dA. \quad (3.14)$$

### 3.3 Weierstrassova formula

Naj bosta  $(M, g)$  in  $(\widetilde{M}, \tilde{g})$  Riemannovi mnogoterosti z  $\dim(M) \leq \dim(\widetilde{M})$ . Imerzija  $x: (M, g) \rightarrow (\widetilde{M}, \tilde{g})$  se imenuje *konformna*, če ohranja kote. Z drugimi besedami je povlečena metrika  $x^*\tilde{g}$  konformno ekvivalentna metriki  $g$ , kar pomeni, da za pozitivno funkcijo  $\mu > 0$  na  $M$  velja  $x^*\tilde{g} = \mu g$ .

Podobno pravimo, da je lokalna karta  $(U, \phi)$  Riemannove ploskve  $(M, g)$  *izotermna* glede na Riemannovo metriko  $g$ , če za neko pozitivno funkcijo  $\mu: \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}_+$ ,  $\phi(U) \subset \mathbb{R}_{(x,y)}^2$ , velja

$$(\phi^{-1})^*g = \mu \cdot (dx^2 + dy^2) = \mu \cdot ds_{\mathbb{R}^2}^2. \quad (3.15)$$

Lokalne koordinate na  $U$  tedaj imenujemo *izotermne koordinate*.

Naj bo ploskev  $M$  orientabilna in  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Potem preslikava  $x$  določa enolično strukturo Riemannove ploskve na  $M$ , kjer je  $x$  konformna imerzija. Zato bomo v nadaljevanju obravnavali Riemannove ploskve in pripadajoče konformne imerzije v Evklidski prostor.

Brez dokaza navedimo še ekvivalentne pogoje, ki karakterizirajo konformne imerzije na domeni v Evklidski ravnini. Nanje se bomo v nadaljevanju večkrat sklicali.

**Lema 3.8.** *Naj bodo  $D \subset \mathbb{R}^n$  domena z lokalnima koordinatama  $(u, v)$ ,  $n \geq 2$  in preslikava  $x = (x_1, \dots, x_n): D \rightarrow \mathbb{R}^n$  imerzija. Naslednje trditve so ekvivalentne:*

1. Imerzija  $x$  je konformna v Evklidskih metrikah na  $\mathbb{R}^2$  in  $\mathbb{R}^n$ .
2. Za parcialna odvoda  $\frac{\partial x}{\partial u} = x_u$  in  $\frac{\partial x}{\partial v} = x_v$  velja

$$|x_u| = |x_v| > 0, \quad x_u \cdot x_v = 0. \quad (3.16)$$

3. Vektorji  $x_u \pm ix_v \in \mathbb{C}_*^n$  pripadajo ničelni kvadriki<sup>4</sup> (so ničelni vektorji)

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^{n-1} = \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n; z_1^2 + \dots + z_n^2 = 0\}. \quad (3.17)$$

4. Matrika, ki pripada Riemannovi metriki  $g = x^*ds^2$  na  $D$ , je enaka  $G = \mu I$ , kjer je  $\mu = |x_u|^2 = |x_v|^2$  ter  $I$  identiteta.

#### 3.3.1 Plateaujev problem in Dirichletov energijski integral

Drugi razlog za študij konformnih imerzij je fizikalen. Na minimalne ploskve lahko gledamo kot na rešitve Plateaujevega problema, katerega moramo najprej natančno formulirati.

Označimo z  $\bar{\mathbb{D}}$  zaprt enotski disk z lokalnimi koordinatami  $(u_1, u_2)$  in izberimo gladko orientirano Jordanovo krivuljo  $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ . Naj bo  $x: \bar{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{R}^n$  kosoma zvezno odvedljiva imerzija, katere zožitev na rob diska  $\mathbb{T}$  je monotona<sup>5</sup> parametrizacija

<sup>4</sup>Ničelna kvadrika  $\mathbf{A}$  v  $(n-1)$ -spremenljivkah je kompleksni stožec s singularno točko 0.

<sup>5</sup>Pravimo, da je zvezna preslikava  $f: \mathbb{T} \rightarrow \Gamma$  *monotona*, če je prasluka  $f^{-1}(x)$  povezana za vsak  $x \in \Gamma$ .

$x|_{\mathbb{T}}: \mathbb{T} \rightarrow \Gamma$  Jordanove krivulje  $\Gamma$ . Spomnimo se, da je površina ploskve, določene z imerzijo  $x$  enaka

$$\text{Area}(x) = \int_{\mathbb{D}} \sqrt{|x_{u_1}|^2 |x_{u_2}|^2 - |x_{u_1} \cdot x_{u_2}|^2} du_1 du_2. \quad (3.18)$$

Naloga je poiskati preslikavo, ki zadošča zgornjim zahtevam, površina pripadajoče ploskve pa je minimalna. Dodatno je smiselno obravnavati preslikave, ki dajo končno površino.

Ključ je *Dirichletov energijski integral*

$$\mathcal{D}(x) = \int_{\mathbb{D}} |\nabla x|^2 du_1 du_2 = \int_{\mathbb{D}} (|x_{u_1}|^2 + |x_{u_2}|^2) du_1 du_2, \quad (3.19)$$

ki ga s površino ploskve povezuje naslednji rezultat.

**Lema 3.9.** *Za preslikavo  $x$  kot zgoraj je  $\text{Area}(x) \leq \frac{1}{2} \mathcal{D}(x)$ . Enačaja velja natanko tedaj, ko je  $x$  konformna.*

*Dokaz.* Poljubna vektorja  $x, y \in \mathbb{R}^n$  zadoščata

$$|x|^2 |y|^2 - |x \cdot y|^2 \leq |x|^2 |y|^2 \leq \frac{1}{4} (|x|^2 + |y|^2)^2.$$

Res, prva neenakost je očitna, druga pa je ekvivalentna neenakosti  $(|x| - |y|)^2 \geq 0$ , ki drži. Sledi  $\sqrt{|x|^2 |y|^2 - |x \cdot y|^2} \leq \frac{1}{2} (|x|^2 + |y|^2)$ . Če namesto vektorjev  $x, y$  izberemo vektorja  $x_{u_1}, x_{u_2} \in \mathbb{R}^n$ , dobimo neenakost iz leme.

Preslikava  $x$  je konformna natanko tedaj, ko velja  $|x_{u_1}| = |x_{u_2}| > 0$  in  $x_{u_1} \cdot x_{u_2} = 0$ . Enakost Dirichletovega energijskega integrala in površine je torej ekvivalentna konformnosti.  $\square$

Preslikava, ki minimizira Dirichletov energijski integral, minimizira tudi površino, je konformna, in parametrizira minimalno ploskev z robom  $\Gamma$ . J. Douglas in T. Radó sta l. 1932 dokazala, da vsaka Jordanova krivulja v  $\mathbb{R}^3$  določa minimalno ploskev.

**Opomba 3.10.** Analog minimalnih ploskev v enorazsežnem primeru so geodetke. Z minimizacijo enorazsežnega energijskega integrala dobimo krivulje z minimalno dolžino, ki so poleg tega parametrizirane z večkratnikom ločne dolžine.

### 3.3.2 Rezultati

Prvi rezultat, ki ga navajamo, opisuje ekvivalentne pogoje minimalnosti ploskve  $M$ .

**Izrek 3.11.** *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev,  $n \geq 3$  in  $x = (x_1, \dots, x_n): M \rightarrow \mathbb{R}^n$  konformna imerzija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Naslednje trditve so ekvivalentne:*

1.  $x$  je minimalna ploskev.
2. Vektorsko polje povprečne ukrivljenosti preslikave  $x$  je ničelno, tj.  $\mathbf{H} = 0$ .
3.  $x$  je harmonična, tj.  $\Delta x = 0$  oziroma  $dd^c x = 0$ .

4. 1-forma  $\partial x = (\partial x_1, \dots, \partial x_n)$  z vrednostmi v  $\mathbb{C}^n$  je holomorfná in velja

$$(\partial x_1)^2 + \dots + (\partial x_n)^2 = 0. \quad (3.20)$$

5. Naj bo  $\theta$  holomorfná 1-forma na  $M$ , ki ni nikjer enaka 0. Potem je preslikava  $f = 2\partial x/\theta: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  holomorfná z vrednostmi v ničelni kvadriki

$$\mathbf{A} = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n; z_1^2 + \dots + z_n^2 = 0\}. \quad (3.21)$$

Nadalje je Riemannova metrika na  $M$ , inducirana s konformno imerzijo  $x$ , enaka

$$g = x^*ds^2 = |dx_1|^2 + \dots + |dx_n|^2 = 2(|\partial x_1|^2 + \dots + |\partial x_n|^2). \quad (3.22)$$

*Dokaz.* Predstavimo le osnovne ideje dokaza zgornjega izreka.

Ekvivalentnost prvih dveh trditvev smo zapisali v Izreku 3.6.

Ekvivalentnost druge in tretje trditve sledi iz Leme 2.20, saj je  $\Delta x = 2\mathbf{H}$ .

Naj bo  $\zeta = u + iv$  lokalna holomorfná koordinata na  $M$ . Tedaj je

$$\begin{aligned} 2\partial x &= dx + id^c x = (x_u du + x_v dv) + i(-x_v du + x_u dv) = \\ &= (x_u - ix_v)(du + idv) = (x_u - ix_v)d\zeta, \\ \partial x &= (\partial x_1, \dots, \partial x_n) = \frac{1}{2}(x_u - ix_v)d\zeta. \end{aligned}$$

Preslikava  $x$  je konformna natanko takrat, ko je  $\sum_{i=1}^n ((x_i)_u \pm i(x_i)_v)^2 = |x_u|^2 - |x_v|^2 \pm 2ix_u \cdot x_v = 0$ , kar je ekvivaletno

$$(\partial x_1)^2 + \dots + (\partial x_n)^2 = \frac{1}{4}(|x_u|^2 - |x_v|^2 - 2ix_u \cdot x_v) d\zeta^2 = 0,$$

ki je enakost (3.20). Ker velja  $dd^c x = -2i\bar{\partial}(\partial x)$ , je  $x$  harmonična natanko tedaj, ko je  $\partial x$  holomorfná; to je ekvivalenca tretje in četrte trditve.

Funkcija  $f = 2\partial x/\theta$  je kvocient 1-form, ki je zaradi pogoja na  $\theta$  dobro definirana. Ker je  $x$  imerzija,  $f$  ne zavzame vrednosti 0. Četrta in peta trditve sta očitno ekvivalentni.

Zvezo (3.22) dobimo s krajšim računom v lokalnih holomorfnih koordinatah  $\zeta = u + iv$  na  $M$  in upoštevanjem, da za konformno preslikavo  $x$  velja  $|x_u| = |x_v| > 0$ ,  $x_u \cdot x_v = 0$ .  $\square$

V razdelku o holomorfnih in harmoničnih funkcijah na Riemannovih ploskvah smo govorili o harmoničnih konjugirankah in kompleksnih krivuljah izbrane holomorfne funkcije. Sedaj opazujemo konformno minimalno imerzijo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  ter njeno harmonično konjugiranko  $y$  na odprti podmnožici  $D \subset M$ . Tedaj o preslikavi  $z = x + iy: M \rightarrow \mathbb{C}^n$ , ki je imerzija in holomorfná krivulja, vemo več, saj njeni parcialni odvodi zadoščajo ničelnemu pogoju.

**Definicija 3.12.** 1. Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $n \geq 3$ . Holomorfnó imerzijo  $z = (z_1, \dots, z_n): M \rightarrow \mathbb{C}^n$ , za katero velja  $(\partial z_1)^2 + \dots + (\partial z_n)^2 = 0$ , imenujemo *holomorfná ničelna krivulja* v  $\mathbb{C}^n$ .

2. Naj bo  $z = x + iy: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  holomorfná ničelna krivulja. Njena realni del in imaginarni del,  $x, y: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imenujemo *konjugirani minimalni ploskvi*.
3. Naj bo  $t \in \mathbb{R}$ . Predstavnike 1-parametrične družine  $x^t = \Re(e^{it}z): M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imenujemo *pridružene minimalne ploskve* holomorfne ničelne krivulje  $z$ .

Izrek pravi, da vsaka odprta Riemannova ploskev premore povsod neničelno eksaktno 1-formo. Naj bosta  $z: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  holomorfná ničelna krivulja in  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma na  $M$ . Diferencial  $dz$  je 1-forma in obstaja holomorfná preslikava  $f: M \rightarrow \mathbf{A}_*$ , ki 1-formi povezuje z enakostjo  $dz = f\theta$ . Tu je množica  $\mathbf{A}_* = \mathbf{A} \setminus \{0\}$  punktirana ničelna kvadrika v  $\mathbb{C}^n$ .

*Enneper-Weierstrassova formula* je posledica Izreka 3.11, zato jo bomo navedli brez dokaza. Rezultat je pomemben, saj predstavlja konformne minimalne ploskve in holomorfne ničelne krivulje, konstruirane na univerzalen način. Metodo konstrukcije bomo v naslednjih poglavjih pogosto uporabljali.

**Izrek 3.13** (Enneper-Weierstrassova formula). *Naj bo  $n \geq 3$  in  $M$  odprta Riemannova ploskev, na kateri definiramo holomorfnó 1-formo  $\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$  z vrednostmi v  $\mathbb{C}^n$ , ki je povsod neničelna, in zadošča*

1.  $\sum_{j=1}^n \phi_j^2 = 0$ ,
2.  $\Re \int_C \Phi = 0$  za vse  $[C] \in H_1(M, \mathbb{Z})$ .

Potem za poljuben izbor točk  $p_0 \in M$  in  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  predpis  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,

$$x(p) = x_0 + \Re \int_{p_0}^p \Phi, \quad p \in M, \quad (3.23)$$

podaja dobro definirano konformno minimalno imerzijo. Zanjó velja

$$2\partial x = \Phi \quad \text{in} \quad g = x^*ds^2 = |dx|^2 = \frac{1}{2}|\Phi|^2. \quad (3.24)$$

Če velja še  $\int_C \Phi = 0$  za vse  $[C] \in H_1(M, \mathbb{Z})$ , potem za poljuben izbor točk  $p_0 \in M$  in  $z_0 \in \mathbb{C}^n$  predpis  $z: M \rightarrow \mathbb{C}^n$ ,

$$z(p) = z_0 + \int_{p_0}^p \Phi, \quad p \in M, \quad (3.25)$$

podaja dobro definirano holomorfnó ničelno krivuljo. Zanjó velja

$$\partial z = \Phi \quad \text{in} \quad z^*ds^2 = |dz|^2 = |\partial z|^2 = |\Phi|^2. \quad (3.26)$$

**Opomba 3.14.** Pogoji  $\Re \int_C \Phi = 0$ , da so vse realne periode po sklenjenih krivuljah v  $M$  ničelne, zagotavlja, da je integral (3.23) dobro definiran. Natančneje, neodvisen je od izbire poti med točkama  $p_0 \in M$  in  $p \in M$  po kateri integriramo. Podobno, pogoj  $\int_C \Phi = 0$  za vse  $[C] \in H_1(M, \mathbb{Z})$  zagotavlja dobro definirano integrala (3.25).

V primeru, ko je  $M$  enostavno povezana ploskev, pogoja o ničelnosti period nista potrebna, saj sledita iz definicije enostavne povezanosti.

**Opomba 3.15.** Dodatek k izreku pravi, da je vsaka konformna minimalna imerzija  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  oblike (3.23), vsaka holomorfná ničelna krivulja  $z: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  pa oblike (3.25). Prav zato je Enneper-Weierstrassova formula elegantna metoda za konstrukcijo opisanih preslikav.

Kot smo omenili zgoraj, včasih pišemo  $\Phi = f\theta$ , pri čemer je  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma na  $M$  in  $f = \Phi/\theta: M \rightarrow \mathbf{A}_*$  holomorfná preslikava.

Če konformno minimalno imerzijo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  poznamo, potem pripadajočo povsod neničelno holomorfná 1-formo  $\Phi = 2\partial x$  z vrednostmi v  $\mathbb{C}^n$  imenujemo *Weierstrassovi podatki* preslikave  $x$ . Analogno, za holomorfná ničelno krivuljo  $z: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  pripadajočo 1-formo  $\Phi = \partial z = dz$  imenujemo *Weierstrassovi podatki* preslikave  $z$ .

### 3.4 Gaussova preslikava

V razdelku o ukrivljenosti ploskve smo pri računanju vektorja povprečne ukrivljenosti v trirazsežnem prostoru omenili Gaussovo preslikavo. Sedaj bomo formalno definirali Gaussovo preslikavo minimalne ploskve ter se ponovno osredotočili na trirazsežni primer – izpeljali bomo klasično Weierstrassovo formulo za minimalne ploskve v prostoru  $\mathbb{R}^3$ .

**Definicija 3.16.** Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $n \geq 3$ . (*Posplošena*) *Gaussova preslikava* konformne minimalne imerzije  $x = (x_1, \dots, x_n): M \rightarrow \mathbb{R}^n$  je holomorfná preslikava

$$\mathcal{G} = [\partial x_1 : \dots : \partial x_n]: M \rightarrow \mathbf{Q}^{n-2} \subset \mathbb{CP}^{n-1}. \quad (3.27)$$

Gaussova preslikava holomorfné ničelne krivulje  $z = (z_1, \dots, z_n): M \rightarrow \mathbb{C}^n$  je holomorfná preslikava

$$\mathcal{G} = [dz_1 : \dots : dz_n]: M \rightarrow \mathbf{Q}^{n-2} \subset \mathbb{CP}^{n-1}.$$

Pri tem je množica  $\mathbf{Q}^{n-2} = \{[z_1 : \dots : z_n] \in \mathbb{CP}^{n-1}; \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0\}$  *hiperkvadrika* v  $\mathbb{CP}^{n-1}$ , ki jo dobimo s projektivizacijo punktirane ničelne kvadrike  $\mathbf{A}_*^{n-1} \subset \mathbb{C}^n$ .

Oglejmo si Gaussovo preslikavo v primeru trirazsežnega prostora. Hiperkvadriko  $\mathbf{Q}^1 \subset \mathbb{CP}^2$ , ki je racionalna krivulja, parametrizirajmo z biholomorfnó preslikavo

$$\begin{aligned} \tau: \mathbb{CP}^1 &\rightarrow \mathbf{Q}^1, \\ \tau(t) &= [1 - t^2 : i(1 + t^2) : 2t]. \end{aligned} \quad (3.28)$$

Koordinate slike označimo z  $u = 1 - t^2$ ,  $v = i(1 + t^2)$  in  $w = 2t$ , ter od tod izrazimo

$$t = \frac{w}{u - iv} \in \mathbb{CP}^1.$$

Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $x = (x_1, x_2, x_3): M \rightarrow \mathbb{R}^3$  konformna minimalna imerzija. Ker želimo povezavo med imerzijo in hiperkvadriko, parcialne odvode označimo z  $2\partial x = 2(\partial x_1, \partial x_2, \partial x_3) = (\phi_1, \phi_2, \phi_3) = \Phi$ , nato pa definirajmo holomorfnó preslikavo (ki izhaja iz izražave spremenljivke  $t$  zgoraj)

$$\mathbf{g}: M \rightarrow \mathbb{CP}^1, \quad \mathbf{g} = \frac{\phi_3}{\phi_1 - i\phi_2} = \frac{\partial x_3}{\partial x_1 - i\partial x_2}. \quad (3.29)$$

Imenujemo jo *kompleksna Gaussova preslikava* konformne minimalne imerzije  $x$ . (Kompleksna Gaussova preslikava  $\mathbf{g}: M \rightarrow \mathbb{CP}^1$  je z običajno Gaussovo preslikavo  $N: M \rightarrow \mathbb{S}^2$  minimalne ploskve  $x(M)$  povezana preko stereografske projekcije glede na severni pol  $(0, 0, 1)$ , ki identificira 2-sfero  $\mathbb{S}^2$  z Riemannovo sfero  $\mathbb{CP}^1$ .) Kompozitum

$$\mathcal{G}: M \rightarrow \mathbf{Q}^1 \subset \mathbb{CP}^2, \quad \mathcal{G} = \tau \circ \mathbf{g} \quad (3.30)$$

je iskana (posplošena) Gaussova preslikava.

Od tod lahko izpeljemo Enneper-Weierstrassovo formulo za minimalne ploskve v  $\mathbb{R}^3$ , o kateri smo govorili v prejšnjem razdelku. Recimo, da je konformna minimalna imerzija  $x$  podana. Računajmo njene Weierstrassove podatke. Velja<sup>6</sup>

$$2\partial x = \Phi = \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\mathbf{g}} - \mathbf{g} \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{\mathbf{g}} + \mathbf{g} \right), 1 \right) \phi_3. \quad (3.31)$$

Obratno, če poznamo holomorfnost preslikavo  $\mathbf{g}: M \rightarrow \mathbb{CP}^1$  in holomorfnost 1-formo  $\phi_3$  na  $M$ , potem je 1-forma  $\Phi$ , določena z enakostjo (3.31) meromorfnost na  $M$  in zadošča pogoju  $\phi_1^2 + \phi_2^2 + \phi_3^2 = 0$  po definiciji preslikave  $\mathbf{g}$ . Kadar je dodatno  $\Phi$  brez ničel in polov na  $M$  in je  $\Re \int_C \Phi = 0$  za vse sklenjene krivulje  $C \subset M$ , potem po Izreku 3.13 konformno minimalno imerzijo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^3$  definira predpis

$$x(p) = p_0 + \Re \int_{p_0}^p \Phi = p_0 + \Re \int_{p_0}^p \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\mathbf{g}} - \mathbf{g} \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{\mathbf{g}} + \mathbf{g} \right), 1 \right) \phi_3, \quad (3.32)$$

kjer sta  $p_0 \in M$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}^3$  poljubni izbrani točki ter je  $p \in M$  spremenljivka.

### 3.5 Primeri minimalnih ploskev

Oglejmo si nekaj najpreprostejših in tudi zgodovinsko zanimivih primerov minimalnih ploskev. Trivialni primer je ravnina oziroma del ravnine.

Vzemimo holomorfnost ničelno krivuljo  $z = x + iy: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^3$ , definirano s predpisom

$$z(\zeta) = (\cos \zeta, \sin \zeta, -i\zeta), \quad \zeta = u + iv \in \mathbb{C}. \quad (3.33)$$

Imenujemo jo *helikatenoida*. Ker je  $z(0) = (1, 0, 0)$  in  $z'(\zeta) = (-\sin \zeta, \cos \zeta, -i)d\zeta$ , je Enneper-Weierstrassova formula helikatenoide enaka

$$\begin{aligned} z(\zeta) &= (1, 0, 0) + \int_0^\zeta (-\sin \xi, \cos \xi, -i)d\xi \\ &= (1, 0, 0) + \int_0^\zeta \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} - e^{i\xi} \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} + e^{i\xi} \right), 1 \right) (-i)d\xi. \end{aligned} \quad (3.34)$$

<sup>6</sup>Res, če upoštevamo zvezo  $\phi_1^2 + \phi_2^2 + \phi_3^2 = 0$ , dobimo

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\mathbf{g}} - \mathbf{g} \right) \phi_3 &= \frac{1}{2} \left( \frac{\phi_1 - i\phi_2}{\phi_3} - \frac{\phi_3}{\phi_1 - i\phi_2} \right) \phi_3 = \frac{\phi_1^2 - 2i\phi_1\phi_2 - \phi_2^2 - \phi_3^2}{2(\phi_1 - i\phi_2)} = \frac{\phi_1^2 - i\phi_1\phi_2}{\phi_1 - i\phi_2} = \phi_1, \\ \frac{i}{2} \left( \frac{1}{\mathbf{g}} + \mathbf{g} \right) \phi_3 &= \frac{i}{2} \frac{\phi_1^2 - 2i\phi_1\phi_2 - \phi_2^2 + \phi_3^2}{\phi_1 - i\phi_2} = \frac{i}{2} \frac{-2i\phi_1\phi_2 - 2\phi_2^2}{\phi_1 - i\phi_2} = \frac{-i\phi_2(i\phi_1 + \phi_2)}{\phi_1 - i\phi_2} = \phi_2. \end{aligned}$$

Iz zadnje preberemo njeno kompleksno Gaussovo preslikavo  $\mathbf{g}(\zeta) = e^{i\zeta}$ .

Pridružene minimalne ploskve k helikatenoidi predstavlja družina preslikav (za  $t \in \mathbb{R}$ ),  $x^t = \Re(e^{it}z): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^3$ , definiranih s predpisom

$$\begin{aligned} x^t(\zeta) &= \Re(e^{it} \cos \zeta, e^{it} \sin \zeta, -ie^{it}\zeta) \\ &= \cos t \begin{pmatrix} \cos u \cdot \cosh v \\ \sin u \cdot \cosh v \\ v \end{pmatrix} + \sin t \begin{pmatrix} \sin u \cdot \sinh v \\ -\cos u \cdot \sinh v \\ u \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (3.35)$$

Res, izračunajmo komponente:

$$\begin{aligned} \Re(e^{it} \cos \zeta) &= \Re((\cos t + i \sin t) \cdot \cos(u + iv)) \\ &= \Re((\cos t + i \sin t) \cdot (\cos u \cosh v - i \sin u \sinh v)) \\ &= \cos t \cdot \cos u \cosh v + \sin t \cdot \sin u \sinh v, \\ \Re(e^{it} \sin \zeta) &= \Re((\cos t + i \sin t) \cdot \sin(u + iv)) \\ &= \Re((\cos t + i \sin t) \cdot (\sin u \cosh v + i \cos u \sinh v)) \\ &= \cos t \cdot \sin u \cosh v - \sin t \cdot \cos u \sinh v, \\ \Re(-ie^{it}\zeta) &= \Re(-i(\cos t + i \sin t) \cdot (u + iv)) \\ &= \cos t \cdot v + \sin t \cdot u. \end{aligned}$$

Podrobneje bomo opisali dve pridruženi minimalni ploskvi k helikatenoidi, katenoido in helikoid.

### 3.5.1 Katenoida

Začnimo s holomorfnimi ničelnimi krivuljami  $z: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^3$ , podano s predpisom (3.33). Njenemu realnemu delu, ki je preslikava  $x: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  s parametrizacijo

$$x(u, v) = (\cos u \cdot \cosh v, \sin u \cdot \cosh v, v), \quad (3.36)$$


pravimo *katenooida*. Po drugi strani do njene konformne parametrizacije pridemo preko pridruženih minimalnih ploskev k izbrani holomorfni ničelni krivulji – katenoida ustreza parametrom  $t = k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

Geometrijsko je obravnavana minimalna ploskev rotacijska ploskev, ki nastane z rotacijo grafa hiperboličnega kosinusa (t. i. *verižnice*) okoli izbrane osi v prostoru  $\mathbb{R}^3$ . Katenoida z osjo rotacije  $x = y = 0$  na primer nastane, če graf krivulje  $z \mapsto (\cosh z, 0, z)$ ,  $z \in \mathbb{R}$ , zavrtimo okrog  $z$ -osi. Implicitna enačba nastale minimalne ploskve se glasi

$$x^2 + y^2 = \cosh^2 z. \quad (3.37)$$

Opazimo, da je parametrizacija katenoide (3.36)  $2\pi$ -periodična glede na spremenljivko  $u$ . V Enneper-Weierstrassovo formulo helikatenoide (3.34) uvedimo novo





Slika 1: Katenoida z implicitno enačbo (3.37).

spremenljivko  $w = e^{i\zeta} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  in vzemimo njen realni del. Računajmo

$$\begin{aligned} z(\zeta) &= (1, 0, 0) + \int_0^\zeta \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} - e^{i\xi} \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} + e^{i\xi} \right), 1 \right) (-i) d\xi \\ &= (1, 0, 0) + \int_1^w \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\eta} - \eta \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{\eta} + \eta \right), 1 \right) (-i) \frac{-i}{\eta} d\eta \\ &= (1, 0, 0) - \int_1^w \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\eta} - \eta \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{\eta} + \eta \right), 1 \right) \frac{d\eta}{\eta}, \end{aligned}$$

kar nam da parametrizacijo katenoida  $x: \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$  z Enneper-Weierstrassovo formulo

$$x(w) = (1, 0, 0) - \Re \int_1^w \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\eta} - \eta \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{\eta} + \eta \right), 1 \right) \frac{d\eta}{\eta}. \quad (3.38)$$

Sledi, da je kompleksna Gaussova preslikava katenoida enaka  $\mathbf{g}(w) = w$  za  $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , ki jo holomorfno razširimo do identične preslikave na  $\mathbb{CP}^1$ . Identiteta je preslikava stopnje  $d = 1$ , zato iz teorije o Gaussovih preslikavah dobimo vrednost totalne Gaussove ukrivljenosti katenoida, ki znaša  $-4\pi$ . Izkaže se, da je to edini primer iz družine pridruženih minimalnih ploskev k helikatenoidi s končno totalno Gaussovo ukrivljenostjo.

Katenoido je kot rotacijsko ploskev prvi opisal Leonhard Euler l. 1744. Dobro stoletje kasneje je P. O. Bonnet pokazal, da je to (razen ravnine) edina rotacijska minimalna ploskev v trirazsežnem prostoru. Ker je razmeroma enostavna in ima še več posebnih topoloških lastnosti, jo običajno spoznamo kot prvi primer pri študiju minimalnih ploskev.


### 3.5.2 Helikoid

Negativno predznačeni imaginarni del helikatenoide imenujemo *helikoid*. Natančneje, to je preslikava  $y = -\Im z = \Re(iz): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  s konformno parametrizacijo

$$y(u, v) = (\sin u \cdot \sinh v, -\cos u \cdot \sinh v, u). \quad (3.39)$$

Helikoid je pridružena minimalna ploskev k helikatenoidu, ki ustreza parametrom  $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . (Res,  $e^{it}z = iz$  natanko tedaj, ko je  $t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Z izbiro  $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , pa dobimo levi in desni helicoid.) Po definiciji sta katenoida in helicoid konjugirani minimalni ploskvi.

Geometrijsko helicoid dobimo na naslednji način: premico rotiramo okrog izbrane osi v  $\mathbb{R}^3$  (tj. v ravnini v  $\mathbb{R}^3$ ) in jo hkrati premikamo vzdolž te osi (v pravokotni smeri glede na ravnino, v kateri premico rotiramo).



Slika 2: Helikoid v  $\mathbb{R}^3$  z z-osjo kot osjo rotacije.

Enneper-Weierstrassovo formulo helikoida dobimo iz izraza (3.34):

$$\begin{aligned} y(\zeta) &= \Re(iz(\zeta)) = \Re \left( (i, 0, 0) + \int_0^\zeta \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} - e^{i\xi} \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} + e^{i\xi} \right), 1 \right) (-i) i d\xi \right) \\ &= \Re \int_0^\zeta \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} - e^{i\xi} \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{e^{i\xi}} + e^{i\xi} \right), 1 \right) d\xi, \quad \zeta \in \mathbb{C}. \end{aligned} \quad (3.40)$$

Njegova kompleksna Gaussova preslikava je  $\mathbf{g}(\zeta) = e^{i\zeta}$ , kar nam pove, da ima helicoid negativno neskončno totalno Gaussovo ukrivljenost;  $TC(y) = -\infty$ .

O helikoidu sta prva pisala L. Euler in J. B. Meusnier v 80.-ih letih 18. stoletja, brez znanja o konjugiranih minimalnih ploskvah in povezavi s kompleksno analizo. Omenimo še dve zanimivi lastnosti obravnavane minimalne ploskve:

- Za vsako točko na helikoidu obstaja premica, ki leži na njem in gre skozi to točko.
- Za vsako točko na helikoidu obstaja vijačnica, ki leži na njem in gre skozi to točko.

Prvo lastnost kot minimalni ploskvi v  $\mathbb{R}^3$  premoreta le helikoid in ravnina, kar je l. 1842 dokazal E. C. Catalan. Druga lastnost namiguje na izvor imena – helikoid spominja na latinsko besedo “helix”, kar v slovenščini imenujemo vijačnica.

### 3.5.3 Enneperjeva ploskev

Recimo, da poznamo par  $(\mathbf{g}, \phi_3)$ , kjer sta  $\mathbf{g}(z) = z$  holomorfná preslikava in  $\phi_3(z) = 2z$  holomorfná 1-forma ( $z \in \mathbb{C}$ ). Potem po zvezi (3.31) vemo, da je meromorfná 1-forma  $\Phi$  enaka

$$\Phi = \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z} - z \right), \frac{i}{2} \left( \frac{1}{z} + z \right), 1 \right) \cdot 2z = (1 - z^2, i(1 + z^2), 2z).$$

Enneper-Weierstrassova formula preslikave  $x: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}^3$  se glasi

$$x(\zeta) = \Re \int_0^\zeta (1 - z^2, i(1 + z^2), 2z) dz \quad (3.41)$$

in določa minimalno ploskev, imenovano *Enneperjeva ploskev*, ki jo je l. 1868 odkril A. Enneper.

Če za  $u, v \in \mathbb{R}$  pišemo  $\zeta = u + iv \in \mathbb{C}$  in po komponentah izračunamo realne dele zgornjega integrala, dobimo konformno parametrizacijo  $x: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,

$$x(u, v) = \left( \frac{u}{3} (3(1 + v^2) - u^2), \frac{v}{3} (v^2 - 3(1 + u^2)), u^2 - v^2 \right). \quad (3.42)$$

Iz izbire podatkov vemo, da je kompleksna Gaussova preslikava Enneperjeve ploskve enaka  $\mathbf{g}(z) = z$ , zato ima le-ta podobno kot katenoida totalno Gaussovo ukrivljenost enako  $-4\pi$ . Izkaže se, da sta to edini kompletni<sup>7</sup> neravni orientabilni minimalni ploskvi vloženi v  $\mathbb{R}^3$ , katerih totalna Gaussova ukrivljenost znaša  $-4\pi$ . Poleg tega je Enneperjeva ploskev konjugirana sama sebi.

## 4 Izreki o aproksimaciji in interpolaciji minimalnih ploskev

Glavni cilj magistrske naloge so izreki o aproksimaciji in interpolaciji minimalnih ploskev, ki jih bomo predstavili v tem poglavju. Osnovna ideja so klasični aproksimacijski in interpolacijski izreki za holomorfne funkcije – Rungejev, Bishop-Mergelyanov

<sup>7</sup>Pot  $\gamma: [0, a) \rightarrow M$ ,  $a \in (0, +\infty]$ , je *divergentna*, če za vsako kompaktno podmnožico  $K \subset M$  velja:  $\gamma(t) \notin K$ , ko  $t \rightarrow a$ . Če je vsaka divergentna pot v  $M$  razreda  $\mathcal{C}^1$  neskončne dolžine, Riemannovi mnogoterosti  $M$  pravimo *kompletna*.

in Weierstrass-Florackov izrek (Izreki 2.22, 2.24, 2.26), katere je potrebno ustrezno prilagoditi.

Osredotočili se bomo na povezane odprte Riemannove ploskve  $M$  z izbrano fiksno strukturo kompleksne mnogoterosti, na katerih bomo definirali konformne minimalne imerzije  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  oziroma holomorfne ničelne krivulje  $z: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  ( $n \geq 3$ ). V nekaterih primerih bomo za  $M$  izbrali kompaktno Riemannovo ploskev z robom, natančneje, kompaktno domeno  $M$  z gladtim robom  $\partial M$ , ki je podmnožica odprte Riemannove ploskve.

## 4.1 Prostori preslikav in posplošene minimalne imerzije

Najprej definirajmo različne tipe konformnih minimalnih imerzij glede na njihovo sliko ter pripadajoče prostore preslikav.

**Definicija 4.1.** Naj bo  $M$  povezana odprta Riemannova ploskev ali kompaktna Riemannova ploskev z robom, na kateri je definirana povsod neničelna holomorfna 1-forma  $\theta$ . Konformno minimalno imerzijo  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  imenujemo:

1. *ravna*, če je slika  $x(M)$  vsebovana v afini ravnini v  $\mathbb{R}^n$ ; sicer pravimo, da je  $x$  *neravna*;
2. *polna*, če je preslikava  $f = 2\partial x/\theta: M \rightarrow \mathbf{A}_*^{n-1}$  polna, tj.  $\mathbb{C}$ -linearna ogrinjača slike  $f(M)$  je enaka  $\mathbb{C}^n$ ;
3. *neizrojena*, če slika  $x(M)$  ni vsebovana v nobeni afini hiperravnini v  $\mathbb{R}^n$ .

V dimenziji  $n = 3$  za konformno minimalno imerzijo vsi zgornji pojmi sovpadajo. V višjih dimenzijah ( $n \geq 4$ ) veljata implikaciji

$$\text{polna} \Rightarrow \text{neizrojena} \Rightarrow \text{neravna}. \quad (4.1)$$

Obratne implikacije ne vejajo.

Naj bosta  $M$  in  $X$  kompleksni mnogoterosti. Prostor holomorfnih preslikav  $M \rightarrow X$  označimo z  $\mathcal{O}(M, X)$ . Če je  $K$  kompaktna podmnožica v  $M$ , množico preslikav  $K \rightarrow X$  razreda  $\mathcal{C}^r(M)$ , ki so holomorfne v notranjosti  $K^\circ \subset K$ , označimo z  $\mathcal{A}^r(K, X)$ . V primeru, ko je  $X = \mathbb{C}$ , ustrezna prostora označimo z  $\mathcal{O}(M)$  oziroma  $\mathcal{A}^r(K)$ .

Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $n \geq 3$ . Prostor konformnih minimalnih imerzij  $M \rightarrow \mathbb{R}^n$  označimo s  $\text{CMI}(M, \mathbb{R}^n)$ , prostor holomorfnih ničelnih krivulj  $M \rightarrow \mathbb{C}^n$  pa z  $\text{NC}(M, \mathbb{C}^n)$ . Oba prostora sta opremljena s kompaktno-odprto topologijo. Nadalje  $\text{CMI}_{full}(M, \mathbb{R}^n)$  in  $\text{CMI}_{nf}(M, \mathbb{R}^n)$  označujeta prostora polnih oziroma neravnih konformnih minimalnih imerzij na povezanih komponentah  $M$ . Po zvezi (4.1) velja inkluzija

$$\text{CMI}_{full}(M, \mathbb{R}^n) \subset \text{CMI}_{nf}(M, \mathbb{R}^n).$$

Podobno je

$$\text{NC}_{full}(M, \mathbb{C}^n) \subset \text{NC}_{nf}(M, \mathbb{C}^n)$$

v primeru polnih ter neravnih holomorfnih ničelnih krivulj, saj analogna definicija k Definiciji 4.1 velja za holomorfne ničelne krivulje. Vsi ti prostori so odprti podprostor v  $\text{CMI}(M, \mathbb{R}^n)$  oziroma  $\text{NC}(M, \mathbb{C}^n)$ .

Če je  $M$  kompaktna Riemannova ploskev z nepraznim gladkim robom  $bM$  in  $r \in \mathbb{N}$ , tedaj prostor konformnih minimalnih imerzij  $M \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{A}^r(M)$  označimo s  $\text{CMI}^r(M, \mathbb{R}^n)$ , prostor holomorfnih ničelnih krivulj  $M \rightarrow \mathbb{C}^n$  razreda  $\mathcal{A}^r(M)$  pa z  $\text{NC}^r(M, \mathbb{C}^n)$ . Odprte podprostore polnih in neravnih preslikav tokrat označimo podobno kot prej; zanje velja

$$\text{CMI}_{full}^r(M, \mathbb{R}^n) \subset \text{CMI}_{nf}^r(M, \mathbb{R}^n), \quad \text{NC}_{full}^r(M, \mathbb{C}^n) \subset \text{NC}_{nf}^r(M, \mathbb{C}^n).$$

**Opomba 4.2.** Imerzija  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{A}^r(M)$  na kompaktni Riemannovi ploskvi z nepraznim gladkim robom  $bM$  je element prostora  $\text{CMI}^r(M, \mathbb{R}^n)$  natanko tedaj, ko je pripadajoča 1-forma  $\partial x = (\partial x_1, \dots, \partial x_n)$  holomorfnna na  $M^\circ = M \setminus bM$  in zadošča ničelnemu pogoju  $(\partial x_1)^2 + \dots + (\partial x_n)^2 = 0$ .

Zgoraj smo omenili kompaktno-odprto topologijo, zato jo natančneje razložimo. Naj bosta  $M$  in  $X$  gladki mnogoterosti,  $r \in \mathbb{N}$  in preslikava  $f: M \rightarrow X$  razreda  $\mathcal{C}^r(M, X)$ . Okolico preslikave  $f$  v *kompaktno-odprti* ali tudi *šibki*  $\mathcal{C}^r$  topologiji na prostoru  $\mathcal{C}^r(M, X)$  tvorijo preslikave  $g \in \mathcal{C}^r(M, X)$ , ki ustrezajo naslednji zahtevi. Naj bosta  $K \subset M$  dana kompaktna podmnožica in  $\varepsilon > 0$ . Izberimo taka gladka atlasa na  $M$  in  $X$ , ki množici  $K$  in  $f(K)$  pokrijeta s končno mnogo lokalnimi kartami  $(U_i, \phi_i)$  oz.  $(V_i, \psi_i)$ , pri čemer naj preslikava  $f$  lokalno karto  $U_i \subset K$  preslika v lokalno karto  $V_i \subset f(K)$ . Računamo  $\mathcal{C}^r$ -normo razlike preslikav  $f$  in  $g$  ter njunih odvodov do reda  $r$  v prej izbranih parih lokalnih kart. Ustrezne so tiste preslikave  $g$ , za katere so vse  $\mathcal{C}^r$ -norme razlik manjše od predpisanega števila  $\varepsilon$ .

Opomnimo, da je topologija neodvisna od izbora atlasov na mnogoterostih oziroma lokalnih kart na  $K$  in  $f(K)$ , čeprav je postopek iskanja okolic preslikave od teh izbir odvisen.

**Lema 4.3.** *Naj bo  $M$  povezana Riemannova ploskev in  $\mathbf{A}_*$  punktirana ničelna kvadrika. Holomorfnna preslikava  $f: M \rightarrow \mathbf{A}_*$  je neravna natanko tedaj, ko je linearna ogrinjača tangentnih prostorov  $T_{f(p)}\mathbf{A} \subset T_{f(p)}\mathbb{C}^n \cong \mathbb{C}^n$  po vseh  $p \in M$  enaka  $\mathbb{C}^n$ .*

*Dokaz.* Oglejmo si preslikavo  $\Phi: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ , definirano s predpisom  $\Phi(z) = \sum_{j=1}^n z_j^2$ . Ničelno kvadriko (3.21) tedaj lahko zapišemo v obliki  $\mathbf{A} = \Phi^{-1}(\{0\})$ . Njen tangentni prostor v točki  $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$  je enak jedru diferenciala, ki kvadriko določa, zato je

$$T_z\mathbf{A} = \ker(d\Phi_z) = \ker\left(z \mapsto \sum_{j=1}^n z_j dz_j\right).$$

Naj bosta vektorja  $z, w \in \mathbb{C}_*^n$ . Potem sta njuna tangentna prostora enaka,  $T_z\mathbf{A} = T_w\mathbf{A}$ , natanko takrat, ko velja  $z_j = \lambda w_j$  za vse  $j = 1, \dots, n$  in nek  $\lambda \in \mathbb{C}$ , kar je ekvivalentno pogoju, da sta vektorja  $z$  in  $w$  kolinearna.

Po definiciji je preslikava  $f$  neravna, če njena slika  $f(M)$  ni vsebovana v nobeni afini kompleksni premici v  $\mathbb{C}^n$ . Skupaj z zgornjim je slednje ekvivalentno  $\text{Lin}\{T_{f(p)}\mathbf{A}; p \in M\} = \mathbb{C}^n$ , kar smo želeli dokazati.  $\square$

V aproksimacijskih in interpolacijskih izrekih bomo v dokazih namesto običajnih konformnih minimalnih imerzij in ničelnih krivulj operirali s splošnejšimi preslikavami, imenovanimi posplošene minimalne imerzije ter ničelne krivulje; naravno pa se bodo zaradi topoloških lastnosti množic, na katerih bomo preslikave aproksimirali, pojavile tudi množice iz naslednje definicije.

**Definicija 4.4** (Dopustna množica). Naj bo  $M$  gladka ploskev,  $K$  končna unija paroma disjunktne kompaktnih domen s kosoma zvezno odvedljivimi robovi v  $M$  ter  $E = S \setminus K^\circ$  unija končno mnogo paroma disjunktne gladkih Jordanovih lokov in zaprtih Jordanovih krivulj, ki se dotikajo  $K$  kvečjemu v svojih krajiščih in sekajo rob  $K$  transversalno. Kompaktno podmnožico v  $M$  oblike  $S = K \cup E$  imenujemo *dopustna množica*.

**Definicija 4.5** (Posplošena konformna minimalna imerzija). Naj bo  $S = K \cup E$  dopustna podmnožica Riemannove ploskve  $M$  in  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma, definirana v okolici  $S \subset M$ . Naj bosta  $n \geq 3$  in  $r \in \mathbb{N}$ . *Posplošena konformna minimalna imerzija*  $S \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r$  je par  $(x, f\theta)$ , kjer je  $x: S \rightarrow \mathbb{R}^n$  preslikava razreda  $\mathcal{C}^r$ , njena zožitev na  $S^\circ = K^\circ$  je konformna minimalna imerzija in preslikava  $f \in \mathcal{A}^{r-1}(S, \mathbf{A}_*)$  zadošča naslednjima pogojema:

1. na množici  $K$  velja  $f\theta = 2\partial x$ ;
2. za vsako gladko pot  $\alpha$  v  $M$ , ki parametrizira povezano komponento množice  $E = \overline{S} \setminus \overline{K}$ , velja  $\Re(\alpha^*(f\theta)) = \alpha^*(dx) = d(x \circ \alpha)$ .

Posplošena konformna minimalna imerzija  $(x, f\theta)$  je *neravna* oziroma *polna* natanko tedaj, ko je preslikava  $f \in \mathcal{A}^{r-1}(S, \mathbf{A}_*)$  neravna oziroma polna na vsaki relativno odprti podmnožici  $S$ .

Prostor posplošenih konformnih minimalnih imerzij  $S \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r$  označimo z  $\text{GCMI}^r(S, \mathbb{R}^n)$ . Analogno kot v primeru konformnih minimalnih imerzij velja

$$\text{GCMI}_{full}^r(S, \mathbb{R}^n) \subset \text{GCMI}_{nf}^r(S, \mathbb{R}^n) \subset \text{GCMI}^r(S, \mathbb{R}^n).$$

**Opomba 4.6.** Spomnimo se diferenciala in konjugiranega diferenciala v kompleksnem. Zanju velja  $d + id^c = 2\partial$  oziroma drugače,  $\Re(2\partial x) = dx$ . Prvi pogoj iz definicije posplošene konformne minimalne imerzije pravi  $f\theta = 2\partial x$ , od koder sledi  $\Re(f\theta) = \Re(2\partial x) = dx$ . Zato je drugi pogoj iz zgornje definicije skladen s prvim.

Tudi za posplošene konformne minimalne imerzije velja Enneper-Weierstrassova formula. Naj bo  $S$  povezana dopustna množica in  $(x, f\theta) \in \text{GCMI}^r(S, \mathbb{R}^n)$ . Za poljubno točko  $p_0 \in S$  in poznano preslikavo  $f$  lahko posplošeno konformno minimalno imerzijo  $x: S \rightarrow \mathbb{R}^n$  konstruiramo s formulo

$$x(p) = x(p_0) + \Re \int_{p_0}^p f\theta, \quad p \in S. \quad (4.2)$$

Obratno, če za preslikavo  $f \in \mathcal{A}^{r-1}(S, \mathbf{A}_*)$  velja  $\Re \int_C f\theta = 0$  za vsako sklenjeno krivuljo  $C$  v  $S$ , potem le-ta določa posplošeno konformno minimalno imerzijo, dano z Enneper-Weierstrassovo formulo (4.2).

**Definicija 4.7** (Posplošena ničelna krivulja). Naj bo  $S = K \cup E$  dopustna podmnožica Riemannove ploskve  $M$  in  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma, definirana v okolici  $S \subset M$ . Naj bosta  $n \geq 3$  in  $r \in \mathbb{N}$ . *Posplošena ničelna krivulja*  $S \rightarrow \mathbb{C}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r$  je par  $(z, f\theta)$ , kjer preslikavi  $z \in \mathcal{A}^r(S, \mathbb{C}^n)$  in  $f \in \mathcal{A}^{r-1}(S, \mathbf{A}_*)$  zadoščata naslednjima pogojema:

1. na množici  $K$  velja  $f\theta = dz = \partial z$ ;
2. za vsako gladko pot  $\alpha$  v  $M$ , ki parametrizira povezano komponento množice  $E = \overline{S} \setminus K$  velja  $\alpha^*(f\theta) = \alpha^*(dz) = d(z \circ \alpha)$ .

Posplošena ničelna krivulja  $(z, f\theta)$  je *neravna* oziroma *polna* natanko tedaj, ko je preslikava  $f \in \mathcal{A}^{r-1}(S, \mathbf{A}_*)$  neravna oziroma polna na vsaki relativno odprti podmnožici  $S$ .

Prostori neravnih, polnih in posplošenih ničelnih krivulj ustrezajo verigi inkluzij

$$\text{GNC}_{full}^r(S, \mathbb{C}^n) \subset \text{GNC}_{nf}^r(S, \mathbb{C}^n) \subset \text{GNC}^r(S, \mathbb{C}^n).$$

**Opomba 4.8.** Iz prvega pogoja v definiciji posplošene ničelne krivulje sledi, da je zožitev  $z: K^\circ \rightarrow \mathbb{C}^n$  holomorfná ničelna krivulja.

Za povezano dopustno množico  $S$ , par  $(z, f\theta) \in \text{GNC}^r(S, \mathbb{C}^n)$ , znano preslikavo  $f$  in poljubno točko  $p_0 \in S$  posplošeno ničelno krivuljo  $z: S \rightarrow \mathbb{C}^n$  konstruiramo s pomočjo Enneper-Weierstrassove formule

$$z(p) = z(p_0) + \int_{p_0}^p f\theta, \quad p \in S. \quad (4.3)$$

Velja tudi obrat; preslikava  $f \in \mathcal{A}^{r-1}(S, \mathbf{A}_*)$ , ki zadošča  $\int_C f\theta = 0$  za vsako sklenjeno krivuljo  $C$  v  $S$ , določa posplošeno ničelno krivuljo, dano z Enneper-Weierstrassovo formulo (4.3).

## 4.2 Periodno dominantni spreji

V tem razdelku bomo definirali pojem periodno dominantnega spreja holomorfnih preslikav v punktirano ničelno kvadriko. Glavni rezultat bo lema, ki opisuje neravne holomorfne preslikave iz dopustne množice v punktirano ničelno kvadriko – izkaže se, da je vsaka taka preslikava jedro periodno dominantnega spreja. Lema je pomembna pri aproksimaciji konformnih minimalnih imerzij. Natančneje, namesto imerzij bomo najprej aproksimirali periodno dominantne spreje in s tem dobili nove, bližnje preslikave z želenimi topološkimi lastnostmi, nato pa zanje uporabili Enneper-Weierstrassovo formulo ter končno dobili bližnje konformne minimalne imerzije.

**Definicija 4.9** (Periodna preslikava). Naj bo  $M$  povezana odprta Riemannova ploskev in  $\theta$  fiksna povsod neničelna holomorfná 1-forma na  $M$ . Naj bo  $\mathcal{C} =$

$\{C_1, \dots, C_l\}$  družina gladkih orientiranih vloženih lokov in zaprtih Jordanovih krivulj v  $M$  ter  $C = \cup_{i=1}^l C_i$ . Družini  $\mathcal{C}$  in številu  $n \in \mathbb{N}$  priredimo *periodno preslikavo*

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= (\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_l): \mathcal{C}(C, \mathbb{C}^n) \rightarrow (\mathbb{C}^n)^l, \\ \mathcal{P}_i(f) &= \int_{C_i} f \theta, \quad i = 1, \dots, l. \end{aligned} \quad (4.4)$$

Tu je  $f \in \mathcal{C}(C, \mathbb{C}^n)$  in  $\mathcal{P}_i(f) \in \mathbb{C}^n$ .

**Lema 4.10.** *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $S = K \cup E$  njena dopustna podmnožica. Naj bo  $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_l\}$  taka družina gladkih orientiranih Jordanovih krivulj in lokov v  $S$ , da je unija  $C = \cup_{i=1}^l C_i$  Rungejeva v  $S$ . Naj za neko število  $r \in \mathbb{Z}_+$  preslikava  $f: S \rightarrow \mathbf{A}_*$  pripada razredu  $\mathcal{A}^r$ . Nadalje predpostavimo, da vsaka krivulja  $C_i \in \mathcal{C}$  vsebuje netrivialen lok  $I_i \subset C_i$ , disjunkten z  $\cup_{i \neq j} C_j$ , preslikava  $f: I_i \rightarrow \mathbf{A}_*$  pa je neravna.*

*Potem obstaja odprta okolica  $U \subset \mathbb{C}^{ln}$  točke 0 in preslikava  $\Phi_f \in \mathcal{A}^r(S \times U, \mathbf{A}_*)$ , tako da velja  $\Phi_f(\cdot, 0) = f$  in je preslikava*

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=0} \mathcal{P}(\Phi_f(\cdot, t)): (\mathbb{C}^n)^l \rightarrow (\mathbb{C}^n)^l \text{ izomorfizem.} \quad (4.5)$$

*Nadalje, za končno podmnožico  $P \subset S$  lahko preslikavo  $\Phi_f$  izberemo tako, da se za  $t \in U$  preslikave  $\Phi_f(\cdot, t): S \rightarrow \mathbf{A}_*$  ujemajo z  $f$  v vsaki točki  $P \setminus S^\circ$ , v točkah  $P \cap S^\circ$  pa se z  $f$  ujemajo do danega končnega reda.*

*Za vsako preslikavo  $f_0 \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$ , ki zadošča zgornjim predpostavkam, obstaja okolica  $\Omega \subset \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$  in holomorfná preslikava  $f \mapsto \Phi_f$ ,  $f \in \Omega$ , z zgornjimi lastnostmi.*

**Definicija 4.11** (Periodno dominantni sprej). Preslikavo  $\Phi_f$ , ki ustreza Lemi 4.10, imenujemo *periodno dominantni sprej* preslikav  $S \rightarrow \mathbf{A}_*$  za družino krivulj  $\mathcal{C}$  z jedrom  $\Phi_f(\cdot, 0) = f$ . Lastnosti (4.5) pravimo *periodno dominantna lastnost*.

*Dokaz.* Prvi del leme bomo dokazali tako, da bomo konstruirali periodno dominantni sprej. Potrebovali bomo Lemo 4.3, Bishop-Mergelyanov izrek o aproksimaciji 2.24 in pojem toka vektorskega polja. Zaradi enostavnosti postavimo  $r = 0$  (za  $r > 0$  dokaz poteka analogno).

Po predpostavki je za vse  $i \in \{1, \dots, l\}$  lok  $I_i \subset C_i \in \mathcal{C}$  netrivialen, za katerega velja  $I_i \cap (\cup_{i \neq j} C_j) = \emptyset$  in je zožitev preslikave  $f|_{I_i}$  neravna. Po Lemi 4.3 zato obstajajo točke  $p_{i,j} \in I_i$  in taka holomorfná vektorska polja  $V_{i,j}$  na  $\mathbb{C}^n$ ,  $j \in \{1, \dots, n\}$ , ki so tangentna na  $\mathbf{A}$ , da je  $\mathcal{L}in\{V_{i,j}(f(p_{i,j})); j = 1, \dots, n\} = \mathbb{C}^n$  za vse  $i$ .

Za  $k = 1, \dots, l$  označimo  $t_k = (t_{k,1}, \dots, t_{k,n}) \in \mathbb{C}^n$  in  $t = (t_1, \dots, t_l) \in \mathbb{C}^{nl}$ . Naj  $\Phi_t^{i,j}$  označuje tok vektorskega polja  $V_{i,j}$ , definiran za majhne  $t$ . (Seveda so tokovi holomorfne preslikave.) Okolico  $U_0 \subset \mathbb{C}^{nl}$  točke 0 izberimo tako, da za vse  $t \in U_0$  in  $p \in S$  predpis

$$(p, t) \mapsto \Phi_{t_{1,1}}^{1,1} \circ \dots \circ \Phi_{t_{1,n}}^{1,n} \circ \Phi_{t_{2,1}}^{2,1} \circ \dots \circ \Phi_{t_{l,n}}^{l,n}(f(p)) \quad (4.6)$$

podaja dobro definirano preslikavo  $S \times U_0 \rightarrow \mathbf{A}_*$ . Sedaj za vse pare  $(i, j)$  izberimo gladke preslikave  $g_{i,j}: C \rightarrow \mathbb{C}$ , pri čemer je nosilec od  $g_{i,j}$  vsebovan v majhnem delu loka  $I_i$  okrog točke  $p_{i,j} \in I_i$ . Modificirana preslikava (4.6),  $\Phi: C \times U_1 \rightarrow \mathbf{A}_*$ ,

$$\Phi(p, t) = \Phi_{g_{1,1}(p)t_{1,1}}^{1,1} \circ \dots \circ \Phi_{g_{1,n}(p)t_{1,n}}^{1,n} \circ \Phi_{g_{2,1}(p)t_{2,1}}^{2,1} \circ \dots \circ \Phi_{g_{l,n}(p)t_{l,n}}^{l,n}(f(p)), \quad (4.7)$$



kjer je  $U_1 \subset \mathbb{C}^{nl}$  primerno majhna okolica točke 0, je tedaj dobro definirana, za vse  $p \in C$  pa je preslikava  $\Phi(p, \cdot): U_1 \rightarrow \mathbf{A}_*$  holomorfna. Po lastnostih toka vektorskega polja sledi še  $\Phi(p, 0) = f(p)$  za vse  $p \in C$  in

$$\left. \frac{\partial \Phi(p, t)}{\partial t_{m,j}} \right|_{t=0} = g_{m,j}(p) \cdot V_{m,j}(f(p)). \quad (4.8)$$

Naj bo  $\mathcal{P} = (\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_l)$  periodna preslikava, prirejena družini krivulj  $\mathcal{C}$ . Z uporabo enakosti (4.8) dobimo za vse indekse  $i, m \in \{1, \dots, l\}$  in  $j \in \{1, \dots, n\}$

$$\left. \frac{\partial \mathcal{P}_i(\Phi(\cdot, t))}{\partial t_{m,j}} \right|_{t=0} = \left. \frac{\partial}{\partial t_{m,j}} \right|_{t=0} \int_{C_i} \Phi(\cdot, t) \cdot \theta = \int_{C_i} g_{m,j} \cdot (V_{m,j} \circ f) \cdot \theta \in \mathbb{C}^n. \quad (4.9)$$

Matrika diferencialov (4.5) iz leme je sestavljena iz blokov velikosti  $n \times n$ , ki pripadajo indeksom  $i, m \in \{1, \dots, l\}$ . Z ustrezno izbiro preslikav  $g_{i,j}$ , opisanih zgoraj, lahko dosežemo, da je matrika bločno diagonalna z obrnljivimi bloki na diagonalni. (To pomeni, da so vektorji (4.9) blizu vektorjem  $V_{i,j}(f(p_{i,j}))$  za  $i = m$ , medtem ko so za  $i \neq m$  vektorji (4.9) ničelni.) S tem postane celotna matrika obrnljiva.

V naslednjem koraku bomo modificirali še preslikavo  $\Phi$ , kar nam bo dalo iskani periodno dominantni sprej. Preslikave  $g_{i,j}$  so definirane na množici  $C$ , ki je po predpostavki Rungejeva v  $S$ . Bishop-Mergelyanov izrek o aproksimaciji pove, da vsako funkcijo  $g_{i,j}$  lahko enakomerno na  $C$  aproksimiramo s holomorfnimi funkcijami  $\tilde{g}_{i,j}$  v okolici  $S$ .

Definirajmo preslikavo  $\Phi_f: S \times U \rightarrow \mathbf{A}_*$  tako, da v predpisu (4.7) nadomestimo  $g_{i,j}$  z novimi preslikavami  $\tilde{g}_{i,j}$  in je  $U \subset U_1 \subset \mathbb{C}^{nl}$  ustrezno majhna okolica točke  $0 \in \mathbb{C}^{nl}$ . Po konstrukciji takšna preslikava  $\Phi_f$  zadošča sklepom leme, zato je periodno dominantni sprej, ki smo ga iskali.

Sedaj pogledimo še interpolacijski del leme. Naj bo  $P \subset S$  končna podmnožica in  $q \in \mathbb{N}$  izbrano fiksno število. Vzemimo holomorfnio funkcijo  $h: S \rightarrow \mathbb{C}$ , ki ima ničle natanko v točkah množice  $P$ , le-te pa so reda  $q + 1$ . Kot prej obstajajo točke  $p_{i,j} \in I_i \setminus P$ , holomorfna vektorska polja  $V_{i,j} \in \mathbb{C}^n$  ter gladke preslikave  $g_{i,j}$  s kompaktnimi nosilci okrog točk  $p_{i,j}$ . V predpisu (4.7) najprej nadomestimo  $g_{i,j}$  s preslikavami  $h \cdot g_{i,j}$ , da dobimo preslikavo  $\Phi$ , ki zadošča analogu k (4.9). Nato preslikave  $g_{i,j}$  aproksimiramo z  $\tilde{g}_{i,j} \in \mathcal{O}(S)$  ter v predpis (4.7) vstavimo produkte  $h \cdot \tilde{g}_{i,j}$  – nova preslikava  $\Phi_f$  definira periodno dominantni sprej, ki dodatno zadošča interpolacijskim zahtevam. Res, preslikava  $(p, t) \mapsto \Phi_{h(p)\tilde{g}_{m,j}(p)t}^{m,j}(f(p))$  se z  $f$  ujema v točkah množice  $P$ , v točkah  $p \in P \cap S^\circ$  pa se ujemata do reda  $q$ . (To vidimo tako, da tok vektorskega polja zapišemo s Taylorjevim razvojem do 2. reda in upoštevamo stopnje ničel funkcije  $h$  v točkah  $p \in P$ .) Zato enako velja tudi za njihov kompozitum.

Za zadnji del leme opazimo naslednje: če je preslikava  $f_0 \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$  dana, potem lahko za vse preslikave  $f$  iz okolice  $\Omega \subset \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$  za  $f_0$  pri konstrukciji periodno dominantnih sprejev uporabimo iste aproksimacijske preslikave  $\tilde{g}_{i,j}$ .  $\square$

**Opomba 4.12.** Če v zgornjem dokazu izberemo polna holomorfna vektorska polja  $V_{i,j} \in \mathbb{C}^n$ , namesto lokalnega konstruiramo globalno definiran periodno dominantni sprej  $\Phi_f: S \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbf{A}_*$ .

### 4.3 Aproximacija in interpolacija preslikav v punktirano ničelno kvadriko

Prvi rezultat o aproksimaciji in interpolaciji je Lema 4.16, ki opisuje preslikave iz povezane dopustne podmnožice odprte Riemannove ploskve v punktirano ničelno kvadriko  $\mathbf{A}_* \subset \mathbb{C}^n$ . V dokazu leme bomo potrebovali pojem Oka mnogoterosti, katerega definicija sledi, z lastnostjo povezanih dopustnih množic, ki premorejo končno Rungejevo bazo homologije, pa bomo lahko uporabili rezultat prejšnjega razdelka o periodno dominantnih sprejih (Lema 4.10). Za iskanje bližnjih preslikav tistih, ki nastopajo v periodno dominantnem spreju, se bomo sklicali na različice Izrekov 2.22, 2.24 in 2.26, tokrat za preslikave v (Oka) mnogoterosti, ter preslikave, definirane na dopustnih množicah.

**Definicija 4.13** (Oka mnogoterost). Naj bo  $X$  kompleksna mnogoterost in  $n \in \mathbb{N}$ . Če za poljubno kompaktno konveksno množico  $K \subset \mathbb{C}^n$  vsako holomorfnu preslikavo  $f: U \rightarrow X$ , kjer je  $U$  okolica  $K$ , lahko aproksimiramo enakomerno na  $K$  s celimi preslikavami  $F: \mathbb{C}^n \rightarrow X$ , potem mnogoterosti  $X$  pravimo *Oka mnogoterost*.

**Primer 4.14** ( $\mathbf{A}_*$  je Oka mnogoterost). Naj bo  $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$  in  $n \geq 2$ . Tedaj homogen kvadratni polinom  $p(z) = z_1^2 + \dots + z_n^2$  določa ničelno kvadriko  $\mathbf{A} = \{z; p(z) = 0\} \subset \mathbb{C}^n$ . Za indekse  $1 \leq i \neq j \leq n$  definirajmo holomorfna vektorska polja na  $\mathbf{A}_* = \mathbf{A} \setminus \{0\}$  s predpisi

$$V_{ij} = z_i \frac{\partial}{\partial z_j} - z_j \frac{\partial}{\partial z_i}.$$

Očitno so vektorska polja  $\mathbb{C}$ -linearna in polna, tangentna na punktirano ničelno kvadriko  $\mathbf{A}_*$  in  $\mathcal{L}in\{V_{ij}(x); i, j\} = T_x \mathbf{A}_*$  v vsaki točki  $x \in \mathbf{A}_*$ . Po definiciji je zato kompleksna mnogoterost  $\mathbf{A}_*$  fleksibilna<sup>8</sup>, kar pomeni, da je tudi Oka mnogoterost.

Naslednja lema, ki jo navajamo brez dokaza, trdi, da ima povezana dopustna množica posebno bazo homologije. Ideja dokaza, to je konstrukcija Jordanovih krivulj, ki tvorijo homološko bazo, bo za nas pomembna v nadaljevanju. Natančneje, pri aproksimaciji in interpolaciji minimalnih ploskev bomo interpolacijskim pogojem med drugim zadostili s kontroliranjem integralov po teh krivuljah.

**Lema 4.15** (Rungejeva baza homologije povezane dopustne množice). *Naj bo  $S$  povezana dopustna množica. Obstaja baza homologije  $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_l\}$  za  $S$ , sestavljena iz takih zaprtih odsekoma gladkih Jordanovih krivulj v  $S$ , da je unija  $C = \cup_{i=1}^l C_i$  povezana in Rungejeva v vsaki regularni okolici  $S_\varepsilon$  množice  $S$ , vsaka krivulja  $C_i$  pa vsebuje netrivialen lok  $I_i$ , za katerega je  $I_i \cap (\cup_{j \neq i} C_j) = \emptyset$ . Prva homološka grupa povezane dopustne množice  $S$  je končno generirana:  $H_1(S, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^l$ .*

Za  $\varepsilon > 0$  je regularna okolica dopustne množice  $S \subset M$  enaka

$$S_\varepsilon = \{x \in M; d(x, S) < \varepsilon\}. \quad (4.10)$$

<sup>8</sup>Pravimo, da je kompleksna mnogoterost  $M$  fleksibilna, kadar na  $M$  obstaja končno mnogo polnih holomorfnih vektorskih polj  $V_1, \dots, V_n$ , tako da v vsaki točki  $p \in M$  velja  $\mathcal{L}in\{V_1(p), \dots, V_n(p)\} = T_p M$ .

Množica  $S_\varepsilon$  je odprta okolica za  $S$ , slednja nima lukenj v  $S_\varepsilon$ , zato je  $S$  Rungejeva podmnožica svoje regularne okolice.

Sedaj imamo pripravljena vsa orodja za razumevanje aproksimacije in interpolacije preslikav v punktirano ničelno kvadriko.

**Lema 4.16.** *Naj bo  $M$  povezana odprta Riemannova ploskev in  $S = K \cup E$  njena Rungejeva dopustna podmnožica. Izberimo tako družino gladkih orientiranih Jordanih krivulj in lokov v  $S$ ,  $\mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_l\}$ , da je unija  $C = \bigcup_{i=1}^l C_i$  Rungejeva v  $M$ , vsaka krivulja  $C_i$  pa vsebuje netrivialen lok  $I_i$ , za katerega je  $I_i \cap (\bigcup_{j \neq i} C_j) = \emptyset$ . Naj bo  $\mathcal{P}$  periodno dominantni sprej, ki pripada družini krivulj  $\mathcal{C}$ ,  $A = \{a_1, \dots, a_m\} \subset S$  končna množica točk in  $r \geq 1$ . Tedaj lahko vsako preslikavo  $f \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$  aproksimiramo v  $\mathcal{C}^r(S)$  s polnimi holomorfnimi preslikavami  $F \in \mathcal{O}(M, \mathbf{A}_*)$ , pri čemer velja naslednje:*

1.  $\mathcal{P}(F) = \mathcal{P}(f)$ ;
2. preslikavi  $F$  in  $f$  se ujemata v točkah množice  $A$ , v točkah množice  $A \cap S^\circ$  pa se ujemata do danega končnega reda.

*Dokaz.* Lemo bomo dokazali v dveh korakih. Najprej bomo  $f \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$  aproksimirali in interpolirali s polno preslikavo  $g \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$ , za katero je  $\mathcal{P}(f) = \mathcal{P}(g)$ . V drugem delu bomo s pomočjo Leme 4.10 konstruirali periodno dominantni sprej preslikav iz množice  $\mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$  z jedrom  $g$ . Nato bomo z izrekoma Mergelyana in Rungeja o aproksimaciji in interpolaciji preslikav iz odprtih Riemannovih ploskev v  $\mathbf{A}_*$  periodno dominantni sprej aproksimirali in interpolirali s sprejem iz  $\mathcal{O}(M, \mathbf{A}_*)$ , ki nam bo dal preslikavo  $F \in \mathcal{O}(M, \mathbf{A}_*)$ , ustrezno zaključkom leme.

1. korak: Naj bo  $S = K$  povezana kompaktna množica. (Za splošnejšo dopustno množico  $S = K \cup E$  je korak enak, le da ga ponovimo na vsaki povezani komponenti  $K$ , na  $E$  pa polno preslikavo dobimo z manjšo gladko deformacijo preslikave  $f$ .) Predpostavimo, da  $f$  ni polna. Sicer nadaljujemo z drugim korakom. Označimo  $\Sigma(f) = \mathcal{L}in(f(K)) \subset \mathbb{C}^n$ , ki je po predpostavki pravi podprostor v  $\mathbb{C}^n$ . Izberimo točke  $x_1, \dots, x_j \in K \setminus A$  tako, da je  $\Sigma(f) = \mathcal{L}in\{f(x_1), \dots, f(x_j)\}$ . Ker je  $\dim \Sigma(f) \leq n - 1$ , obstaja holomorfnno vektorsko polje  $V$  na  $\mathbb{C}^n$  tangentno na  $\mathbf{A}$ , za katerega velja  $V(f(x_0)) \notin \Sigma(f)$  za neko točko  $x_0 \in K \setminus (A \cup \{x_1, \dots, x_j\})$ .

Naj bo  $t \mapsto \Phi_t(z)$  tok vektorskega polja  $V$  in  $s \in \mathbb{N}$ . Izberimo holomorfnno funkcijo  $h: K \rightarrow \mathbb{C}$  z lastnostmi:

- $h(x_1) = \dots = h(x_j) = 0$ ;
- $h$  ima ničle reda  $s$  v točkah množice  $A$ ;
- $h(x_0) = 1$ .

Za poljubno funkcijo  $\eta \in \mathcal{A}^r(K)$ , ki je blizu ničelne funkcije, definirajmo preslikavo  $\Psi(\eta) \in \mathcal{A}^r(K, \mathbf{A}_*)$  s predpisom

$$\Psi(\eta)(x) = \Phi_{\eta(x)h(x)}f(x), \quad x \in K. \quad (4.11)$$

Obstaja taka nekonstantna funkcija  $\xi \in \mathcal{A}^r(K)$ , ki je poljubno blizu ničelne funkcije, da je

$$\mathcal{P}(\Psi(\xi)) = \mathcal{P}(\Psi(0)) = \mathcal{P}(f).$$

Označimo  $g = \Psi(\xi)$ . Velja naslednje:

- $g(x_i) = \Psi(\xi)(x_i) = \Phi_{\xi(x_i)h(x_i)}f(x_i) = f(x_i)$  za  $i \in \{1, \dots, j\}$ , saj je  $h(x_i) = 0$ . Sledi  $\Sigma(f) \subset \Sigma(g)$ .
- Produkt  $\xi h$  je nekonstanten na kompaktni množici  $K$ , zato lahko dosežemo  $\xi(x_0) \neq 0$  in  $h(x_0) \approx 1$ . Potem velja  $g(x_0) = \Psi(\xi)(x_0) = \Phi_{\xi(x_0)h(x_0)}f(x_0) \approx f(x_0) + \xi(x_0)h(x_0)V(f(x_0)) \notin \Sigma(f)$  po izboru  $V$  in  $x_0$ .
- Ker ima  $h$  ničle reda  $s$  v točkah množice  $A$ , s podobnim razvojem kot v prejšnji točki vidimo, da je  $g|_A = f|_A$ , v točkah  $A \cap S^\circ$  pa se funkciji ujemata do reda  $s$ .

Induktivno nadaljujemo postopek tako, da višamo razsežnost prostora  $\Sigma(f)$ . Ko je  $\dim \Sigma(f) = n - 1$ , dobimo polno preslikavo  $g \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$ , ki aproksimira in interpolira  $f$  ter zadošča pogoju  $\mathcal{P}(g) = \mathcal{P}(f)$ .

2. korak: Novo preslikavo  $g$  iz 1. koraka preimenujmo v  $f$ . Ta je polna in zato neravna. Lema 4.15 pove, da povezana dopustna množica  $S$  premore končno bazo homologie, sestavljeno iz posebnih Jordanovih krivulj. Skupaj z Lemo 4.10 in Opombo 4.12 tako dobimo periodno dominantni sprej  $\Phi_f: S \times \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbf{A}_*$  z jedrom  $f$ .

Po predpostavki je  $S$  Rungejeva podmnožica  $M$ , iz Primera 4.14 pa vemo, da je kvadrika  $\mathbf{A}_*$  Oka mnogoterost. Izreka Rungeja in Mergelyana o aproksimaciji in interpolaciji preslikav v Oka mnogoterosti zagotavljata obstoj holomorfne preslikave  $\tilde{f}: M \rightarrow \mathbf{A}_*$ , ki v  $\mathcal{C}^r(S)$  aproksimira preslikavo  $f$ ,  $\tilde{f}$  se z  $f$  ujema v točkah množice  $A$ , v točkah preseka  $A \cap S^\circ$  pa se ujemata do danega končnega reda.

Podobno kot v dokazu Leme 4.10 lahko po Mergelyanovem izreku o aproksimaciji na dopustnih množicah funkcije  $g_{i,j} \in \mathcal{A}^r(S)$  iz predpisa (4.7) v  $\mathcal{C}^r(S)$  aproksimiramo s funkcijami  $\tilde{g}_{i,j} \in \mathcal{O}(M)$ , tako da se  $g_{i,j}$  z  $\tilde{g}_{i,j}$  ujemajo na  $A$  in do danega končnega reda na  $A \cap S^\circ$ .

Preslikava  $\Phi_{\tilde{f}}: M \times \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbf{A}_*$ , definirana s predpisom

$$\Phi_{\tilde{f}}(p, t) = \Phi_{\tilde{g}_{1,1}(p)t_{1,1}}^{1,1} \circ \dots \circ \Phi_{\tilde{g}_{l,n}(p)t_{l,n}}^{l,n}(\tilde{f}(p)), \quad (4.12)$$

določa periodno dominantni sprej z jedrom  $\tilde{f}$ , ki aproksimira  $\Phi_f$  na  $S \times U$ , kjer je  $U \subset \mathbb{C}^N$  okolica izhodišča. Sprej  $\Phi_f$  zadošča periodno dominantni lastnosti, zato izrek o implicitni preslikavi zagotavlja obstoj točke  $t_0 \in \tilde{U} \subset U$ , za katero preslikava  $F = \Phi_{\tilde{f}}(\cdot, t_0) \in \mathcal{O}(M, \mathbf{A}_*)$  po konstrukciji izpolnjuje pogoj  $\mathcal{P}(F) = \mathcal{P}(f)$ , je polna ter interpolira  $f$  na množici  $A$ .  $\square$

## 4.4 Glavni izrek

### 4.4.1 Nekritični primer

**Trditev 4.17.** *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma na  $M$ . Predpostavimo, da je  $S$  povezana dopustna množica, ki je Rungejeva v  $M$ , ter  $A = \{a_1, \dots, a_k\} \subset S$  končna množica točk. Naj bosta  $r, s \in \mathbb{N}$ . Tedaj velja naslednje:*

1. *Vsako posplošeno konformno minimalno imerzijo  $(x, f\theta) \in \text{GCMI}^r(S, \mathbb{R}^n)$  lahko v  $\mathcal{C}^r(S)$  aproksimiramo s polnimi konformnimi minimalnimi imerzijami  $X: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ , za katere je  $\text{Flux}_X = \text{Flux}_x$ .*
2. *Vsako posplošeno ničelno krivuljo  $(z, f\theta) \in \text{GNC}^r(S, \mathbb{C}^n)$  lahko v  $\mathcal{C}^r(S)$  aproksimiramo s polnimi holomorfnimi ničelnimi krivuljami  $Z: M \rightarrow \mathbb{C}^n$ .*

*Dodatno, preslikave  $X$  oz.  $Z$  lahko izberemo tako, da se s preslikavama  $x$  oz.  $z$  ujemajo v točkah množice  $A$  ter do danega končnega reda v točkah iz množice  $A \cap S^\circ$ .*

*Dokaz.* Dokaz trditve je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je algoritmičen; v njem bomo konstruirali družino krivulj, katere unija je povezana Rungejeva množica in vsebuje bazo homologije za  $S$ , na podoben način, kot poteka dokaz Leme 4.15. V drugem delu bomo s pomočjo Leme 4.16 našli konformno minimalno imerzijo oz. holomorfnó ničelno krivuljo, ki ustrezata zaključkom trditve.

Pišimo  $S = K \cup E$  in naj bo  $K = \cup_{i=1}^m K_i$ , kjer so  $K_i$  povezane komponente  $K$ . Rob vsake komponente  $K_i$  je unija končno mnogo zaprtih Jordanovih krivulj:  $\partial K_i = \cup_{j=1}^{m_i} \Gamma_{ij}$  za  $m_i \geq 1$ . Ker je  $S$  povezana, je  $E = \cup_{i=1}^n E_i$ , in so  $E_i$  gladke paroma disjunktne krivulje v  $S$ .

Naj bo  $\mathcal{C}$  Rungejeva baza homologije za  $S$ , konstruirana po Lemi 4.15. Ker je  $S$  po predpostavki Rungejeva podmnožica  $M$ , je družina  $\mathcal{C}$  tudi baza homologije za  $M$ .

Množici točk  $A$  iz predpostavke trditve dodajmo naslednje elemente:

- krajišča povezanih komponent  $E_i \subset E = \overline{S \setminus K}$ ;
- v vsaki komponenti  $K_i$  izberimo notranjo točko  $q_i \in K_i^\circ$ , imenovano *vozlišče*, in jo dodajmo v  $A$ ;
- točke  $a_{ij} \in \Gamma_{ij}$  (za vsak par  $(i, j)$  izberemo po eno tako točko), pri čemer točki  $a_{ij}$  in  $q_i$  povežemo s takim gladkim vloženim lokom  $A_{ij} \subset K_i^\circ \cup \{a_{ij}\}$ , da se nastali loki med seboj ter z elementi homološke baze  $\mathcal{C}$  sekajo kvečjemu v vozlišču  $q_i$ . (Opomnimo, da homološko bazo povezane komponente  $K_i$  po konstrukciji sestavlja končno mnogo Jordanovih krivulj v  $K_i^\circ$ , ki se dotikajo le v vozlišču  $q_i$ , njihova unija pa je Rungejeva v  $K_i$ .)

Sedaj konstruirajmo družino lokov in zaprtih krivulj  $\tilde{\mathcal{C}}$  v  $S$  v treh korakih.

1. Če krivulja  $C \in \mathcal{C}$  ne vsebuje elementov množice  $A$  razen točke  $q_1$ , potem krivuljo  $C$  dodamo v  $\tilde{\mathcal{C}}$ . Sicer obstaja končno točk iz  $A$ , ki ležijo na tej krivulji. Slednjo razdelimo na tako končno unijo lokov, da so točke iz preseka  $A \cap C$  skupna krajišča dveh zaporednih lokov in vse tako nastale loke dodamo v  $\tilde{\mathcal{C}}$ .

2. Če obstaja krivulja  $E_k \subset E$ , ki ni vsebovana v nobeni izmed krivulj iz prejšnje točke, potem naredimo naslednje: krajišče od  $E_k$ , ki je element  $K_i$  za nek  $i$ , povežemo z vozliščem  $q_i$  tako, da gremo najprej po  $bK_i$  do ustrezne točke  $a_{ij}$  in nato po loku  $A_{ij}$  do  $q_i$ . To ponovimo za obe krajišči  $E_k$  in novonastalo krivuljo (ki povezuje dve – morda isti – vozlišči) razdelimo na končno zaporedje lokov s krajišči v točkah iz  $A$  (kot v prejšnjem primeru). Vse te loke dodamo v  $\tilde{\mathcal{C}}$ .
3. Označimo množico  $A' = \{a \in A; a \text{ pripada vsaj eni krivulji iz } \tilde{\mathcal{C}}\}$ . Vsaka točka njenega komplementa, tj.  $a \in A \setminus A'$ , pripada neki komponenti  $K_i \subset K$ . Opazujemo sedaj take točke. Izberimo lok  $\Lambda_a \subset K_i$ , ki povezuje točko  $a$  z vozliščem  $q_i$  in se ne dotika niti nobene krivulje iz  $\tilde{\mathcal{C}}$  niti loka  $\Lambda_{a'}$  za  $a \neq a' \in A \setminus A'$ , razen v točki  $q_i$ . (Tak lok obstaja, saj je unija krivulj iz  $\tilde{\mathcal{C}}$ , konstruirane do sedaj, Rungejeva v  $S$ .) Vse nastale loke  $\Lambda_a$ ,  $a \in A \setminus A'$ , dodamo v  $\tilde{\mathcal{C}}$ .

Po konstrukciji je unija elementov družine  $\tilde{\mathcal{C}}$  povezana Rungejeva množica v  $S$ , ki vsebuje bazo homologije za  $S$ , torej tudi za  $M$ . Hkrati vsaka krivulja iz te družine vsebuje netrivialen lok, ki ni vsebovan v nobeni drugi krivulji iz družine.

Naj bo  $\mathcal{P}$  periodna preslikava k družini  $\tilde{\mathcal{C}}$ . Naj bo  $(x, f\theta) \in \text{GCM}^r(S, \mathbb{R}^n)$  dana posplošena konformna minimalna imerzija. Po Lemi 4.16 lahko preslikavo  $f \in \mathcal{A}^{r-1}(S, \mathbf{A}_*)$  v  $\mathcal{C}^{r-1}(S)$  aproksimiramo s polno holomorfnno preslikavo  $F \in \mathcal{O}(M, \mathbf{A}_*)$ , za katero je  $\mathcal{P}(F) = \mathcal{P}(f)$ ,  $F$  se z  $f$  ujema na  $A$  ter do danega končnega reda na  $A \cap S^\circ$ . Izberimo točko  $p_0 \in A$  in definirajmo preslikavo  $X: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  s predpisom

$$X(p) = x(p_0) + \Re \int_{p_0}^p F\theta, \quad p \in M. \quad (4.13)$$

Zaradi lastnosti  $\mathcal{P}(F) = \mathcal{P}(f)$  je preslikava  $X$  dobro definirana in po konstrukciji konformna minimalna imerzija. Polnost imerzije  $X$  sledi iz polnosti preslikave  $F$ . Nadalje je  $\text{Flux}_X = \text{Flux}_x$ . Res, ker  $\tilde{\mathcal{C}}$  vsebuje bazo homologije za  $S$ , ima  $F$  ničelne realne periode po krivuljah iz homološke baze. Skupaj z definicijo preslikave  $X$  in enakostjo periodnih preslikav za  $F$  in  $f$  sledi enakost pretokov.

Dejstvo, da  $X$  aproksimira  $x$  v  $\mathcal{C}^r(S)$  drži, saj za  $p \in S$  integral (4.13) računamo po poti med  $p_0 \in A \subset S$  in  $p \in S$ , ki v celoti leži v  $S$ .

V primeru posplošene ničelne krivulje postopamo analogno: Lema 4.16 da polno holomorfnno preslikavo  $F$  z lastnostmi kot prej, nato pa za izbrano fiksno točko  $p_0 \in A$  definiramo preslikavo  $Z: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  s predpisom

$$Z(p) = z(p_0) + \int_{p_0}^p F\theta, \quad p \in M, \quad (4.14)$$

ki je polna holomorfnna ničelna krivulja in aproksimira  $z$  v  $\mathcal{C}^r(S)$ .

Poglejmo še interpolacijski del. Če izberemo  $p \in A$ , potem integrala (4.13) in (4.14) računamo po uniji krivulj iz družine  $\tilde{\mathcal{C}}$ , ki povezuje točki  $p_0, p \in A$ . Enakosti  $X(p) = x(p)$  ter  $Z(p) = z(p)$  sledita iz predpisov preslikav ter enakosti periodnih preslikav funkcij. Ujemanje do danega končnega reda na množici  $A \cap S^\circ$  pa je posledica ujemanja funkcij  $F$  in  $f$  do danega reda na tej isti množici.  $\square$

#### 4.4.2 Konstrukcija poti s predpisanimi integrali

Za začetek definirajmo nekaj pojmov iz algebraične geometrije.

Naj bosta  $K$  polje in  $n \in \mathbb{N}$ . Tedaj množico  $\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n); a_1, \dots, a_n \in K\}$  imenujemo  $n$ -razsežni *afini prostor* nad poljem  $K$ . Kolobar polinomov v spremenljivkah  $x_1, \dots, x_n$  s koeficienti iz polja  $K$  označimo s  $K[x_1, \dots, x_n]$ , vrednost polinoma  $f \in K[x_1, \dots, x_n]$  v točki  $a = (a_1, \dots, a_n) \in K^n$  pa z  $f(a)$ . Nadalje je množica  $V(f_1, \dots, f_m) = \{x \in \mathbb{A}_K^n; f_i(x) = 0, f_i \in K[x] \text{ za vse } i = 1, \dots, m\} \subset \mathbb{A}_K^n$  *afina raznoterost*.

V primeru, ko je  $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ , funkcije  $f_1, \dots, f_m$  pa so holomorfní polinomi, množici

$$V(f_1, \dots, f_m) = \{z \in \mathbb{C}^n; f_1(z) = \dots = f_m(z) = 0\} \quad (4.15)$$

pravimo *afina algebraična raznoterost*, ki je hkrati zaprta kompleksna podraznoterost raznoterosti  $\mathbb{C}^n$ . V nadaljevanju se bomo ukvarjali z le-temi.

Če afine algebraične raznoterosti  $A$  ne moremo zapisati kot unijo dveh neničelnih afinih algebraičnih raznoterosti, potem  $A$  imenujemo *nerazcepna raznoterost*. Sicer je  $A$  *razcepna*.

Pogosto nas zanimajo le regularne ali singularne točke. Zato uvedemo posebni oznaki: množico regularnih točk raznoterosti  $A$  označimo z  $A_{reg}$ , množico singularnih točk raznoterosti  $A$  pa z  $A_{sing}$ .

Pravimo, da je afina algebraična raznoterost, ki je podraznoterost v  $\mathbb{C}^n$ , neizrojena, kadar ni vsebovana v nobeni afini hiperravnini v  $\mathbb{C}^n$ .

**Lema 4.18.** *Naj bo  $A$  nerazcepna neizrojena algebraična podraznoterost v  $\mathbb{C}^n$ ,  $\eta \in \mathbb{C}^n$  izbran vektor in  $\Omega \subset \mathbb{C}^n$  povezana domena, ki vsebuje 0 in  $\eta$ . Naj bosta dani zvezni preslikavi  $f_0: [0, 1] \rightarrow A_{reg}$  in  $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}_*$ . Potem za  $\tau \in [0, 1]$  obstaja taka homotopija  $f_\tau: [0, 1] \rightarrow A_{reg}$  s fiksnima krajiščema, da je  $f_0$  dana preslikava, preslikava  $f = f_1$  je gladka in neravna v okolici  $f(0)$ , ter velja*

$$\int_0^1 f(s)g(s)ds = \eta \quad \text{in} \quad \int_0^t f(s)g(s)ds \in \Omega \quad \text{za vse } t \in [0, 1]. \quad (4.16)$$

Natančneje, za poljuben par točk v  $A_{reg}$  obstaja gladka pot  $f: [0, 1] \rightarrow A_{reg}$  med njima, ki zadošča pogoju (4.16).

Navedli bomo le osnovne ideje dokaza leme. Popoln dokaz, ki se nahaja v [...], posnema dokaz leme Gromova o konveksni integraciji.

*Dokaz.* Dokaz poteka v štirih korakih.

1. korak: Pokažemo, da zadostuje rešiti bližnji problem, kjer pogoja (4.16) nadomestimo s pogojema

$$\left| \int_0^1 f(s)g(s)ds - \eta \right| < \varepsilon \quad \text{in} \quad \int_0^t f(s)g(s)ds \in \Omega \quad \text{za vse } t \in [0, 1] \quad (4.17)$$

za  $\varepsilon > 0$ . Pišemo  $[0, 1] = [0, c] \cup [c, 1]$  za  $c \in (0, 1)$ . Podobno kot v dokazu Leme 4.10 poiščemo periodno dominantni sprej preslikave  $f_0$  z nosilcem na intervalu  $(0, c)$ .

Sledi, da je dovolj najti homotopijo  $f_\tau: [0, 1] \rightarrow A_{reg}$ , ki je fiksna na  $[0, c]$ , pot  $f = f_1$  pa zadošča pogoju (4.17). Napake  $\varepsilon$  se znebimo tako, da  $f$  nadomestimo s potjo  $\Phi_f(\zeta, \cdot): [0, 1] \rightarrow A_{reg}$ , kjer je sprej  $\Phi_f$  definiran analogno spreju, prirejenemu  $f_0$ , in izberemo ustrezen parameter  $\zeta \in \mathbb{B}^n \subset \mathbb{C}^n$ .

2. korak: Problem poenostavimo na problem, kjer  $\Omega$  vsebuje  $\{s\eta; s \in [0, 1]\}$ . Izberemo poligonsko pot  $\Gamma = \cup_{j=1}^m \Gamma_j \subset \Omega$  med 0 in  $\eta$ , kjer za  $p_{j-1} \in \Omega$  in  $\eta_j \in \mathbb{C}^n$  pišemo  $\Gamma_j = \{p_{j-1} + s\eta_j; s \in [0, 1]\}$ . Velja  $\eta = \sum_{j=1}^m \eta_j$ . Tedaj iščemo deformacijo  $f(s)$  za  $f_0(s)$ , ki je fiksna v okolici točk  $s = 0, 1, \dots, m$  in zanjo velja

$$\left| \int_{j-1}^j f(s)g(s)ds - \eta_j \right| < \frac{\varepsilon}{m} \quad \text{in} \quad \int_{j-1}^t f(s)g(s)ds \in \Omega_j \quad \text{za vse } t \in [j-1, j],$$

kjer je  $\Omega_j$  okolica za  $\{s\eta_j; s \in [0, 1]\}$ .

3. korak: Ohranimo redukcijo iz 2. koraka in rešimo problem za  $0 \neq g = \text{konst.}$

4. korak: Rešimo splošen primer.

Izberemo števili  $\sigma > 0$  in  $N \in \mathbb{N}$ , ter interval  $[0, 1]$  razdelimo na unijo podintervalov:  $[0, 1] = \cup_{j=1}^N I_j = \cup_{j=1}^N [\frac{j-1}{N}, \frac{j}{N}]$ . Pri tem zahtevamo, da na vsakem podintervalu  $I_j$  obstaja taka neničelna konstantna funkcija  $g_j$ , da na njem velja  $|g - g_j| < \sigma$ . Postopek iz 3. koraka ponovimo na vsakem podintervalu  $I_j$  – zagotoviti moramo pogoju (4.17), pri čemer  $g$  nadomestimo z  $g_j$  na ustreznih intervalih  $I_j$ . Velja

$$\left| \int_{I_j} f(s)g(s)ds - \int_{I_j} f(s)g_j(s)ds \right| \leq \frac{R}{N} \cdot \max_{I_j} |g - g_j| < \frac{R}{N}\sigma,$$

saj je  $|I_j| = 1/N$  za vse  $j$  in  $|f| \leq R$  za nek  $R > 0$ . Vsota napak po vseh podintervalih je torej navzgor omejena z  $R\sigma$ . Ta bo poljubno majhna za izbor poljubno majhnega  $\sigma > 0$ . Ker znamo rešiti bližnji problem (4.17) v splošnem primeru, po 1. koraku lema sledi.  $\square$

#### 4.4.3 Morsejeva teorija in ročajniki

V tem razdelku bomo navedli nekaj osnovnih rezultatov Morsejeve teorije. Pokazali bomo, kako gladke mnogoterosti (v našem – posebnem – primeru ploskve) predstavimo kot ročajnike. Znanje tega razdelka nam bo koristilo pri dokazovanju glavnega izreka o aproksimaciji in interpolaciji minimalnih ploskev.

Naj bo  $U \subset \mathbb{R}^n$  domena s koordinatami  $x = (x_1, \dots, x_n)$  in  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  funkcija razreda  $\mathcal{C}^2$ . Spomnimo se, da je točka  $x \in U$  *kritična točka* funkcije  $f$ , če je  $\nabla f(x) = 0$ . Točka, ki ni kritična, je *regularna*. Slike kritičnih točk imenujemo *kritične vrednosti*, medtem ko so vse preostala realna števila *regularne vrednosti* funkcije  $f$ .

*Hessejeva forma* funkcije  $f$  v točki  $x \in U$  je simetrična kvadratna forma  $\text{Hess}_f(x)$ , pripadajoča Hessejeva matrika  $H_f(x)$  pa sestoji iz drugih odvodov funkcije  $f$  v točki  $x$ . Velja  $H_f(x) = D(\nabla f)(x)$ , kjer  $D$  označuje Jacobijevo matriko.

**Definicija 4.19.** Naj bo  $x \in U$  kritična točka funkcije  $f$ . Kadar ima pripadajoča Hessejeva matrika  $H_f(x)$  maksimalen rang, točki  $x$  pravimo *Morsejeva točka*. Slednji pogoj je ekvivalenten trditvi, da je Hessejeva forma funkcije  $f$  v točki  $x$  neizrojena.



Število negativnih lastnih vrednosti Hessejeve matrike,  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ , je *Morsejev indeks* kritične točke.

Funkcija, katere vsaka kritična točka je tudi Morsejeva, se imenuje *Morsejeva funkcija*.

Kritične točke funkcije  $f$  dobimo z reševanjem enačbe  $\nabla f(x) = 0$ . Ker je Hessejeva matrika enaka Jacobijevi matriki gradienta funkcije, po izreku o inverzni preslikavi vidimo, da je vsaka kritična točka izolirana. Množica kritičnih točk funkcije  $f$ ,  $\text{Crit}(f) = \{x \in U; \nabla f(x) = 0\}$ , je zaprta diskretna podmnožica v  $U$ .

**Definicija 4.20.** Naj bosta  $M$  mnogoterost in  $f: M \rightarrow [0, \infty)$  zvezna funkcija. Če je za vsako realno število  $c > 0$  množica  $M_c = \{p \in M; f(p) \leq c\}$  kompaktna, tedaj  $f$  imenujemo *funkcija izčrpanja* mnogoterosti  $M$ .

Za nas bodo pomembne Morsejeve funkcije izčrpanja na Riemannovih ploskvah. Njihov obstoj opisuje naslednja trditev.

**Trditev 4.21.** Naj bo  $K$  kompaktna  $\mathcal{O}(M)$ -konveksna podmnožica odprte Riemannove ploskve  $M$  in  $U \subset M$  odprta množica, ki vsebuje  $K$ . Tedaj na  $M$  obstaja strogo subharmonična Morsejeva funkcija izčrpanja  $\rho$ , za katero velja

$$K \subset \{\rho < 0\} \subset \{\rho \leq 0\} \subset U.$$

Po zgornji trditvi lahko mnogoterost  $M$  konstruiramo s pomočjo njene funkcije izčrpanja  $\rho$ , natančneje, podnivojnicam  $\{\rho \leq c\}$  ob prehodu kritičnih točk funkcije izčrpanja zaporedoma dodajamo t. i. ročaje. V tem primeru pravimo, da mnogoterost predstavimo kot *ročajnik*. Pomemben izrek Morsejeve teorije, ki ga bomo navedli v nadaljevanju, ta postopek natančno opisuje. Pred tem pa definirajmo ustrezne pojme.

Vzemimo gladko mnogoterost  $M$  z robom  $bM$  razsežnosti  $\dim M = m \in \mathbb{N}$ . Naj bo  $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $m = k + q$  in naj  $\mathbb{D}^k \subset \mathbb{R}^k$  označuje zaprto  $k$ -razsežno enotsko kroglo. Kartezičnemu produktu

$$H = H^{k,q} = \mathbb{D}^k \times \mathbb{D}^q$$

pravimo *standardni ročaj* indeksa  $k$ . Podmnožico  $E = \mathbb{D}^k \times \{0\}^q \subset H$  imenujemo *stržen* ročaja, podmnožico  $F = b\mathbb{D}^k \times \mathbb{D}^q = \mathbb{S}^{k-1} \times \mathbb{D}^q \subset H$  pa njegova *priključna množica*.

Definirajmo preslikavo

$$\phi: \mathbb{S}^{k-1} \times \mathbb{D}^q \rightarrow bM$$

med priključno množico in robom mnogoterosti, ki naj bo gladek difeomorfizem na sliko. Vzemimo disjunktno unijo mnogoterosti in standardnega ročaja,  $M \sqcup H$ , ter točke priključne množice  $F$  identificirajmo s svojimi slikami. Preslikava  $\phi$  je lepilna preslikava pri lepljenju ročaja indeksa  $k$  na mnogoterost  $M$ . Tako nastalo množico

$$\tilde{M} = M \sqcup_{\phi} H$$

imenujemo *ročajnik*. Z “glajenjem” vzdolž množice  $\phi(\mathbb{S}^{k-1} \times \mathbb{S}^{q-1})$  dosežemo, da ročajnik postane gladka mnogoterost z robom. V nadaljevanju bomo predpostavili, da so ročajniki takšni.

**Izrek 4.22.** Naj bo  $M$  gladka mnogoterost razsežnosti  $\dim M = m$ . Naj bo  $\rho: M \rightarrow \mathbb{R}$  gladka Morsejeva funkcija, števili  $a < b$  njeni regularni vrednosti in

$$M_{a,b} = \{x \in M; a \leq \rho(x) \leq b\}$$

kompaktna množica.

1. Recimo, da množica  $M_{a,b}$  ne vsebuje nobene kritične točke Morsejeve funkcije  $\rho$ . Potem so za vse vrednosti  $t \in [a, b]$  podnivojnice  $M_t = \{x \in M; \rho(x) \leq t\}$  paroma difeomorfne.
2. Kadar množica  $M_{a,b}$  vsebuje natanko eno kritično točko Morsejeve funkcije  $\rho$ , ta pa ima Morsejev indeks enak  $k$ , tedaj je podnivojnica  $M_b$  difeomorfna ročajniku iz podnivojnice  $M_a$  in ročaja indeksa  $k$ . Če je  $k = 0$ , je  $M_b$  difeomorfna disjunktni uniji  $M_a$  in kompaktne  $m$ -razsežne krogle  $\mathbb{D}^m$ .

Osredotočimo se na orientabilne ploskve in s pomočjo Izreka 4.22 obravnavajmo njihovo ročajno strukturo. Izberimo gladko orientabilno ploskev  $M$  in pripadajočo gladko Morsejevo funkcijo izčrpanja  $\rho: M \rightarrow [0, \infty)$ . Če je  $c$  regularna vrednost funkcije izčrpanja, potem je podnivojnica  $M_c = \{\rho \leq c\}$  kompaktna ploskev, njen rob  $bM_c = \{\rho = c\}$  pa končna unija gladkih Jordanovih krivulj.

Po prvi točki Izreka 4.22 je za taki regularni vrednosti  $a < b$ , da množica  $M_{a,b} = \{x \in M; a \leq \rho(x) \leq b\}$  ne vsebuje nobene kritične točke funkcije  $\rho$ , slednja množica končna unija kompaktnih kolobarjev. Število kolobarjev je enako številu povezanih komponent roba  $bM_a$ .

Pri prehodu kritičnih točk funkcije  $\rho$  pa podnivojnicam dodajamo ročaje ustreznih indeksov, kar nam pove druga točka Izreka 4.22.

V kritični točki indeksa 0, ki je lokalni minimum, podnivojnici disjunktno dodamo novo povezano komponento, kompakten disk.

Če je  $p \in M$  kritična točka indeksa 1, ki naj bo brez škode za splošnost edina kritična točka na podnivojnici  $\{\rho = \rho(p)\}$ , izberimo bližnji vrednosti  $a < \rho(p) < b$  tako, da je točka  $p$  edina kritična točka na množici  $M_{a,b}$ . Podnivojnica  $M_b$  nastane tako, da na  $M_a$  ustrezno prilepimo ročaj indeksa 1, to je  $H = [-1, +1] \times [-1, +1]$ . Pri tem komponenti robu ročaja,  $\{-1\} \times [-1, +1]$  in  $\{+1\} \times [-1, +1]$ , difeomorfno zlepimo z disjunktnima lokoma  $I_{-1}, I_{+1} \subset bM_a$ .

- (a) Če loka  $I_{-1}, I_{+1}$  pripadata isti povezani komponenti  $bM_a$ , za rodova velja  $\text{gen}(M_a) = \text{gen}(M_b)$ , število povezanih komponent nivojnice  $bM_b$  pa je za ena več od števila povezanih komponent nivojnice  $bM_a$ .
- (b) Če loka  $I_{-1}, I_{+1}$  pripadata isti povezani komponenti  $M_a$ , a različnima povezanima komponentama  $bM_a$ , je situacija naslednja. Množica  $M_{a,b}$  je unija končno mnogo disjunktnih kolobarjev in *para hlač*, ki je kompaktna ploskev topološkega rodu 1, katere rob sestoji iz treh povezanih komponent. Velja  $\text{gen}(M_a) + 1 = \text{gen}(M_b)$ , število povezanih komponent roba  $bM_b$  pa je za ena manj od števila povezanih komponent roba  $bM_a$ .
- (c) Če loka  $I_{-1}, I_{+1}$  pripadata različnima povezanima komponentama podnivojnice  $M_a$ , je  $\text{gen}(M_a) = \text{gen}(M_b)$ , rob  $bM_b$  pa ima eno povezano komponento manj od robu  $bM_a$ .

V kritični točki maksimalnega indeksa (v našem primeru ploskve je ta enak 2), ki je lokalni maksimum, na podnivojnico nalepimo disk maksimalne razsežnosti (v našem primeru 2).

**Opomba 4.23** (Rod ploskve). Znano je, da je povezana kompaktna orientabilna ploskev  $M$  brez roba homeomorfna bodisi sferi  $\mathbb{S}^2$  bodisi vsoti  $g$  torusov  $\mathbb{T}^2 \# \dots \# \mathbb{T}^2$  za enolično število  $g \in \mathbb{N}$ . Število  $g$  imenujemo *rod* in označimo z  $\text{gen}(M)$ , pri tem pa definiramo še  $\text{gen}(\mathbb{S}^2) = 0$ . Podobna klasifikacija velja za odprte orientabilne ploskve.

#### 4.4.4 Glavni izrek

Sedaj bomo navedli in dokazali glavni rezultat, to je izrek o aproksimaciji in interpolaciji konformnih minimalnih imerzij iz odprtih Riemannovih ploskev v Evklidski prostor  $\mathbb{R}^n$  razsežnosti vsaj 3. Izrek združuje aproksimacijo Mergelyanovega tipa z Weierstrassovo interpolacijo, kot jo v primeru holomorfnih funkcij podajata Izreka 2.24 in 2.26. Analogen rezultat velja za holomorfne ničelne krivulje.

**Izrek 4.24.** *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev,  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma na  $M$ ,  $n \geq 3$  in  $r \geq 1$ . Naj bo  $S$  dopustna Rungejeva množica v  $M$  in  $\Lambda \subset M$  zaprta diskretna podmnožica. Naj bo  $x: S \rightarrow \mathbb{R}^n$  posplošena konformna minimalna imerzija razreda  $C^r(S, \mathbb{R}^n)$ , ki je konformna minimalna imerzija v okolici vsake točke iz  $\Lambda$ .*

*Za izbrane  $\varepsilon > 0$ , preslikavo  $k: \Lambda \rightarrow \mathbb{N}$  in homomorfizem grup  $\mathfrak{p}: H_1(M, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\mathfrak{p}|_{H_1(S, \mathbb{Z})} = \text{Flux}_x$  obstaja konformna minimalna imerzija  $\tilde{x}: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ , za katero velja:*

1.  $\|\tilde{x} - x\|_{C^r(S)} < \varepsilon$ ;
2. razlika  $\tilde{x} - x$  je ničelna do reda  $k(p)$  v vsaki točki  $p \in \Lambda$ ;
3.  $\text{Flux}_{\tilde{x}} = \mathfrak{p}$  na  $H_1(M, \mathbb{Z})$ ;
4. če je  $n \geq 5$  in je  $x: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$  injektivna preslikava, potem je  $\tilde{x}$  injektivna imerzija;
5. če je  $n = 4$  in ima  $x$  enostavne dvojne točke na množici  $\Lambda$ , potem je  $\tilde{x}$  imerzija z enostavnimi dvojnimi točkami na  $\Lambda$ .

**Opomba 4.25.** Predpostavka iz 5. točke izreka, da ima  $x$  enostavne dvojne točke na množici  $\Lambda$ , pomeni naslednje: ne obstajajo tri različne točke v  $\Lambda$ , ki bi se s preslikavo  $x$  slikale v isto točko v  $\mathbb{R}^4$ , ter, če za različni točki  $p, q \in \Lambda$  velja  $x(p) = x(q)$ , potem je  $dx_p(T_p M) \cap dx_q(T_q M) = \{0\} \subset T_{x(p)}\mathbb{R}^4$ .

*Dokaz.* Ideja dokaza je indukcija, kjer na vsakem koraku konstruiramo konformno minimalno imerzijo, ki dano preslikavo  $x$  aproksimira in interpolira na večji množici, začeniši z dopustno množico  $S$ , pri tem pa uporabljamo Morsejevo teorijo. Sklicujemo se na izrek o splošni legi za kompaktne omejene Riemannove ploskve [...], ter rezultat o konstrukciji poti s predpisanimi integrali in nekritični primer izreka, ki smo ju obravnavali v preteklih razdelkih.

Izberimo tako število  $\varepsilon_0 > 0$ , da je  $2\varepsilon_0 < \varepsilon$ . Izberimo okolico  $U \subset M$  množice  $S$ , za katero velja  $H_1(S, \mathbb{Z}) = H_1(U, \mathbb{Z})$  in  $\Lambda \cap U \subset S$ . Po Trditvi 4.17 tedaj obstaja polna konformna minimalna imerzija  $x^0: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ , ki zadošča:  $\|x^0 - x\|_{C^r(S)} < \varepsilon_0$ , preslikavi  $x^0$  in  $x$  se ujemata do reda  $k(p)$  v vsaki točki  $p \in \Lambda \cap S$  ter  $\text{Flux}_{x^0} = \text{Flux}_x$  na  $H_1(S, \mathbb{Z})$ . Izrek [...] zagotavlja, da preslikava  $x^0$  zadošča tudi pogojem 4. in 5. v našem izreku.

Trditev 4.21 pove, da obstaja strogo subharmonična Morsejeva funkcija izčrpanja  $\rho: M \rightarrow \mathbb{R}$ , za katero je

$$S \subset \{\rho < 0\} \subset \{\rho \leq 0\} \subset U.$$

Funkcijo  $\rho$  lahko izberemo tako, da je  $c_0 = 0$  njena regularna vrednost, nivojnice  $\{\rho = c\}$  za  $c > 0$  pa vsebujejo kvečjemu eno kritično točko funkcije  $\rho$  ali kvečjemu eno točko množice  $\Lambda$ , vendar ne obeh hkrati. To lahko zagotovimo zato, ker so kritične točke Morsejeve funkcije izčrpanja izolirane in je  $\Lambda$  po predpostavki zaprta diskretna množica.

Označimo z  $M_0$  kompaktno množico  $M_0 = \{\rho \leq 0\}$ . Ker je  $M_0 \subset U$  in  $\text{Flux}_{x^0} = \text{Flux}_x$  na  $H_1(S, \mathbb{Z}) = H_1(U, \mathbb{Z})$ , sta pretoka enaka tudi na  $H_1(M_0, \mathbb{Z})$ .

Izberimo strogo naraščajoče zaporedje  $\{c_i\}_i \subset \mathbb{R}$  z začetnim členom  $c_0 = 0$  in  $\lim_{i \rightarrow \infty} c_i = +\infty$ . Dodatno naj za vse  $i \in \mathbb{N}$  velja:

- $c_i$  je regularna vrednost funkcije  $\rho$ ;
- $\{\rho = c_i\} \cap \Lambda = \emptyset$ ;
- množica  $A_i = M_i^\circ \setminus M_{i-1} = \{c_{i-1} < \rho < c_i\}$  vsebuje kvečjemu eno kritično točko funkcije  $\rho$  ali kvečjemu eno točko iz množice  $\Lambda$ , vendar ne obeh hkrati.

Iskano imerzijo  $\tilde{x}$  bomo dobili na naslednji način. Induktivno bomo konstruirali zaporedje konformnih minimalnih imerzij  $\{x^i\}_i$ ,  $x^i: M_i = \{\rho \leq c_i\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  (natančneje,  $x^i$  je definirana v okolici kompakta  $M_i$ ), ter strogo padajoče zaporedje  $\{\varepsilon_i\}_i \subset \mathbb{R}_{>0}$ . Pri tem bo za vsak indeks  $i \in \mathbb{N}$  veljalo naslednje:

- (i)  $\|x^i - x^{i-1}\|_{C^r(M_{i-1})} < \varepsilon_{i-1}$ ;
- (ii) preslikavi  $x^i$  in  $x$  se ujemata do reda  $k(p)$  za vse  $p \in \Lambda \cap M_i$ ;
- (iii)  $\text{Flux}_{x^i} = \mathbf{p}$  na  $H_1(M_i, \mathbb{Z})$ ;
- (iv) če je  $n \geq 5$  in  $x: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$  injektivna preslikava, potem je  $x^i$  injektivna;
- (v) če je  $n = 4$  in ima  $x$  enostavne dvojne točke na  $\Lambda$ , potem ima  $x^i$  enostavne dvojne točke;
- (vi) velja  $\varepsilon_i > 0$  in  $2\varepsilon_i < \varepsilon_{i-1}$ . Vsaka preslikava  $y: M_i \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r(M_i)$ , za katero je  $\|y - x^i\|_{C^r(M_i)} < 2\varepsilon_i$ , je v primeru (iv) polna injektivna imerzija ter polna imerzija z enostavnimi dvojnimi točkami v primeru (v).

Preslikavo  $\tilde{x}$  bomo definirali kot limito  $\tilde{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} x^i: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Po konstrukciji je to konformna minimalna imerzija, ki zadošča našemu izreku.

Baza indukcije sta  $\varepsilon_0$  in  $x^0: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ , za katera že vemo, da izpolnjujeta zahteve (i)–(vi).

Predpostavimo, da smo v  $i$ -tem koraku za nek  $i \in \mathbb{N}$  in smo že našli  $(\varepsilon_j, x^j)$  za  $j \in \{0, 1, \dots, i-1\}$ . V indukcijskem koraku konstruirajmo preslikavo  $x^i$  ter poiščimo ustrezen  $\varepsilon_i$ . Obravnavali bomo tri primere glede na lastnosti množice  $A_i$ .

1. *PRIMER*:  $A_i$  ne vsebuje niti kritične točke funkcije  $\rho$  niti točke iz  $\Lambda$ .

Vemo, da je tedaj  $A_i$  končna unija kolobarjev. Trditev 4.17 pove, da obstaja polna konformna minimalna imerzija  $x^i: M_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ , ki zadošča točkam (i)–(iii). Po goja (iv), (v) sledita iz Izreka [...]. Nadalje, število  $\varepsilon_i > 0$  izberemo ustrezno majhno, da zadostimo še točki (vi).

2. *PRIMER*:  $A_i$  vsebuje točko  $p \in \Lambda$ .

Vemo, da tedaj  $A_i$  ne vsebuje kritične točke funkcije  $\rho$  in je  $A_i \cap \Lambda = \{p\}$ . Iz prvega sledi, da je množica  $A_i$  končna unija kolobarjev.

Po prvem delu dodatka k Izreku [...] velja naslednje: če je  $x: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$  injektivna, potem z deformacijo preslikave  $x^{i-1}$  na  $M_{i-1}$  lahko dosežemo, da  $x(p) \notin x^{i-1}(M_{i-1})$ , hkrati pa ohranimo lastnosti (i)–(vi).

Naj bo  $D_p \subset A_i$  tak zaprt disk okrog točke  $p \in A_i$ , da je zožitev  $x|_{D_p}$  konformna minimalna imerzija. Izberimo točki  $q \in bM_{i-1}$  in  $q' \in bD_p$ , ter ju povežimo z gladkim vloženim lokom  $E \subset \{q, q'\} \cup (A_i \setminus D_p)$ , ki množici  $bM_{i-1}$  in  $bD_p$  seka transversalno. Lok  $E$  usmerimo od  $q$  do  $q'$  in ga parametrizirajmo s potjo  $\gamma: [0, 1] \rightarrow E$  z  $\gamma(0) = q$ ,  $\gamma(1) = q'$ .

Definirajmo množico  $S_i = M_{i-1} \cup E \cup D_p$ . Po konstrukciji je Rungejeva dopustna množica v  $M$ . Nadalje je funkcija

$$f^{i-1} = 2\partial x^{i-1}/\theta: M_{i-1} \rightarrow \mathbf{A}_*$$

holomorfna v okolici  $M_{i-1}$ . Res,  $\theta$  je po predpostavki holomorfna 1-forma in  $x^{i-1}$  konformna minimalna imerzija po indukcijski predpostavki. Točki  $q, q'$  sta regularni, zato lahko po Lemi 4.18 funkcijo  $f^{i-1}$  gladko razširimo na  $E \cup D_p$  na naslednji način:

- $f^{i-1}|_{D_p} = 2\partial x/\theta: D_p \rightarrow \mathbf{A}_*$  in
- $\Re \int_E f^{i-1}\theta = \Re \int_0^1 f^{i-1}(\gamma(s))\theta(\gamma(s), \gamma'(s))ds = x(q') - x^{i-1}(q)$ .

Nato razširimo še preslikavo  $x^{i-1}$  na  $S_i$  takole:

- $x^{i-1}|_{D_p} = x|_{D_p}$  in
- $x^{i-1}(\gamma(t)) = x^{i-1}(q) + \Re \int_0^t f^{i-1}(\gamma(s))\theta(\gamma(s), \gamma'(s))ds$  za  $t \in [0, 1]$ .

Po konstrukciji je par  $(x^{i-1}, f^{i-1}\theta) \in \text{GCM}(S_i, \mathbb{R}^n)$ . Iz definicije množice  $S_i$  in izbora  $A_i$  sledi  $H_1(M_{i-1}, \mathbb{Z}) = H_1(S_i, \mathbb{Z}) = H_1(M_i, \mathbb{Z})$ . Sedaj uporabimo Trditev 4.17 in Izrek [...], da dobimo polno konformno minimalno imerzijo  $x^i: M_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ , ki zadošča točkam (i)–(v). Za ustrezen izbor  $\varepsilon_i > 0$  zadostimo še točki (vi).

3. *PRIMER:  $A_i$  vsebuje kritično točko  $p$  funkcije  $\rho$ .*

Vemo, da je  $p$  edina kritična točka na  $A_i$  in  $A_i \cap \Lambda = \emptyset$ . Po izboru funkcije izčrpanja  $\rho$  je  $p$  Morsejeva točka. Njen Morsejev indeks je bodisi enak 0 ( $p$  je lokalni minimum) bodisi 1 ( $p$  je sedlo). Indeks ne more biti enak 2, saj je  $\rho$  subharmonična funkcija, ki pa ne premore lokalnega maksimuma. Zanima nas sprememba topologije podnivojnic  $\{\rho \leq c\}$  za  $c > 0$ , ko prečkamo kritično točko  $p$ , to je za  $c = \rho(p)$ . Ločeno si oglejmo primere glede na Morsejev indeks točke  $p$ .

3.1: *Morsejev indeks točke  $p$  je enak 0.*

Ko prečkamo kritično točko  $p$ , spremembo topologije opišemo z dodajanjem povezane komponente, natančneje,  $M_{i-1}$  disjunktno dodamo disk. Naj bo  $D \subset A_i$  zaprt disk okrog točke  $p$ . Unija  $S_i = M_{i-1} \cup D$  je dopustna množica, za katero velja  $H_1(S_i, \mathbb{Z}) = H_1(M_i, \mathbb{Z})$ . Preslikavo  $x^{i-1}$  razširimo na  $S_i$  tako, da za  $x^{i-1}|_D$  izberemo poljubno konformno minimalno imerzijo. Spet uporabimo Trditev 4.17 in Izrek [...], da dobimo preslikavo  $x^i: M_i \rightarrow \mathbb{R}^n$  in ustrezno izberemo  $\varepsilon_i$ .

Poglejmo si še primer, ko je Morsejev indeks točke  $p$  enak 1. Ob prečkanju te točke množici  $M_{i-1}$  dodamo gladek vložen lok  $E \subset A_i \cup bM_{i-1}$  s krajiščema v točkah  $q_0, q_1 \in bM_{i-1}$ , ki sta edini točki na  $bM_{i-1} \cap E$ , in  $E$  seka  $bM_{i-1}$  transversalno. Lok  $E$  usmerimo od  $q_0$  do  $q_1$ . Definiramo  $S_i = M_{i-1} \cup E$ , ki je po konstrukciji dopustna množica in zanjo velja  $H_1(S_i, \mathbb{Z}) = H_1(M_i, \mathbb{Z})$ . Obravnavajmo dve situaciji.

3.2.1 *Morsejev indeks točke  $p$  je enak 1 in krajišči loka  $E$  pripadata isti povezani komponenti množice  $M_{i-1}$ .*

Točki  $q_0$  in  $q_1$  povežimo z gladkim usmerjenim vloženim lokom  $E' \subset M_{i-1}$ . Unija lokov  $C = E \cup E'$  je zaprta Jordanova krivulja, ki pripada bazi homologije za  $S_i$ . Nadaljujemo kot v 2. primeru. Funkcija  $f^{i-1} = 2\partial x^{i-1}/\theta: M_{i-1} \rightarrow \mathbf{A}_*$  je holomorfnna v okolici  $M_{i-1}$ . Gladko jo razširimo na  $E$  tako, da velja

$$\Re \int_C f^{i-1} \theta = 0, \quad \Im \int_C f^{i-1} \theta = \mathbf{p}(C),$$

kjer upoštevamo dejstvo, da sta  $q_0, q_1$  regularni točki in uporabimo Lemo 4.18. Nato  $x^{i-1}$  razširimo na  $S_i$  kot v 2. primeru, kar nam da  $(x^{i-1}, f^{i-1}\theta) \in \text{GCMI}(S_i, \mathbb{R}^n)$ .

Po indukcijski predpostavki je  $\text{Flux}_{x^{i-1}} = \mathbf{p}$  na  $H_1(M_{i-1}, \mathbb{Z})$  in po zgornjem  $\text{Flux}_{x^{i-1}}(C) = \mathbf{p}(C)$ , zato velja  $\text{Flux}_{x^{i-1}} = \mathbf{p}$  na  $H_1(S_i, \mathbb{Z})$ . Spet uporabimo Trditve 4.17 in Izrek [...], ter zaključimo kot v prejšnjih primerih.

3.2.2 *Morsejev indeks točke  $p$  je enak 1 in krajišči loka  $E$  pripadata različnim povezanim komponentam množice  $M_{i-1}$ .*

Ko množici  $M_{i-1}$  dodamo lok  $E$ , se v homološki bazi ne pojavi nobena nova krivulja;  $H_1(M_{i-1}, \mathbb{Z}) = H_1(S_i, \mathbb{Z})$ . Homolorfno funkcijo  $f^{i-1}: M_{i-1} \rightarrow \mathbf{A}_*$  gladko razširimo na  $E$  tako, da je

$$\Re \int_E f^{i-1} \theta = x^{i-1}(q_1) - x^{i-1}(q_0),$$

kjer zopet uporabimo regularnost točk  $q_0, q_1$  in Lemo 4.18. Nato kot prej preslikavo  $x^{i-1}$  razširimo na množico  $S_i$ , dobimo posplošeno konformno minimalno imerzijo

$(x^{i-1}, f^{i-1}\theta)$ , uporabimo Trditev 4.17 in Izrek [...], ter končamo po enakem postopku kot v dosedanjih primerih.

Obravnavali smo vse možne situacije in v vsaki našli ustrezen par  $(x^i, \varepsilon_i)$ . Indukcija je s tem zaključena. Od tod po razmisleku zgoraj sledi, da je preslikava  $\tilde{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} x^i: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  iskana konformna minimalna imerzija, kar zaključni dokaz izreka.  $\square$

**Izrek 4.26.** *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev,  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma na  $M$ ,  $n \geq 3$  in  $r \geq 1$ . Naj bo  $S$  dopustna Rungejeva množica v  $M$  in  $\Lambda \subset M$  zaprta diskretna podmnožica. Naj bo  $z: S \rightarrow \mathbb{C}^n$  posplošena ničelna krivulja razreda  $\mathcal{A}^r(S, \mathbb{C}^n)$ , ki je holomorfná ničelna krivulja v okolici vsake točke iz  $\Lambda$ .*

*Za izbrana  $\varepsilon > 0$  in preslikavo  $k: \Lambda \rightarrow \mathbb{N}$  obstaja holomorfná ničelna krivulja  $\tilde{z}: M \rightarrow \mathbb{C}^n$ , za katero velja:*

1.  $\|\tilde{z} - z\|_{C^r(S)} < \varepsilon$ ;
2. razlika  $\tilde{z} - z$  je ničelna do reda  $k(p)$  v vsaki točki  $p \in \Lambda$ ;
3. če je  $z: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^n$  injektivna preslikava, potem je  $\tilde{z}$  injektivna imerzija.

*Dokaz.* Dokaz je analogen dokazu glavnega izreka za posplošene konformne minimalne imerzije. Razlika je le ta, da so namesto imerzij preslikave  $z^i: M_i \rightarrow \mathbb{C}^n$  holomorfné ničelne krivulje, integrali preslikav  $f^{i-1}\theta$  pa upoštevajo tako realen kot imaginaren del.  $\square$

**Opomba 4.27.** Opazimo, da je v formulaciji Izrekov 4.24 in 4.26 razlika glede pogoja o pretoku. To je smiselno; ko govorimo o posplošenih holomorfnih ničelnih krivuljah, je pretok ničeln, tj. homomorfizem grup  $\mathfrak{p}: H_1(M, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{R}^n$  v Izreku 4.24 je v tem primeru ničeln homomorfizem.

## 4.5 Mittag-Lefflerjev izrek

Podobno kot izreka Weierstrassa in Mergelyana za holomorfné funkcije prilagodimo minimalnim ploskvam, želimo sedaj navesti še ustrezno različico Mittag-Lefflerjevega izreka. Lahko si predstavljamo, da so meromorfné funkcije v smislu minimalnih ploskev konformne minimalne imerzije  $x: M \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  iz punktirane odprte Riemannove ploskve, katerih 1-forma  $\partial x$  je meromorfná na  $M$  s poli natanko v točkah množice  $A$ , množica  $A$  pa je zaprta diskretna podmnožica v  $M$ . Pri aproksimaciji se bodo spet naravno pojavile dopustne množice ter enačice posplošenih konformnih minimalnih imerzij.

Spomnimo se, da je imerzija  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  *kompletna*, če ima pot  $x \circ \gamma$  v  $\mathbb{R}^n$  neskončno Evklidsko dolžino za poljubno divergentno pot  $\gamma: [0, 1) \rightarrow M$ . Ekvivalentno je zahtevati, da je povlečena metrika  $x^*ds^2$  na  $M$  kompletna, torej je prostor  $(M, x^*ds^2)$  kompleten metrični prostor (slednje pomeni konvergenco Cauchyjevih zaporedij v prostoru).

V poglavju o Gaussovi preslikavi smo definirali totalno ukrivljenost Riemannove ploskve. Ploskve s končno totalno ukrivljenostjo so posebej zanimive, zato uvedimo naslednji termin, ki opisuje podrazred posplošenih minimalnih imerzij.

**Definicija 4.28.** Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $\theta$  povsod neničelna holomorfná 1-forma na  $M$ . Naj bo  $S$  dopustna podmnožica v  $M$  in  $A \subset S^\circ$  končna množica točk. Posplošena kompletna konformna minimalna imerzija  $S \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r$  s končno totalno ukrivljenostjo je par  $(x, f\theta)$ , za katerega velja:

1. preslikava  $x: S^\circ \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  je konformna minimalna imerzija, pripadajoča 1-forma  $2\partial x = f\theta$  pa ima pol v vsaki točki množice  $A$ ;
2. naj bo  $W \subset S^\circ$  taka kompaktna okolica množice  $A$  z gladkim robom, da je  $S' = S \setminus W^\circ$  dopustna množica. Tedaj je par  $(x, f\theta)$  posplošena konformna minimalna imerzija  $S' \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r(S', \mathbb{R}^n)$ .

Pojasnimo smiselnost zgornje definicije. Klasična teorija minimalnih ploskev pove: naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev (ali kompaktna Riemannova ploskev z robom) in  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Če je  $M$  konformno ekvivalentna  $R \setminus A$ , kjer je  $R$  kompaktna Riemannova ploskev z robom in  $A \subset R^\circ$  končna množica točk, preslikava  $x: R \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  konformna minimalna imerzija, 1-formo  $\partial x$  pa lahko meromorfno razširimo na  $R$  s poli v točkah množice  $A$ , potem je preslikava  $x$  kompletna s končno totalno ukrivljenostjo. Velja tudi obrat.

Opazimo, da prvi pogoj iz zgornje definicije implicira kompletnost imerzije  $x$ . Res, za divergentno pot  $\gamma: [0, 1) \rightarrow S \setminus A$ ,  $\lim_{s \rightarrow 1} \gamma(s) \in A$ , ima pot  $x \circ \gamma$  neskončno dolžino v  $\mathbb{R}^n$ . To pomeni, da je preslikava  $x: S \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  kompletna.

Do Mittag-Lefflerjevega izreka za konformne minimalne imerzije nas loči še nekaj korakov. Postopek je podoben ideji, ki nas je vodila do glavnega izreka o aproksimaciji in interpolaciji. Najprej bomo navedli in dokazali lemo o aproksimaciji in interpolaciji meromorfni preslikav v ničelno kvadriko; ta je analogna Lemi 4.16. Iz leme sledi trditve, ki je nekritični primer Mittag-Lefflerjevega izreka, in je razširitev Trditve 4.17. Trditve nato (kot v primeru glavnega izreka) posplošimo do Mittag-Lefflerjevega izreka za konformne minimalne imerzije in analognega rezultata, Weierstrassovega izreka o interpolaciji konformnih minimalnih ploskev. Predstavili bomo dokaz leme, dokaze trditve in obeh izrekov pa bomo izpustili. Ti sledijo idejam dokazov pripadajočih rezultatov iz prejšnjega poglavja.

Za začetek definirajmo še en razred preslikav. Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $S$  njena kompaktna dopustna podmnožica. Naj bo  $A \subset S^\circ$  končna množica točk in  $r \in \mathbb{N}$ . Preslikave  $f: S \setminus A \rightarrow \mathbf{A}_*$ , ki so meromorfne v notranjosti  $S^\circ$  s poli v točkah množice  $A$ , za vsako dopustno množico  $S' = S \setminus W^\circ$  iz Definicije 4.28 ( $W \subset S^\circ$  je kompaktna okolica množice  $A$  z gladkim robom) pa velja  $f \in \mathcal{A}^r(S', \mathbf{A}_*)$ , tvorijo prostor preslikav, ki ga označimo z

$$\mathcal{A}_\infty^r(S|A, \mathbf{A}_*).$$

Po definiciji je preslikava  $f \in \mathcal{A}_\infty^r(S|A, \mathbf{A}_*)$  holomorfná na množici  $S^\circ \setminus A$ .

**Lema 4.29.** Naj bodo  $M$ ,  $S$  in družina  $\mathcal{C}$  kot v Lemi 4.16. Naj bo  $\mathcal{P}$  periodno dominantni sprej, ki pripada družini krivulj  $\mathcal{C}$ ,  $A \subset S^\circ$  končna množica točk in  $r \geq 1$ . Tedaj za dane preslikavo  $f \in \mathcal{A}_\infty^r(S|A, \mathbf{A}_*)$ , realno število  $\varepsilon > 0$ , končno množico  $\Lambda$ , z  $A \subset \Lambda \subset S^\circ$ , in število  $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  obstaja polna holomorfná preslikava  $F \in \mathcal{O}(M \setminus A, \mathbf{A}_*)$ , pri čemer velja naslednje:



1. razlika  $F - f$  je holomorfná v vsaki točki množice  $A$  in  $F - f \in \mathcal{A}^r(S, \mathbb{C}^n)$ . Preslikava  $F$  je meromorfná s poli v točkah množice  $A$ ;
2.  $\|F - f\|_{C^r(S)} < \varepsilon$ ;
3. razlika  $F - f$  je ničelna do reda  $s$  v točkah množice  $\Lambda$ ;
4.  $\mathcal{P}(F - f) = 0$ .

*Dokaz.* Najprej uporabimo Weierstrassov izrek 2.25 o interpolaciji na odprtih Riemannovih ploskvah. Ker je po predpostavki  $A \subset S^\circ \subset M$  končna množica in preslikava  $f \in \mathcal{A}_\infty^r(S|A, \mathbf{A}_*)$ , po izreku obstaja holomorfná funkcija  $w \in \mathcal{O}(M)$ , ki ima ničle predpisanih stopenj v točkah množice  $A$ , na  $M \setminus A$  pa je neničelna. Funkcijo  $w$  lahko izberemo tako, da je produkt  $wf$  brez ničel in polov na množici  $A$ . Sledi, da je  $wf \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$ .

Po predpostavki so  $M$ ,  $S$  in  $\mathcal{C}$  kot v Lemi 4.16, zato sledimo idejam njenega dokaza. Kot v 1. koraku slednjega lahko preslikavo  $wf$  aproksimiramo in interpoliramo v  $C^r(S)$  s tako polno preslikavo  $g \in \mathcal{A}^r(S, \mathbf{A}_*)$ , da velja:

- $wf$  in  $g$  se ujemata do danega končnega reda  $s_1$  na množici  $\Lambda$ ;
- $\mathcal{P}(wf) = \mathcal{P}(g)$ .

Iz definicije razreda  $\mathcal{A}_\infty^r(S|A, \mathbf{A}_*)$  tedaj sledi, da je kvocient  $\tilde{g} = \frac{g}{wf} \in \mathcal{A}_\infty^r(S|A, \mathbf{A}_*)$ . Preslikava  $\tilde{g}$  je polna, saj je  $g$  polna. Za primerno velik  $s_1 \in \mathbb{N}$  izbran zgoraj velja:

- razlika  $\tilde{g} - f$  je holomorfná na  $A$ ;
- $\|\tilde{g} - f\|_{C^r(S)} < \tilde{\varepsilon}$  za nek  $\tilde{\varepsilon} > 0$ ;
- $\tilde{g}$  in  $f$  se ujemata do reda  $s$  na množici  $\Lambda$ ;
- $\mathcal{P}(\tilde{g} - f) = 0$ .

Prvi korak je s tem zaključen.

Sedaj nadomestimo  $f$  s preslikavo  $\tilde{g}$ ; pišimo  $\tilde{g} = f$ , tj. predpostavimo, da je  $f$  polna in zato neravna preslikava. Potem je tudi  $wf$  neravna.

Kot v Lemi 4.16 naj  $C$  označuje unijo vseh krivulj iz družine  $\mathcal{C}$ . Definirajmo nov razred, ki sestoji iz takih zveznih preslikav  $h: C \setminus A \rightarrow \mathbb{C}^n$ , ki hkrati ustrezajo še  $\frac{h}{wf} - f \in \mathcal{C}(C, \mathbb{C}^n)$ . Označimo ga s  $\mathcal{C}_{w,f}(C, \mathbb{C}^n)$ .

V nadaljevanju sledimo 2. koraku dokaza Leme 4.16. S pomočjo Leme 4.10 konstruiramo periodno dominantni sprej

$$\Phi_{wf}: S \times \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbf{A}_*$$

z jedrom  $wf$  (kjer je  $N \in \mathbb{N}$  velik). Vemo, da se preslikava  $\Phi_{wf}(\cdot, t): S \rightarrow \mathbf{A}_*$  ( $t \in \mathbb{C}^N$ ) z  $wf$  ujema do danega končnega reda  $s_1$  na množici  $\Lambda$ .

Oglejmo si periodno preslikavo  $\mathcal{P}^{w,f} = (\mathcal{P}_1^{w,f}, \dots, \mathcal{P}_l^{w,f}): \mathcal{C}_{w,f}(C, \mathbb{C}^n) \rightarrow (\mathbb{C}^n)^l$ , ki je modificirana periodna preslikava  $\mathcal{P}$ , definirana s predpisom

$$\begin{aligned}\mathcal{P}^{w,f}(h) &= \mathcal{P}\left(\frac{h}{w} - f\right), \quad h \in \mathcal{C}_{w,f}(C, \mathbb{C}^n); \\ \mathcal{P}_i^{w,f}(h) &= \int_{C_i} \left(\frac{h}{w} - f\right) \theta \in \mathbb{C}^n, \quad i = 1, \dots, l.\end{aligned}$$

Po Lemi 4.10 je tedaj preslikava

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_{t=0} \mathcal{P}^{w,f}(\Phi_{wf}(\cdot, t)): \mathbb{C}^N \rightarrow (\mathbb{C}^n)^l$$

submerzija. Pripadajoča Jacobijeva matrika ima namreč bločno strukturo in maksimalen rang, to je  $nl$ . Kot v dokazu Leme 4.16 obstaja holomorfna preslikava  $\tilde{f}: M \rightarrow \mathbf{A}_*$ , ki v  $\mathcal{C}^r(S)$  aproksimira preslikavo  $wf$  in se z njo ujema do reda  $s_1$  v točkah množice  $\Lambda$ . Nato poiščemo periodno dominantni sprej  $\Phi_{\tilde{f}}: M \times \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbf{A}_*$  z jedrom  $\tilde{f}$ , ter preslikavo  $\tilde{F} = \Phi_{\tilde{f}}(\cdot, t_0) \in \mathcal{O}(M, \mathbf{A}_*)$  za neko točko  $t_0 \in \mathbb{B}^N \subset \mathbb{C}^N$ . Dobljena preslikava  $\tilde{F}$  ima naslednje lastnosti:

- razlika  $\frac{\tilde{F}}{w} - f$  je holomorfna na  $A$  in
- $\mathcal{P}^{w,f}(\tilde{F}) = \mathcal{P}\left(\frac{\tilde{F}}{w} - f\right) = 0$ .

Končno definiramo kvocient  $F = \frac{\tilde{F}}{w}$ , ki ob dovolj dobri aproksimaciji  $wf$  z  $\tilde{f}$  in izboru dovolj velikega števila  $s_1$  ustreza zaključkom leme.  $\square$

Pravkar dokazana lema je najpomembnejše orodje za dokaz naslednje trditve, ki predstavlja nekritični primer Mittag-Lefflerjevega izreka za minimalne ploskve.

**Trditev 4.30.** *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev in  $\theta$  povsod neničelna holomorfna 1-forma na  $M$ . Predpostavimo, da je  $S$  povezana dopustna množica, ki je Rungejeva v  $M$ , ter  $A$  in  $\Lambda$  končni množici točk z  $A \subset \Lambda \subset S^\circ$ . Naj bosta  $r, s \in \mathbb{N}$ . Tedaj lahko vsako posplošeno konformno minimalno imerzijo  $(x, f\theta): S \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  razreda  $\mathcal{C}^r(S \setminus A)$  s končno totalno ukrivljenostjo aproksimiramo v  $\mathcal{C}^r(S \setminus A)$  s polnimi konformnimi minimalnimi imerzijami  $X: M \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Pri tem so izpolnjeni naslednji pogoji.*

1. Razlika  $X - x$  je harmonična v vsaki točki množice  $A$ . Natančneje, 1-formo  $\partial X$  lahko meromorfno razširimo na  $M$  s poli v točkah množice  $A$ .
2. Razlika  $X - x$  je ničelna do reda  $s$  v točkah množice  $\Lambda$ .
3.  $\text{Flux}_X = \text{Flux}_x$ .

**Izrek 4.31** (Mittag-Lefflerjev izrek za konformne minimalne imerzije). *Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev,  $A \subset M$  njena zaprta diskretna podmnožica,  $U \subset M$  okolica množice  $A$  in  $n \geq 3$ . Predpostavimo, da je  $x: U \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  konformna minimalna imerzija, pripadajočo 1-formo  $\partial x$  pa lahko meromorfno razširimo na  $U$  s poli v točkah množice  $A$ . Tedaj obstaja taka polna konformna minimalna imerzija*

$\tilde{x}: M \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$ , da je razlika  $\tilde{x} - x$  harmonična na množici  $A$ . Natančneje, 1-formo  $\partial\tilde{x}$  lahko meromorfno razširimo na  $M$  s poli v točkah množice  $A$ .

Dodatno predpostavimo, da je  $U$  lokalno končna unija paroma disjunktih povezanih dopustnih podmnožic v  $M$ , par  $(x, f\theta)$  posplošena kompletna konformna minimalna imerzija razreda  $C^r$  s končno totalno ukrivljenostjo na vsaki komponenti množice  $U \setminus A$  in  $r \in \mathbb{N}$ . Tedaj za poljubne  $\varepsilon > 0$ , zaprto diskretno podmnožico  $\Lambda$ , za katero velja  $A \subset \Lambda \subset U^\circ$ , preslikavo  $k: \Lambda \rightarrow \mathbb{N}$  in homomorfizem grup  $\mathbf{p}: H_1(M \setminus A, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ , ki ustreza  $\mathbf{p}|_{H_1(U \setminus A, \mathbb{Z})} = \text{Flux}_x$ , obstaja konformna minimalna imerzija  $\tilde{x}: M \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  kot zgoraj. Poleg tega so izpolnjeni še pogoji:

1.  $\|\tilde{x} - x\|_{C^r(U)} < \varepsilon$ ;
2. preslikavi  $\tilde{x}$  in  $x$  se ujemata do reda  $k(p)$  v vsaki točki  $p \in \Lambda$ ;
3.  $\text{Flux}_{\tilde{x}} = \mathbf{p}$  na  $H_1(M \setminus A, \mathbb{Z})$ .

Prvi del izreka se zdi pričakovan kot nadaljevanje običajnega Mittag-Lefflerjevega izreka, le da tokrat govorimo o preslikavah (konformnih minimalnih imerzijah) iz odprtih Riemannovih ploskev.

Spomnimo se, da je družina podmnožic  $\mathcal{F}$  topološkega prostora  $X$  lokalno končna družina, kadar vsaka točka  $p \in X$  premore okolico  $U_p \subset X$ , ki seka končno mnogo množic iz  $\mathcal{F}$ . Ker je unija  $U$  v drugem delu zgornjega izreka po predpostavki lokalno končna, obstaja zaporedje povezanih kompaktnih domen z gladkim robom

$$M_0 \Subset M_1 \Subset \cdots \Subset \bigcup_{i \geq 0} M_i = M,$$

za katere velja  $U \cap M_0 = \emptyset$  in  $U \cap \partial M_i = \emptyset$  za  $i = 1, 2, \dots$ . To zaporedje množic  $\{M_i\}_i$  igra pomembno vlogo v dokazu izreka, ki poteka z indukcijo, podobno kot dokaz glavnega izreka iz prejšnjega poglavja. Dokaz različice izreka se nahaja v [...].

Mittag-Lefflerjev izrek za konformne minimalne imerzije, predvsem njegov drugi del, posnema glavni izrek za minimalne ploskve Mergelyanovega tipa (Izrek 4.24) v naslednjem smislu. Če minimalno imerzijo v glavnem izreku definiramo na punktirani dopustni množici in dovolimo, da imajo njeni Weierstrassovi podatki pole (v točkah, kjer podana imerzija ni definirana), tedaj dobimo zgornji izrek.

Analogen rezultat velja tudi za holomorfne ničelne krivulje.

**Izrek 4.32** (Weierstrassov izrek o interpolaciji konformnih minimalnih ploskev). Naj bo  $M$  odprta Riemannova ploskev,  $A \subset M$  njena zaprta diskretna podmnožica,  $U \subset M$  okolica množice  $A$  in  $n \geq 3$ . Predpostavimo, da je  $z: U \rightarrow \mathbb{C}^n$  meromorfna preslikava s poli v točkah množice  $A$ , katere zožitev  $z|_{U \setminus A}$  je holomorfna ničelna krivulja. Tedaj obstaja meromorfna preslikava  $\tilde{z}: M \rightarrow \mathbb{C}^n$ , njena zožitev  $\tilde{z}|_{M \setminus A}$  na  $M \setminus A$  je polna holomorfna ničelna krivulja, razlika  $\tilde{z} - z$  pa je holomorfna na množici  $A$ .

## 4.6 Kompletnost

Kompletnost preslikav oziroma mnogoterosti je ena izmed pomembnejših lastnosti v Riemannovi geometriji. Izkaže se, da preslikave iz izrekov o aproksimaciji in

interpolaciji minimalnih ploskev iz prejšnjih razdelkov lahko izberemo tako, da so kompletne. To dejstvo opisuje naslednji izrek; predstavili bomo le osnovne ideje njegovega dokaza, povzete po [...].

**Izrek 4.33.** 1. Konformno minimalno imerzijo  $\tilde{x}: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  iz Izreka 4.24 lahko izberemo tako, da je kompletna.

2. Holomorfno ničelno krivuljo  $\tilde{z}: M \rightarrow \mathbb{C}^n$  iz Izreka 4.26 lahko izberemo tako, da je kompletna.

3. Konformno minimalno imerzijo  $\tilde{x}: M \setminus A \rightarrow \mathbb{R}^n$  iz Izreka 4.31 lahko izberemo tako, da je kompletna.

4. Holomorfno ničelno krivuljo  $\tilde{z}: M \setminus A \rightarrow \mathbb{C}^n$  iz Izreka 4.32 lahko izberemo tako, da je kompletna.

*Dokaz.* Oglejmo si prvi primer, to je situacija iz Izreka 4.24. Dokaz je induktiven, ideja pa sledi dokazu izreka, ki ga primer obravnava. Razlika je ta, da za preslikave, konstruirane z indukcijo, vključimo dodaten pogoj, ki zagotovi kompletnost.

Po dokazu Izreka 4.24 lahko predpostavimo, da je  $x: M \rightarrow \mathbb{R}^n$  polna konformna minimalna imerzija. Postavimo  $x^0 = x$  in izberimo število  $\varepsilon_0 > 0$ . Nadalje izberimo strogo subharmonično Morsejevo funkcijo izčrpanja  $\rho: M \rightarrow \mathbb{R}$  ter strogo naraščajoče zaporedje nenegativnih realnih števil  $\{c_i\}_i \subset \mathbb{R}$  z začetnim členom  $c_0 = 0$  in limito  $\lim_{i \rightarrow \infty} c_i = +\infty$ , ki izpolnjuje enake tri zahteve kot zaporedje v dokazu Izreka 4.24. Izberimo še točko  $p_0 \in M^\circ = \{\rho < c_0\}$ .

V indukcijskem delu konstruiramo zaporedje konformnih minimalnih imerzij  $\{x^i\}_i$ ,  $x^i: M_i = \{\rho \leq c_i\} \rightarrow \mathbb{R}^n$  (oz. natančneje,  $x^i$  je definirana v okolici  $M_i$ ), ter strogo padajoče zaporedje  $\{\varepsilon_i\}_i \subset \mathbb{R}_{>0}$ . Pri tem zahtevamo, da za vsak indeks  $i \in \mathbb{N}$  veljajo točke (i)–(vi) iz dokaza Izreka 4.24, hkrati pa tudi pogoj:

$$(vii) \quad d_{x^i}(p_0, bM_i) > i.$$

(Tu  $d_{x^i}$  označuje razdaljo glede na povlečeno metriko  $(x^i)^*ds^2$ .)

Nato definiramo preslikavo  $\tilde{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} x^i: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Po definiciji in dokazu Izreka 4.24 je  $\tilde{x}$  konformna minimalna imerzija, ki izpolnjuje Izrek 4.24, pogoj (vii) pa zagotavlja njeno kompletnost.

Baza indukcije je par  $(x^0, \varepsilon_0)$ . Indukcijski korak se sklicuje na metodo konstrukcije kompletnih minimalnih ploskev v  $\mathbb{R}^3$ , ki ležijo med vzporednima ravninama.

Drugi primer o holomorfni ničelni krivuljah pokažemo na analogen način.

V tretjem primeru opomnimo naslednje. Naj bo  $\gamma: [0, 1) \rightarrow M \setminus A$  poljubna divergentna pot. Obravnavati je potrebno dve možnosti:

- Pot  $\gamma$  divergira v  $M \setminus A$ . Tedaj kompletnost preslikave  $\tilde{x}$  zagotovimo s postopkom iz prvega primera.
- Pot  $\gamma$  divergira k točki  $a \in A$ . Tedaj ima pot  $\tilde{x} \circ \gamma$  avtomatično neskončno Evklidsko dolžino, saj vemo, da ima 1-forma  $\partial\tilde{x}$  pol v točki  $a \in A$ .

Dokaz četrtega primera je analogen tretjemu. □