

Calculus I

Derivatives of arbitrary radicals, part 2

Todor Milev

2019

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = ?$$

$$\text{Let } g(u) = ?$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = ?$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = ?$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = u^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = u^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\text{Chain Rule: } f'(x) = g'(h(x))h'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = u^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(? \right) (?) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = u^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(-\frac{1}{3}(h(x))^{-\frac{4}{3}} \right) (?) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = u^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(-\frac{1}{3}(h(x))^{-\frac{4}{3}} \right) (?) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = u^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(-\frac{1}{3}(h(x))^{-\frac{4}{3}} \right) (2x + 1) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}[h(x)]^n = n[h(x)]^{n-1} \cdot h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, Power Rule)

$$\text{Differentiate } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}.$$

$$\text{Let } h(x) = x^2 + x + 1.$$

$$\text{Let } g(u) = u^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(-\frac{1}{3}(h(x))^{-\frac{4}{3}} \right) (2x+1) \\ &= -\frac{2x+1}{3}(x^2+x+1)^{-\frac{4}{3}}. \end{aligned}$$