

Calculus I

Miscellaneous chain rule problems, part 1

Todor Milev

2019

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = ?$$

$$\text{Let } g(u) = ?$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = ?$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = ?$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = \sqrt{u}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3}) .$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = \sqrt{u}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\text{Chain Rule: } f'(x) = g'(h(x))h'(x)$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = \sqrt{u}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(? \right) (?) \end{aligned}$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = \sqrt{u}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{h(x)}} \right) (?) \end{aligned}$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = \sqrt{u}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{h(x)}} \right) (?) \end{aligned}$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = \sqrt{u}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{h(x)}} \right) (\cos x) \end{aligned}$$

$$(g(h(x)))' = g'(h(x)) \cdot h'(x) \quad (\text{notation 1})$$

$$(g(u))' = g'(u)u' \quad \text{where } u = h(x) \quad (\text{notation 2})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{where } y = g(u) \quad (\text{notation 3})$$

Example (Chain Rule, Notation 1, square root of a trigonometric function)

$$\text{Differentiate } f(x) = \sqrt{\sin x + 2}.$$

$$\text{Let } h(x) = \sin x + 2.$$

$$\text{Let } g(u) = \sqrt{u}.$$

$$\text{Then } f(x) = g(h(x)).$$

$$\begin{aligned} \text{Chain Rule: } f'(x) &= g'(h(x))h'(x) \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{h(x)}} \right) (\cos x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\sin x + 2}}. \end{aligned}$$