

Precalculus

Cubic inequality

Todor Milev


2019

Example

Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$


Example



Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$? (x - \quad) (x - \quad) (x - \quad) > 0$$

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$? (x - ?) (x - ?)(x - ?) > 0$$

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$? (x - (-\frac{1}{2})) (x - 1) (x - 2) > 0$$

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$? (x - (-\frac{1}{2})) (x - 1)(x - 2) > 0$$

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$2(x - (-\frac{1}{2}))(x - 1)(x - 2) > 0$$

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.


$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$2(x - (-\frac{1}{2}))(x - 1)(x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$.



Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.


$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$2 \left(x - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) (x - 1) (x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$.



Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.


$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$2 \left(x - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) (x - 1) (x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$.



Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$


$$2\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)(x - 1)(x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$		

Example



Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$


$$2(x - (-\frac{1}{2}))(x - 1)(x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$		
$(-\frac{1}{2}, 1)$		

Example



Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$


$$2(x - (-\frac{1}{2}))(x - 1)(x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$		
$(-\frac{1}{2}, 1)$		
$(1, 2)$		

Example



Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$


$$2\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)(x - 1)(x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$		
$(-\frac{1}{2}, 1)$		
$(1, 2)$		
$(2, \infty)$		

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$


$$2\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)(x - 1)(x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$?	?
$(-\frac{1}{2}, 1)$?	?
$(1, 2)$?	?
$(2, \infty)$?	?

Example



Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$


$$2\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)(x - 1)(x - 2) > 0$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$(-)(-)(-)$	$-$
$(-\frac{1}{2}, 1)$	$(+)(-)(-)$	$+$
$(1, 2)$	$(+)(+)(-)$	$-$
$(2, \infty)$	$(+)(+)(+)$	$+$

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$2\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)(x - 1)(x - 2) > 0$$


$$x \in ?$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$(-)(-)(-)$	$-$
$(-\frac{1}{2}, 1)$	$(+)(-)(-)$	$+$
$(1, 2)$	$(+)(+)(-)$	$-$
$(2, \infty)$	$(+)(+)(+)$	$+$

Example



Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$2(x - (-\frac{1}{2}))(x - 1)(x - 2) > 0$$


$$x \in (-\frac{1}{2}, 1) \cup (2, \infty)$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$(-)(-)(-)$	-
$(-\frac{1}{2}, 1)$	$(+)(-)(-)$	+
$(1, 2)$	$(+)(+)(-)$	-
$(2, \infty)$	$(+)(+)(+)$	+

Example




Plot the function $2x^3 - 5x^2 + x + 2$. Solve the inequality.

$$2x^3 - 5x^2 + x + 2 > 0$$

$$2 \left(x - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) (x - 1)(x - 2) > 0$$

$$x \in \left(-\frac{1}{2}, 1 \right) \cup (2, \infty)$$

Left hand side vanishes when $x = -\frac{1}{2}$, when $x = 1$ and when $x = 2$. The two roots split the real line into four intervals: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 1)$, $(1, 2)$, $(2, \infty)$.



Interval	Factor signs	Final sign from plot
$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$(-)(-)(-)$	-
$(-\frac{1}{2}, 1)$	$(+)(-)(-)$	+
$(1, 2)$	$(+)(+)(-)$	-
$(2, \infty)$	$(+)(+)(+)$	+