

## ESERCIZI NUMERI COMPLESSI

1. Si descriva il procedimento che ha condotto alla scrittura del radicale di un numero complesso  $z = \sqrt{a+ib}$  nella forma algebrica  $z = x + iy$ . Quale interpretazione geometrica è possibile dare delle equazioni nelle incognite  $x$  e  $y$  che si ottengono?
2. In cosa consiste la rappresentazione geometrica di un numero complesso?
3. Cosa si intende per “coniugato” di un numero complesso? Quale trasformazione geometrica è richiamata dalla rappresentazione sul piano di Gauss di un numero complesso e del suo coniugato?
4. Che relazione intercorre tra le soluzioni complesse dell'equazione di secondo grado che non ammette soluzioni reali?
5. Qual è il risultato della moltiplicazione di un numero complesso e del suo coniugato?
6. Si dimostri che  $z^n \cdot \bar{z}^n = (z \cdot \bar{z})^n$ .
7. Si esprima un numero complesso in *forma trigonometrica*, e si sfrutti questa rappresentazione per dimostrare la *disuguaglianza triangolare*.
8. Quale interpretazione geometrica può essere data del prodotto di due numeri complessi? E della potenza  $n$ -esima di un numero complesso?
9. Dedurre la formula De Moivre nel caso  $n = 4$ .
10. Si rappresentino geometricamente le radici  $n$ -esime dell'unità.
11. Si specifichi il tipo di struttura algebrica rappresentata dall'insieme delle radici  $n$ -esime dell'unità, munito dell'operazione di prodotto.
12. Si consideri la funzione  $f(z) = z^2$ . a) Si dica se ammette punti fissi; b) Si determini l'immagine dei numeri aventi modulo rispettivamente minore, uguale, o maggiore di uno.  
$$\left[ z = 0, \quad z = 1 \right]$$
13. Si consideri la funzione  $f(z) = 1/z$ . a) Si dica se ammette punti fissi; b) Si determini l'immagine dei numeri aventi modulo rispettivamente minore, uguale, o maggiore di uno.  
$$\left[ z = 1, \quad z = -1 \right]$$
14. Descrivere l'insieme dei numeri complessi tali che  $|z| \geq |z - i|$ .  
$$\left[ z = x + iy \mid y \geq \frac{1}{2} \right]$$
15. Risolvere le seguenti equazioni:

$$a) z^2 + 3iz + 4 = 0;$$

$$[i; -4i]$$

$$b) z^2 = \bar{z};$$

$$\left[ 0; 1; \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$c) z^2 + 2z + i = 0;$$

$$\left[ -1 \pm \sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}} \mp i\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}} \right]$$

$$d) z^3 = iz\bar{z};$$

$$\left[ \frac{\pm\sqrt{3}+i}{2}; -i \right]$$

$$e) |z|^2 z^2 = i$$

$$\left[ \left\{ \begin{array}{l} \rho = 1 \\ \theta = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k = 0, 1 \end{array} \right. \right]$$

### A-LEVEL MATHEMATICS

1. Find in the form  $x + iy$  the solutions of the following equations:

$$(a) z^2 = -25; (b) (2z - 3)^2 = -25; (c) (z - 2i)^2 = 49.$$

2. If  $\frac{z}{z-2} = 2 + i$ , find  $z$  in the form  $x + iy$ .

3. Sketch the loci described by (a)  $|z + 2i| = 1$ ; (b)  $\arg(z - 1) = -\frac{2\pi}{3}$ ; (c)  $|z + 2 + i| = |z - 4 + i|$ .

4. If P represents the complex number  $\sqrt{3} + i$ , find geometrically the two possible complex numbers represented by Q, the third vertex of the equilateral triangle OPQ.

5. Find the roots of the equations: (a)  $(1 - i)z^2 - 2iz + 3 - i = 0$ ; (b)  $z^2 + 2z + 5 = 0$ .

6. Expand  $(\cos\theta + i\sin\theta)^5$  by the binomial theorem. From this expansion, show that  $\cos 5\theta = 16c^2 - 20c^3 + 5c$ , where  $c = \cos\theta$ . Obtain a similar expression for  $\cos 6\theta$ .