

## ESERCIZI VETTORI

Negli esercizi proposti si assuma  $\vec{i}(1;0)$ ,  $\vec{j} = (0;1)$ .

1. Dati i vettori  $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$  e  $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j}$ , si trovino, in termini di  $\vec{i}$  e  $\vec{j}$ , (a)  $\vec{a} + \vec{b}$ ; (b)  $\vec{a} - \vec{b}$ ; (c)  $3\vec{a}$ ; (d)  $-4\vec{a} + \vec{b}$ .
2. Si trovi l'intensità di ognuno dei vettori precedentemente trovati, e l'angolo che ognuno di essi forma con il versore  $\vec{i}$ .
3. Si dica se i punti del piano, aventi come vettori posizione  $2\vec{j}$ ,  $-4\vec{j}$ ,  $4\vec{i} + 2\vec{j}$  e  $4\vec{i} + \vec{j}$ , possono essere vertici di un trapezio.
4. I vettori  $\vec{a}$  e  $\vec{b}$  di modulo  $|\vec{a}| = 15$  e  $|\vec{b}| = 8$  formano un angolo di  $90^\circ$ . Determinare: (a)  $|\vec{a} - \vec{b}|$ , (b)  $|2\vec{a} + 5\vec{b}|$ .
5. Ripetere l'esercizio precedente nel caso in cui l'angolo formato dai due vettori è  $60^\circ$ .
6. Dati i vettori  $\vec{v}_1 = (1;2)$  e  $\vec{v}_2 = (2;-3)$ , si determinino le coordinate del vettore  $\vec{w} = \vec{v}_1 - \frac{1}{2}\vec{v}_2$ , ed esprimere il vettore  $\vec{w}' = (3;5)$  come combinazione lineare dei vettori  $\vec{v}_1$  e  $\vec{v}_2$ . E' possibile esprimere ogni vettore del piano come combinazione lineare di  $\vec{v}_1$  e  $\vec{v}_2$ ?
7. Dati i vettori  $\vec{v}_1 = (1;2;0)$  e  $\vec{v}_2 = (2;-3;1)$ , si determinino le coordinate del vettore  $\vec{w} = \vec{v}_1 - \frac{1}{2}\vec{v}_2$ , ed esprimere il vettore  $\vec{w}' = (3;5;-2)$  come combinazione lineare dei vettori  $\vec{v}_1$  e  $\vec{v}_2$ . E' possibile esprimere ogni vettore dello spazio come combinazione lineare di  $\vec{v}_1$  e  $\vec{v}_2$ ?
8. Si dica per quali valori del parametro  $k$  il vettore  $\vec{w} = (1;1;2k)$  si può esprimere come combinazione lineare dei vettori  $\vec{v}_1 = (-3;4;-1)$  e  $\vec{v}_2 = (0;-5;0)$ .
9. Dato il vettore  $\vec{w} = (3;5)$ , quali sono le coordinate di un vettore  $\vec{v}$  ottenuto dalla rotazione di  $\vec{w}$  in senso antiorario di un angolo retto? Si generalizzi il risultato considerando la rotazione di un generico vettore  $\vec{w} = (a;b)$  di un angolo  $\theta$ , sempre in senso antiorario.
10. Si calcolino le coordinate del punto intersezione, se esiste, tra le rette  $\vec{OX} = (4,-6,0) + \lambda(2,10,4)$  e  $\vec{OY} = (4,-6,-2) + \mu(10,2,2)$ . Tali rette sono parallele? Quali condizioni potrebbero descrivere rette nello spazio che non sono né parallele né incidenti?
11. Si trovi la distanza dal punto  $P = (2,1)$  alla retta  $\vec{OX} = (0,1) + \lambda(2,3)$ .
12. Si dica per quali valori di  $a$  la retta  $\begin{cases} x = 8 + 4t, \\ y = 10 + 5t, \\ z = 2a + at, \end{cases}$  è contenuta nel piano generato dai vettori  $\vec{OA} = (1;1;3)$  e  $\vec{OB} = (2;-1;-3)$ .

### Soluzioni

1. (a)  $\vec{a} + \vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ ; (b)  $\vec{a} - \vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j}$ ; (c)  $3\vec{a} = 6\vec{i} + 2\vec{j}$ ; (d)  $-4\vec{a} + \vec{b} = -7\vec{i} - 13\vec{j}$ .
2. (a)  $\vec{a} + \vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ ;  $\tan \theta = \frac{2}{3} \dots$
3. In coordinate:  $(0;2), (0;-4), (4;2), (4,1)$ . Poiché la differenza tra i primi due vettori è parallela alla differenza tra i restanti due (in senso vettoriale), allora i punti possono essere vertici di un trapezio.

4. Possiamo applicare il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo che si forma con i vettori

$$(a) |\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{225 + 64} = 17$$

nei singoli casi:

$$(b) |2\vec{a} + 5\vec{b}| = \sqrt{4 \cdot 225 + 25 \cdot 64} = 50$$

5. Possiamo applicare il teorema di Carnot al triangolo che si forma con i vettori nei singoli

$$(a) |\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ = 289 - 120 \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{169} = 13$$

casi:

$$(b) |2\vec{a} + 5\vec{b}| = \sqrt{4 \cdot 225 + 25 \cdot 64 - 2 \cdot 2 \cdot 15 \cdot 5 \cdot 8} = 10$$

6.  $\vec{w} = \vec{v}_1 - \frac{1}{2}\vec{v}_2 = (1; 2) - \frac{1}{2}(2; -3) = \left(0; \frac{7}{2}\right)$ .  $\vec{w}' = (3; 5) = \alpha(1; 2) + \beta(2; -3) = (\alpha + 2\beta; 2\alpha - 3\beta)$ , da

$$\text{cui segue } \begin{cases} \alpha + 2\beta = 2 \\ 2\alpha - 3\beta = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \end{cases}. \text{ Sia } (x; y) \text{ il generico vettore del piano; imponiamo}$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = x \\ 2\alpha - 3\beta = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{3x + 2y}{7} \\ \beta = \frac{2x - y}{7} \end{cases}, \text{ quindi ogni vettore del piano può essere espresso come}$$

combinazione lineare dei vettori  $\vec{v}_1 = (1; 2)$  e  $\vec{v}_2 = (2; -3)$ .

7.  $\vec{w} = \vec{v}_1 - \frac{1}{2}\vec{v}_2 = (1; 2; 0) - \frac{1}{2}(2; -3; 1) = \left(0; \frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ .

$$\vec{w}' = (3; 5; -2) = \alpha(1; 2; 0) + \beta(2; -3; 1) = (\alpha + 2\beta; 2\alpha - 3\beta; \beta), \text{ da cui segue}$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 3 \\ 2\alpha - 3\beta = 5 \\ \beta = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \alpha = -\frac{1}{2} \\ \beta = -2 \end{cases}, \text{ risultato evidentemente non accettabile.}$$

$$8. \begin{cases} 1 = -3\alpha + 0\beta \\ 1 = 4\alpha - 5\beta \\ 2k = -\alpha + 0\beta \end{cases} \Rightarrow 2k = \frac{1}{3} \Rightarrow k = \frac{1}{6} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{1}{3} \\ \beta = -\frac{7}{15} \end{cases}.$$

$$9. \begin{cases} x' = -y = -5 \\ y' = x = 3 \end{cases} \Rightarrow \vec{v}' = (-5; 3). \text{ In generale,}$$

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \vec{v}' = (x \cos \theta - y \sin \theta; x \sin \theta + y \cos \theta).$$

10. **Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.** Il sistema è chiaramente impossibile. Poiché i vettori direzione non sono paralleli, le rette appartengono a piani diversi.

$$11. \text{ Si scrive l'equazione cartesiana della retta: } r: \begin{cases} x = 0 + 2\lambda \\ y = 1 + 3\lambda \end{cases} \Rightarrow \frac{y-1}{3} = \frac{x}{2} \Rightarrow 3x - 2y + 2 = 0.$$

$$\text{La distanza è quindi } d(P, r) = \frac{|6 - 2 + 2|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{6}{\sqrt{13}}.$$

12. Il problema è risolto una volta che abbiamo espresso il vettore direzione della retta come

$$\text{combinazione lineare dei vettori del piano: } \begin{cases} \alpha + 2\beta = 4 \\ \alpha - \beta = 5 \\ 3\alpha - 3\beta = a \end{cases} \Rightarrow a = 15.$$