MQ-HÓA SINH-CTUMP

Câu 1. Nguyên tắc xử trí do phỏng hóa chất tại Phòng thí nghiệm:

A. Rửa trôi và trung hòa bằng hóa chất khác.

B. Rửa trôi hóa chất.

C. Trung hòa bằng hóa chất khác.

D. Băng chặt hoặc dùng Vaselin, thuốc mỡ.

Câu 2. Nguyên tắc xử trí do phỏng do acid tại Phòng thí nghiệm:

A. Đắp vải mùng tẩm Na Bicarbonate 8% sau đó rửa sạch với nước.

B. Đắp vải mùng tẩm acid picric 3% sau đó rửa sạch với nước.

C. Rửa trôi hóa chất sau đó đắp vải mùng tẩm Na Bicarbonate 8%.

D. Rửa trôi hóa chất sau đó đắp vải mùng tẩm acid picric 3%.

Câu 3. Nguyên tắc xử trí do phỏng do kiềm tại Phòng thí nghiệm:

A. Đắp vải mùng tẩm Na Bicarbonate 8% sau đó rửa sạch với nước.

B. Đắp vải mùng tẩm acid picric 3% sau đó rửa sạch với nước.

C. Rửa trôi hóa chất sau đó đắp vải mùng tẩm Na Bicarbonate 8%.

D. Rửa trôi hóa chất sau đó đắp vải mùng tẩm acid picric 3%.

Câu 4. Khi bị Acid (Brom) rơi vào mắt, nguyên tắc xử trí là:

A. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch bicarbonate natri 5%.

B. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch acid boric 5%.

C. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch bicarbonate natri 1%.

D. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch acid boric 1%.

Câu 5. Khi bị chất kiềm rơi vào mắt, nguyên tắc xử trí là:

A. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch bicarbonate natri 5%.

B. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch acid boric 5%.

C. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch bicarbonate natri 1%.

D. Tắm mắt tức khắc với nước, sau đó tắm mắt trong dung dịch acid boric 1%.

Câu 6. Khi bị hóa chất không phải acid hay kiềm rơi vào miệng, nguyên tắc xử trí là:

A. Súc miệng nhiều lần bằng dung dịch natri bicarbonate 1%.

B. Súc miệng nhiều lần bằng dung dịch acid boric 1%.

C. Súc miệng nhiều lần bằng dung dịch NaCl 0,9%.

D. Súc miệng nhiều lần bằng nước sạch.

Câu 7. Nguyên tắc xử trí khi bị nhiễm hơi độc trong Phòng thí nghiệm, NGOẠI TRỪ:

A. Đem nạn nhân ra nơi thoáng khí, nới lỏng quần áo.

B. Cho nạn nhân uống trà đường hay nước đường.

C. Cho nạn nhan uống 1 ly cà phê đen.

D. Hô hấp nhân tạo (nếu cần) trong lúc đi đến bệnh viện.

Câu 8. Trong công thức $C=\frac{OD}{OD_0} x\ C_o$, OD là:

A. Nồng độ của mẫu thử.

B. Nồng độ của mẫu chuẩn.

C. Mật độ quang của ống thử.

D. Mật độ quang của ống chuẩn.

Câu 9. Trong công thức $C = \frac{OD}{OD_0} x\ C_o$, OD_0 là:

A. Nồng độ của mẫu thử.

B. Nồng độ của mẫu chuẩn.

C. Mật độ quang của ống thử.

D. Mật độ quang của ống chuẩn.

Câu 10. Trong công thức $C = \frac{OD}{OD_0} x\ C_o$, C là:

A. Nồng độ của mẫu thử.

B. Nồng độ của mẫu chuẩn.

C. Mật độ quang của ống thử.

D. Mật độ quang của ống chuẩn.

Câu 11. Trong công thức $C=\frac{OD}{OD_0} x\ C_o$, C_0 là:

A. Nồng độ của mẫu thử.
B. Nồng độ của mẫu chuẩn.
C. Mật độ quang của ống thử.
D. Mật độ quang của ống chuẩn.

Câu 12. Cốc có mỏ còn được gọi là:
A. Ballon. B. Becher. C. Eprouvette. D. Erlenmeyer.

Câu 13. Bình cầu còn được gọi là:
A. Ballon. B. Becher. C. Eprouvette. D. Erlenmeyer.

Câu 14. Ống đong còn đượng gọi là:
A. Ballon. B. Becher. C. Eprouvette. D. Erlenmeyer.

Câu 15. Ống hút còn được gọi là:
A. Ballon. B. Becher. C. Piptte. D. Erlenmeyer.

Câu 16. Bình nón còn được gọi là:
A. Ballon. B. Becher. C. Eprouvette. D. Erlenmeyer.

Câu 17. Thời gian bảo quản cho phép với các mẫu huyết thanh và huyết tương ở nhiệt độ phòng thí nghiệm là:
A. 4 giờ.
B. 8 giờ.
C. 12 giờ.
D. 1-2 ngày.

Câu 18. Thời gian bảo quản cho phép với các mẫu huyết thanh và huyết tương ở nhiệt độ 2 – 8^0C là:
A. 4 giờ.
B. 8 giờ.
C. 12 giờ.
D. 1-2 ngày.

Câu 19. Mẫu huyết thanh và huyết tương bảo quản được 1 – 2 ngày ở nhiệt độ:
A. 2 – 8^0C.
B. 8 – 12^0C.
C. 12 – 24^0C.
D. 24 – 37^0C.

Câu 20. Khi lấy huyết thanh định lượng Kali, Natri, khi ly tâm cục máu đông hình thành và tách cục huyết khỏi dính vào thành ống, thời gian không quá:
A. 15 phút.
B. 30 phút.
C. 45 phút.
D. 60 phút.

Câu 21. Khi nghi ngờ viêm tiết niệu nên lấy nước tiểu khi:
A. Lúc ngủ dậy.
B. Sau bữa ăn 2 giờ.
C. Khoảng 14 – 16 giờ.
D. Bất kỳ lúc nào.

Câu 22. Khi nghi ngờ glucose niệu nên lấy nước tiểu khi:
A. Lúc ngủ dậy.
B. Sau bữa ăn 2 giờ.
C. Khoảng 14 – 16 giờ.
D. Bất kỳ lúc nào.

Câu 23. Khi nghi ngờ urobilinogen nên lấy nước tiểu khi:
A. Lúc ngủ dậy.
B. Sau bữa ăn 2 giờ.

C. Khoảng 14 – 16 giờ.
D. Bất kỳ lúc nào.

Câu 24. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản mẫu nước tiểu trong vòng 3 ngày là:
A. Dưới 0^0C.
B. 2 – 8^0C.
C. 12 – 24^0C.
D. 24 – 37^0C.

Câu 25. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản mẫu nước tiểu trong lâu hơn 3 ngày là:
A. Dưới 0^0C.
B. 2 – 8^0C.
C. 12 – 24^0C.
D. 24 – 37^0C.

Câu 26. Khi lấy dịch vị để chẩn đoán các bệnh dạ dày, bệnh nhân cần nhịn đói:
A. 6 giờ.
B. 12 giờ.
C. 24 giờ.
D. 32 giờ.

Câu 27. Khi lấy dịch vị để chẩn đoán các bệnh dạ dày, bệnh nhân cần ngừng dùng các thuốc ảnh hưởng đến sự bài tiết dịch vị ít nhất:
A. 6 giờ.
B. 12 giờ.
C. 24 giờ.
D. 32 giờ.

Câu 28. Phản ứng Fehling dương tính khi:
A. Cho phức hợp màu đỏ gạch.
B. Cho kết tủa đỏ gạch.
C. Cho phức hợp màu đỏ.
D. Cho kết tủa màu đỏ.

Câu 29. Phản ứng Fehling dương tính khi:
A. MS có tính khử.
B. PS có tính khử.
C. MS có tính oxy hóa.
D. PS có tính oxy hóa.

Câu 30. Phản ứng Fehling được thực hiện trong môi trường:
A. Acid mạnh.
B. Base mạnh.
C. Có enzyme xúc tác.
D. NaCl 0,9%.

Câu 31. Khi thực hiện phản ứng Fehling cần:
A. Đun sôi cách thủy 5 phút.
B. Đun sôi cách thủy 3 phút.
C. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.
D. Ủ ở 37^0C trong 3 phút.

Câu 32. Nguyên tắc của phản ứng Molish là:
A. Các loại protid đều cho kết tủa đỏ gạch với Naphtol trong H_2SO_4 đậm đặc.
B. Các loại glucid đều cho kết tủa đỏ gạch với Naphtol trong H_2SO_4 đậm đặc.
C. Các loại protid đều cho phức chất màu tím với Naphtol trong H_2SO_4 đậm đặc.
D. Các loại glucid đều cho phức chất màu tím với Naphtol trong H_2SO_4 đậm đặc.

Câu 33. Trong phản ứng màu của PS, Iod kết hợp với tinh bột cho màu:
A. Xanh dương.
B. Xanh lá cây.

C. Đỏ nâu.
D. Đỏ gạch.

Câu 34. Trong phản ứng màu của PS, Iod kết hợp với glycogen cho màu:
A. Xanh dương.
B. Xanh lá cây.
C. Đỏ nâu.
D. Đỏ gạch.

Câu 35. Trong phản ứng màu của PS, Iod kết hợp với tinh bột cho hiện tượng:
A. Xanh dương sau một thời gian màu đậm hơn.
B. Xanh dương sau một thời gian thì mất màu.
C. Đỏ nâu sau một thời gian thì màu đậm hơn.
D. Đỏ nâu sau một thời gian thì mất màu.

Câu 36. Trong phản ứng màu của PS, Iod kết hợp với glycogen cho hiện tượng:
A. Xanh dương sau một thời gian màu đậm hơn.
B. Xanh dương sau một thời gian thì mất màu.
C. Đỏ nâu sau một thời gian thì màu đậm hơn.
D. Đỏ nâu sau một thời gian thì mất màu.

Câu 37. Phương pháp Somoyi Nelson dùng để:
A. Định lượng glucose trong huyết tương.
B. Định lượng cholesterol toàn phần trong huyết tương.
C. Định lượng HDL – cholesterol trong huyết tương.
D. Định lượng LDL – cholesterol trong huyết tương.

Câu 38. Trong phương pháp Somoyi Nelson, phương pháp được sử dụng là:
A. Đo động học đa điểm.
B. Đo điểm cuối.
C. Pha loãng dần.
D. Đo động học 2 điểm.

Câu 39. Chất dùng để đo quang trong phương pháp Somoyi Nelson là:
A. Arsenomolybdat – Màu đỏ.
B. Arsenomolybdat – Màu xanh.
C. Oxid Molybdine – Màu đỏ.
D. Oxid Molybdine – Màu xanh.

Câu 40. Trong phương pháp Somoyi Nelson, huyết thanh được pha loãng:
A. 1/5.
B. 1/10.
C. 1/20.
D. 1/50.

Câu 41. Trong phương pháp Somoyi Nelson, trước khi cho dung dịch Asenomolybdat vào, ta cần:
A. Đun cách thủy 80^0C trong 20 phút rồi làm lạnh ngay.
B. Đun cách thủy 80^0C trong 30 phút rồi làm lạnh ngay.
C. Đun cách thủy 100^0C trong 20 phút rồi làm lạnh ngay.
D. Đun cách thủy 100^0C trong 30 phút rồi làm lạnh ngay.

Câu 42. Lượng glucose trong máu ở mức bình thường là:
A. 50 – 100 mg/dl.
B. 75 – 110 mg/dl.
C. 50 – 110 mg/dl.
D. 75 – 120 mg/dl.

Câu 43. Glucose máu tăng trong, NGOẠI TRỪ:
A. Basedow.
B. Nhược giáp.
C. Viêm tụy.

D. Đái tháo đường.

Câu 44. Glucose máu tăng trong, NGOẠI TRỪ:

A. Cường giáp.

B. U tủy thượng thận.

C. Xơ gan.

D. U não.

Câu 45. Glucose máu giảm trong:

A. Sau ăn.

B. Viêm màng não.

C. Cường tụy.

D. Đái tháo đường.

Câu 46. Phương pháp Benedict được dùng để:

A. Tìm glucose trong nước tiểu.

B. Định lượng glucose trong nước tiểu.

C. Tìm glucose trong máu.

D. Định lượng glucose trong máu.

Câu 47. Phương pháp Benedict là phương pháp:

A. Định lượng.

B. Định tính.

C. Bán định lượng.

D. Cả định lượng và định tính.

Câu 48. Phương pháp Benedict (+) khi:

A. Có ít tủa, thuốc thử vẩy màu xanh lá.

B. Có tủa màu vàng sẫm.

C. Có tủa đỏ gạch.

D. Có tủa nâu đậm.

Câu 49. Phương pháp Benedict (++) khi:

A. Có ít tủa, thuốc thử vẩy màu xanh lá.

B. Có tủa màu vàng sẫm.

C. Có tủa đỏ gạch.

D. Có tủa nâu đậm.

Câu 50. Phương pháp Benedict (+++) khi:

A. Có ít tủa, thuốc thử vẩy màu xanh lá.

B. Có tủa màu vàng sẫm.

C. Có tủa đỏ gạch.

D. Có tủa nâu đậm.

Câu 51. Phương pháp Benedict (++++) khi:

A. Có ít tủa, thuốc thử vẩy màu xanh lá.

B. Có tủa màu vàng sẫm.

C. Có tủa đỏ gạch.

D. Có tủa nâu đậm.

Câu 52. Phương pháp Benedict (+) thì:

A. Glucose < 3 g/L.

B. Glucose < 5 g/L.

C. Glucose từ 5 – 10 g/L.

D. Glucose từ 10 – 20 g/L.

Câu 53. Phương pháp Benedict (++) thì:

A. Glucose < 3 g/L.

B. Glucose < 5 g/L.

C. Glucose từ 5 – 10 g/L.

D. Glucose từ 10 – 20 g/L.

Câu 54. Phương pháp Benedict (+++) thì:

A. Glucose < 3 g/L.

B. Glucose < 5 g/L.
C. Glucose từ 5 – 10 g/L.
D. Glucose từ 10 – 20 g/L.

Câu 55. Phương pháp Benedict (++++) thì:
A. Glucose > 20 g/L.
B. Glucose > 25 g/L.
C. Glucose từ 5 – 10 g/L.
D. Glucose từ 10 – 20 g/L.

Câu 56. Phản ứng dùng phương pháp đo điểm cuối, NGOẠI TRỪ:
A. Phản ứng định lượng Cholesterol toàn phần.
B. Phản ứng Biuret.
C. Phản ứng định lượng AST.
D. Phản ứng định lượng Triglycerid.

Câu 57. Trong phản ứng định lượng Cholesterol toàn phần, thuốc thử enzyme KHÔNG bao gồm:
A. Cholesterol Esterase.
B. Cholesterol Oxydase.
C. Catalase.
D. Peroxydase.

Câu 58. Trong phản ứng định lượng Cholesterol toàn phần, chất được tạo cuối cùng là:
A. Quinoneimine – Hồng cánh sen.
B. Quinoneimine – Xanh tím.
C. Quinone – Hồng cánh sen.
D. Quinone – Xanh tím.

Câu 59. Trong phản ứng định lượng Cholesterol toàn phần, sau khi cho thuốc thử và mẫu thử vào ống nghiệm:
A. Đun cách thủy 100^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
B. Đun cách thủy 80^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
C. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.
D. Ủ ở 37^0C trong 10 phút.

Câu 60. Trong phản ứng định lượng Cholesterol toàn phần, nồng độ cholesterol cao hơn ___ thì phải pha loãng:
A. 250 mg/dl.
B. 500 mg/dl.
C. 750 mg/dl.
D. 1000 mg/dl.

Câu 61. Trong phản ứng định lượng Cholesterol toàn phần, nồng độ cholesterol cao hơn 750 mg/dl thì phải pha loãng:
A. 2 lần.
B. 3 lần.
C. 4 lần.
D. 5 lần.

Câu 62. Ở người bình thường, Choslesterol toàn phần ở mức:
A. 50 – 100 mg/dl.
B. 50 – 150 mg/dl.
C. 150 – 250 mg/dl.
D. 150 – 260 mg/dl.

Câu 63. Tăng Cholesterol toàn phần tiên phát gặp khi:
A. Vàng da tắc mật.
B. Hội chứng thận hư.
C. Suy giáp tiên phát.
D. Tăng lipid gia đình.

Câu 64. Cholesterol toàn phần tăng trong, NGOẠI TRỪ:

A. Loạn glycogen gan.
B. Suy giáp.
C. Gan bị tổn thương nặng.
D. Rối loạn chuyển hóa lipid.

Câu 65. Cholesterol toàn phần tăng trong:
A. Thiếu dinh dưỡng.
B. Cường giáp.
C. Gan bị tổn thương nặng.
D. Rối loạn chuyển hóa lipid.

Câu 66. Triglycerid trong mẫu thử được định lượng theo phương pháp:
A. Đo động học đa điểm.
B. Đo điểm cuối.
C. Pha loãng dần.
D. Đo động học 2 điểm.

Câu 67. Trong phản ứng định lượng Triglycerid, chất được tạo cuối cùng là:
A. Quinoneimine – Hồng cánh sen.
B. Quinoneimine – Xanh tím.
C. Quinone – Hồng cánh sen.
D. Quinone – Xanh tím.

Câu 68. Trong phản ứng định lượng Triglycerid có sữ dụng enzyme, NGOẠI TRỪ:
A. Catalase.
B. Peroxydase.
C. Lipase.
D. Glycerokinase.

Câu 69. Trong phản ứng định lượng Triglycerid, sau khi cho thuốc thử và mẫu thử vào ống nghiệm:
A. Đun cách thủy 100^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
B. Đun cách thủy 80^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
C. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.
D. Ủ ở 37^0C trong 10 phút.

Câu 70. Phức màu trong phản ứng định lượng Triglycerid không còn chính xác sau:
A. 15 phút.
B. 30 phút.
C. 45 phút.
D. 60 phút.

Câu 71. Trong phản ứng định lượng Triglycerid, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, NGOẠI TRỪ:
A. Hb > 10 g/L.
B. Hb > 10 mg/dL.
C. Bilirubin > 40 mg/dL.
D. Bilirubin > 0,4 g/L.

Câu 72. Trong phản ứng định lượng Triglycerid, giá trị Triglycerid trong máu của người bình thường là:
A. 100 – 150 mg/dL.
B. 150 – 200 mg/dL.
C. 200 – 250 mg/dL.
D. 250 – 300 mg/dL.

Câu 73. Triglycerid nếu quá _____có thể dẫn đến viêm tụy cấp tính:

A. 10 mmol/L.
B. 11 mmol/L.
C. 12 mmol/L.
D. 13 mmol/L.

Câu 74. Triglycerid tăng trong:
A. Xơ gan do rượu.
B. Suy kiệt.
C. Cường giáp.
D. Xơ gan.

Câu 75. Độ tuyến tính của phản ứng định lượng triglycerid là:
A. 9,74 – 562 mg/dL.
B. 9,74 – 1062 mg/dL.
C. 8,74 – 562 mg/dL.
D. 8,74 – 1062 mg/dL.

Câu 76. HDL – Cholesterol trong mẫu thử được định lượng theo phương pháp:
A. Đo động học đa điểm.
B. Đo điểm cuối.
C. Pha loãng dần.
D. Đo động học 2 điểm.

Câu 77. Trong thí nghiệm định lượng HDL – Cholesterol trong máu, các thành phần sau bị bất hoạt do PVS/PEGME, NGOẠI TRỪ:
A. Chylomicrons.
B. Triglyceride.
C. LDL – Cholesterol.
D. VLDL – Cholesterol.

Câu 78. Trong phản ứng định lượng HDL – Cholesterol, chất được tạo cuối cùng là:
A. Quinoneimine – Hồng cánh sen.
B. Quinoneimine – Xanh tím.
C. Quinone – Hồng cánh sen.
D. Quinone – Xanh tím.

Câu 79. Trong phản ứng định lượng HDL – Cholesterol, sau mỗi lần thêm thuốc thử thì:
A. Đun cách thủy 100^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
B. Đun cách thủy 80^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
C. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.
D. Ủ ở 37^0C trong 10 phút.

Câu 80. Trong phản ứng định lượng HDL – Cholesterol, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, NGOẠI TRỪ:
A. Hb > 10 g/L.
B. Bilirubin > 30 mg/dL.
C. Bilirubin > 40 mg/dL.
D. Triglycerid > 2000 mg/dL.

Câu 81. Trong phản ứng định lượng HDL – Cholesterol, độ tuyến tính:
A. 1,9 – 153 mg/dL.
B. 1,9 – 193 mg/dL.
C. 1,5 – 153 mg/dL.
D. 1,5 – 193 mg/dL.

Câu 82. Trong phản ứng định lượng HDL – Cholesterol, giá trị bình thường ở nam là:
A. 35,3 – 79,5 mg/dL.
B. 35,3 – 88 mg/dL.
C. 42 – 88 mg/dL.
D. 42 – 79,5 mg/dL.

Câu 83. Trong phản ứng định lượng HDL – Cholesterol, giá trị bình thường ở nam là:
A. 35,3 – 79,5 mg/dL.
B. 35,3 – 88 mg/dL.
C. 42 – 88 mg/dL.
D. 42 – 79,5 mg/dL.
Câu 84. HDL – Cholesterol tăng:
A. Giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.
B. Làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.
C. Trong bệnh béo phì.
D. Khi hút thuốc lá.
Câu 85. Trong phản ứng định lượng LDL – Cholesterol, thuốc thử enzyme 2 là:
A. CHE + CHO.
B. Catalase.
C. Peroxydase.
D. Oxydase.
Câu 86. Trong phản ứng định lượng LDL – Cholesterol, sau mỗi lần thêm thuốc thử thì:
A. Đun cách thủy 100^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
B. Đun cách thủy 80^0C trong 20 phút sau đó làm lạnh nhanh.
C. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.
D. Ủ ở 37^0C trong 10 phút.
Câu 87. Nồng độ LDL – Cholesterol bình thường là:
A. < 120 mg/dL.
B. < 130 mg/dL.
C. < 140 mg/dL.
D. < 150 mg/dL.
Câu 88. Điều kiện để áp dụng công thức tính nồng độ LDL – Cholesterol dựa trên nồng độ các loại lipid còn lại là:
A. Triglycerid > 400 mg/dL.
B. Cholesterol toàn phần > 400 mg/dL.
C. Triglycerid < 400 mg/dL.
D. Cholesterol toàn phần < 400 mg/dL.
Câu 89. Phản ứng tìm Ceton trong nước tiểu (+) khi:
A. Phức chất màu tím.
B. Phức chất màu đỏ.
C. Kết tủa màu đỏ gạch.
D. Kết tủa màu đỏ nâu.
Câu 90. Trong nước tiểu bình thường có thể có:
A. Glucose.
B. Ceton.
C. Hb.
D. Bilirubin.
Câu 91. Chọn tập hợp gồm các chất hữu cơ bình thường có trong nước tiểu:
A. Acid uric, ure, glucose.
B. Protein, ure, aceton.
C. Ure, creatinin, acid uric.
D. Ure, acid uric, hemoglobin.
Câu 92. Nước tiểu có ceton khi, NGOẠI TRỪ:
A. Vận động cơ nhiều.
B. Cushing.
C. Bệnh đái tháo đường nặng.
D. Viêm tụy.

Câu 93. Phản ứng Biuret dùng để:
A. Định lượng protein toàn phần trong huyết thanh.
B. Định lượng acid uric trong huyết thanh.
C. Định lượng bilirubin trong huyết thanh.
D. Định lượng HDL – Cholesterol trong huyết thanh.

Câu 94. Trong môi trường kiềm, protein trong huyết thanh phản ứng với Cu++ tạo thành phức màu:
A. Hồng cánh sen.
B. Màu tím hồng.
C. Màu đỏ.
D. Màu nâu đỏ.

Câu 95. Trong phản ứng định lượng protein trong huyết thanh, sau khi cho chất thử và thuốc thử vào ống nghiệm:
A. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.
B. Ủ ở 37^0C trong 10 phút.
C. Để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong 10 phút.
D. Để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong 20 phút.

Câu 96. Nồng độ protein huyết thanh bình thường là:
A. 50 – 60 g/L.
B. 60 – 70 g/L.
C. 60 – 80 g/L.
D. 70 – 80 g/L.

Câu 97. Nồng độ protein huyết thanh giảm trong, NGOẠI TRỪ:
A. Sốt kéo dài, mất nước liên tục.
B. Xơ gan.
C. Hội chứng thận hư.
D. Mất máu.

Câu 98. Nồng độ protein huyết thanh tăng trong:
A. Hội chứng thận hư.
B. Mất máu.
C. Bệnh Addison.
D. Xơ gan, viêm gan.

Câu 99. Acid uric trong mẫu thử được định lượng theo phương pháp:
A. Đo động học đa điểm.
B. Đo điểm cuối.
C. Pha loãng dần.
D. Đo động học 2 điểm.

Câu 100. Enzyme cần cho phản ứng định lượng acid uric là:
A. Urease.
B. Urinase.
C. Catalase.
D. Oxydase.

Câu 101. Trong phản ứng định lượng acid uric, nếu mẫu thử là nước tiểu thì cần pha loãng:
A. 3 lần.
B. 10 lần.
C. 50 lần.
D. 100 lần.

Câu 102. Trong phản ứng định lượng acid uric, chất được tạo cuối cùng là:
A. Quinoneimine dye – Hồng cánh sen.
B. Quinoneimine – Xanh tím.
C. Quinone – Hồng cánh sen.

D. Quinone – Xanh tím.

Câu 103. Trong phản ứng định lượng acid uric, khi cho thuốc thử và mẫu thử vào ống nghiệm:

A. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.

B. Ủ ở 37^0C trong 10 phút.

C. Để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong 10 phút.

D. Để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong 20 phút.

Câu 104. Phức màu trong phản ứng định lượng acid uric không còn chính xác sau:

A. 15 phút.

B. 30 phút.

C. 45 phút.

D. 60 phút.

Câu 105. Trong phản ứng định lượng acid uric, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, NGOẠI TRỪ:

A. Hb > 10 g/L.

B. Bilirubin > 30 mg/dL.

C. Bilirubin > 40 mg/dL.

D. Triglycerid > 2000 mg/dL.

Câu 106. Trong định lượng acid uric huyết thanh/huyết tương, giá trị bình thường ở nam là:

A. 3,5 – 7,2 mg/dL.

B. 3,5 – 5 mg/dL.

C. 2,6 – 6 mg/dL.

D. 2,6 – 7,2 mg/dL.

Câu 107. Trong định lượng acid uric huyết thanh/huyết tương, giá trị bình thường ở nữ là:

A. 3,5 – 7,2 mg/dL.

B. 3,5 – 5 mg/dL.

C. 2,6 – 6 mg/dL.

D. 2,6 – 7,2 mg/dL.

Câu 108. Trong định lượng acid uric nước tiểu, giá trị bình thường là:

A. 250 – 500 mg/24 giờ.

B. 250 – 750 mg/24 giờ.

C. 500 – 750 mg/24 giờ.

D. 500 – 600 mg/24 giờ.

Câu 109. Nguyên nhân tiên phát làm tăng acid uric máu và nước tiểu là:

A. Bệnh Gout.

B. Bệnh đa hồng cầu, bạch cầu cấp.

C. Điều trị bằng tia X, chất phóng xạ.

D. Viêm thận mãn.

Câu 110. Độ tuyến tính của định lượng acid uric là:

A. > 20 mg/dL.

B. < 20 mg/dL.

C. 0,49 – 25 mg/dL.

D. 5 -25 mg/dL.

Câu 111. Ure trong mẫu thử được định lượng theo phương pháp:

A. Đo động học đa điểm.

B. Đo điểm cuối.

C. Pha loãng dần.

D. Đo động học 2 điểm.

Câu 112. Enzyme nào cần trong phản ứng định lượng ure:

A. Urease.

B. Urinase.

C. Catalase.

D. Oxydase.

Câu 113. Trong phản ứng định lượng ure, nếu mẫu thử là nước tiểu thì cần pha loãng:

A. 3 lần.

B. 10 lần.

C. 50 lần.

D. 100 lần.

Câu 114. Trong phản ứng định lượng ure, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, NGOẠI TRỪ:

A. Hb > 7,5 g/L.

B. Bilirubin > 30 mg/dL.

C. Bilirubin > 40 mg/dL.

D. Triglycerid > 2000 mg/dL.

Câu 115. Ure máu bình thường ở người lớn là:

A. 17 – 43 mg/dL.

B. 11 – 36 mg/dL.

C. 15 – 36 mg/dL.

D. 18 – 45 mg/dL.

Câu 116. Ure máu bình thường ở trẻ 1 – 3 tuổi là:

A. 11 – 36 mg/dL .

B. 17 – 43 mg/dL.

C. 15 – 36 mg/dL.

D. 18 – 45 mg/dL.

Câu 117. Ure máu bình thường ở trẻ 4 – 13 tuổi là:

A. 17 – 43 mg/dL.

B. 11 – 36 mg/dL.

C. 15 – 36 mg/dL.

D. 18 – 45 mg/dL.

Câu 118. Ure máu bình thường ở trẻ 14 – 19 tuổi là:

A. 17 – 43 mg/dL.

B. 11 – 36 mg/dL.

C. 18 – 36 mg/dL.

D. 18 – 45 mg/dL.

Câu 119. Ure nước tiểu bình thường là:

A. 15 – 26g/24 giờ.

B. 26 – 43g/24 giờ.

C. 26 – 35g/24 giờ.

D. 35 – 43g/24 giờ.

Câu 120. Ure máu / creatinin máu bình thường là:

A. 10 – 20 [(mg/dl)/(mg/dl)].

B. 20 – 35 [(mg/dl)/(mg/dl)].

C. 35 – 45 [(mg/dl)/(mg/dl)].

D. 45 – 55 [(mg/dl)/(mg/dl)].

Câu 121. Ure máu tăng trong trường hợp:

A. Chức năng lọc của cầu thận giảm.

B. Suy gan.

C. Chế độ ăn thiếu protid.

D. Giảm thoái hóa protid.

Câu 122. Các bệnh lý sau làm tăng ure máu, NGOẠI TRỪ:

A. Gan tổn thương nặng.

B. Hội chứng thận cấp tính.

C. Tắc nghẽn đường tiểu do hẹp đường tiểu.

D. Viêm cầu thận cấp, viêm ống thận cấp.

Câu 123. Trong trường hợp thai nghén, chọn phát biểu đúng:

A. Nồng độ protein toàn phần trong huyết thanh bình thường.

B. Nồng độ protein toàn phần trong huyết thanh giảm.

C. Nồng độ ure trong huyết thanh tăng.

D. Nồng độ ure trong huyết thanh giảm.

Câu 124. Trong phản ứng định lượng creatinin, nếu mẫu thử là nước tiểu thì cần pha loãng:

A. 3 lần.

B. 10 lần.

C. 50 lần.

D. 100 lần.

Câu 125. Trong phương pháp định lượng Creatinin, phương pháp được sử dụng là:

A. Đo động học đa điểm.

B. Đo điểm cuối.

C. Pha loãng dần.

D. Đo động học 2 điểm.

Câu 126. Trong phản ứng định lượng creatinin, khi creatinin gặp picric acid trong môi trường kiềm sẽ tạo thành phức hợp tên là:

A. Creatin.

B. Creatinin.

C. Creatin phosphat.

D. Creatinin – picrate.

Câu 127. Trong phản ứng định lượng creatinin, khi creatinin gặp picric acid trong môi trường kiềm sẽ tạo thành phức hợp có màu:

A. Vàng cam.

B. Hồng cánh sen.

C. Nâu đỏ.

D. Tím hồng.

Câu 128. Trong công thức tính độ thanh thải Creatinin, 1440 có ý nghĩa là:

A. Số giây trong 24 giờ.

B. Số giây trong một giờ.

C. Số phút trong 24 giờ.

D. Số phút trong một giờ.

Câu 129. Bình thường giá trị creatinin máu ở nam là:

A. 0,1 – 0,5 mg/dL.

B. 0,6 – 1,1 mg/dL.

C. 0,5 – 0,9 mg/dL.

D. 0,5 – 1,1 mg/dL.

Câu 130. Bình thường giá trị creatinin máu ở nữ là:

A. 0,1 – 0,5 mg/dL.

B. 0,6 – 1,1 mg/dL.

C. 0,5 – 0,9 mg/dL.

D. 0,5 – 1,1 mg/dL.

Câu 131. Bình thường giá trị creatinin nước tiểu là:

A. 1000 – 1200 mg/12 giờ.

B. 1000 – 1200 mg/24 giờ.

C. 1000 – 1500 mg/12 giờ.

D. 1000 – 1500 mg/24 giờ.

Câu 132. Độ thanh thải creatinin ở nam là:

A. 45 – 90 ml/phút.

B. 98 – 156 ml/phút.

C. 95 – 160 ml/phút.
D. 98 – 160 ml/phút.

Câu 133. Độ thanh thải creatinin ở nữ là:
A. 45 – 90 ml/phút.
B. 98 – 156 ml/phút.
C. 95 – 160 ml/phút.
D. 98 – 160 ml/phút.

Câu 134. Creatinin máu tăng trong các bệnh về:
A. Gan.
B. Thận.
C. Tụy.
D. Tiết niệu.

Câu 135. Giấy nhúng nước tiểu 3 thông số gồm:
A. pH, Glucose, Ceton.
B. pH, Ceton, Bilirubin.
C. Glucose, pH, Protein.
D. Glucose, Protein, Bilirubin.

Câu 136. Nhúng băng thử nước tiểu 3 thông số vào mẫu thử trong:
A. 2 giây.
B. 3 giây.
C. 4 giây.
D. 5 giây.

Câu 137. Băng thử nước tiểu 3 thông số không còn chính xác sau:
A. 1 phút.
B. 2 phút.
C. 3 phút.
D. 4 phút.

Câu 138. Nước tiểu bình thường có pH từ:
A. 7 – 9.
B. 5 – 7.
C. 5 – 9.
D. 6 – 7.

Câu 139. Khi thử nước tiểu 3 thông số, nước tiểu có glucose (+) khi kết quả có:
A. Màu xanh lam.
B. Màu nâu.
C. Màu vàng cam.
D. Màu xanh lá.

Câu 140. Khi thử nước tiểu 3 thông số, glucose cho kết quả âm tính giả khi:
A. Dụng cụ lẫn chất tẩy rửa.
B. Nồng độ ceton cao
C. Tỉ trọng nước tiểu cao.
D. Bệnh nhân dùng nhiều vitamin C.

Câu 141. Khi thử nước tiểu 3 thông số, nước tiểu có protein (+) khi kết quả có:
A. Màu xanh lam.
B. Màu nâu.
C. Màu vàng nhạt.
D. Màu xanh lá.

Câu 142. Khi thử nước tiểu 3 thông số, protein cho kết quả dương tính giả khi:
A. pH nước tiểu acid.
B. Nước tiểu bệnh nhân quá trong.
C. Dụng cụ chứa nước tiểu có Acetat ammonium.

D. Ở một số bệnh nhân dùng nhiều vitamin C.

Câu 143. pH thấp nhất lúc:

A. Lúc ngủ dậy.

B. Sau bữa ăn 2 giờ.

C. Khoảng 14 – 16 giờ.

D. Bất kỳ lúc nào.

Câu 144. pH cao nhất lúc:

A. Lúc ngủ dậy.

B. Sau bữa ăn.

C. Sau khi vận động.

D. Bất kỳ lúc nào.

Câu 145. Nước tiểu lấy để thử protein tốt nhất là nước tiểu:

A. Lần đi tiểu đầu lúc sáng sớm.

B. Lần đi tiểu trong khoảng 9 – 10 giờ sáng.

C. Lần đi tiểu sau bữa ăn.

D. Lần đi tiểu trong khoảng 3 – 4 giờ chiều.

Câu 146. Trong thử nước tiểu 3 thông số, độ nhạy của thông số protein là:

A. 5 – 10 mg/dL.

B. 10 – 15 mg/dL.

C. 15 – 20 mg/dL.

D. 20 – 25 mg/dL.

Câu 147. Trong thử nước tiểu 3 thông số, độ nhạy của thông số glucose là:

A. 50 mg/dL.

B. 100 mg/dL.

C. 150 mg/dL.

D. 200 mg/dL.

Câu 148. Trong thử nước tiểu 10 thông số, thông số urobilinogen dựa trên nguyên tắc:

A. Muối diazonium + Urobilinogen + Aldehyde màu đỏ.

B. Muối diazonium + Urobilinogen + Aldehyde màu xanh.

C. Muối diazonium + Urobilinogen + Azo màu đỏ.

D. Muối diazonium + Urobilinogen + Azo màu xanh.

Câu 149. Trong thử nước tiểu 10 thông số, thông số bạch cầu đi tìm sự có mặt của men __ trong bạch cầu hạt:

A. Catalase.

B. Peroxydase.

C. Esterase.

D. Uricase.

Câu 150. Trong thử nước tiểu 10 thông số, cetone (+) có màu:

A. Màu xanh lá.

B. Màu đỏ.

C. Màu vàng.

D. Màu hồng.

Câu 151. Trong thử nước tiểu 10 thông số, độ nhạy của glucose là:

A. 50 – 75 mg/dL.

B. 75 – 100 mg/dL.

C. 75 – 125 mg/dL.

D. 75 – 150 mg/dL.

Câu 152. Trong thử nước tiểu 10 thông số, độ nhạy của bilirubin là:

A. 0,1 – 0,4 mg/dL.

B. 0,4 – 0,8 mg/dL.

C. 0,8 – 1,2 mg/dL.

D. < 1,2 mg/dL.

Câu 153. Trong thử nước tiểu 10 thông số, độ nhạy của cetone là:

A. 5 – 10 mg/dL.

B. 10 – 15 mg/dL.

C. 15 – 20 mg/dL.

D. 20 – 25 mg/dL.

Câu 154. Trong thử nước tiểu 10 thông số, độ nhạy của máu là:

A. 0,015 – 0,032 mg/dL.

B. 0,015 – 0,062 mg/dL.

C. 0,01 – 0,032 mg/dL.

D. 0,01 – 0,062 mg/dL.

Câu 155. Trong thử nước tiểu 10 thông số, độ nhạy của protein là:

A. 5 – 10 mg/dL.

B. 15 – 20 mg/dL.

C. 15 – 30 mg/dL.

D. 20 – 25 mg/dL.

Câu 156. Trong thử nước tiểu 10 thông số, độ nhạy của nitrite là:

A. < 0,06 mg/dL.

B. > 0,1 mg/dL.

C. 0,06 – 0,1 mg/dL.

D. 0,06 – 0,15 mg/dL.

Câu 157. Trong thử nước tiểu 10 thông số, độ nhạy của bạch cầu là:

A. 5 – 15 tế bào/µL.

B. 15 – 30 tế bào/µL.

C. 30 – 45 tế bào/µL.

D. 45 – 55 tế bào/µL.

Câu 158. Khi thực hiện phản ứng định lượng bilirubin toàn phần cần:

A. Đun sôi cách thủy 5 phút.

B. Đun sôi cách thủy 3 phút.

C. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.

D. Ủ ở 37^0C trong 3 phút.

Câu 159. Độ tuyến tính của phản ứng định lượng Bilirubin toàn phần là:

A. 0 – 15 mg/dL.

B. 0 – 20 mg/dL.

C. 15 – 25 mg/dL.

D. 15 – 30 mg/dL.

Câu 160. Giá trị Bilirubin toàn phần bình thường ở người lớn là:

A. < 2 mg/dL.

B. 2 – 3 mg/dL.

C. 3 – 4 mg/dL.

D. < 3 mg/dL.

Câu 161. Khi thực hiện phản ứng định lượng Bilirubin trực tiếp cần:

A. Đun sôi cách thủy 5 phút.

B. Đun sôi cách thủy 3 phút.

C. Ủ ở 37^0C trong 5 phút.

D. Ủ ở 37^0C trong 3 phút.

Câu 162. Độ tuyến tính của phản ứng định lượng Bilirubin trực tiếp là:

A. 0,18 – 20 mg/dL.

B. 0,18 – 23 mg/dL.

C. 0,18 – 30 mg/dL.

D. 0.18 – 40 mg/dL.

Câu 163. Khi vàng da trước gan:
A. Bilirubin GT bình thường, Bilirubin TT tăng.
B. Cả Bilirubin GT và TT đều tăng.
C. Bilirubin GT tăng, Bilirubin TT bình thường.
D. Bilirubin GT tăng, Bilirubin TT giảm.
Câu 164. Khi vàng da tại gan:
A. Bilirubin GT bình thường, Bilirubin TT tăng.
B. Cả Bilirubin GT và TT đều tăng.
C. Bilirubin GT tăng, Bilirubin TT bình thường.
D. Bilirubin GT tăng, Bilirubin TT giảm.
Câu 165. Khi vàng da sau gan:
A. Bilirubin GT bình thường, Bilirubin TT tăng.
B. Cả Bilirubin GT và TT đều tăng.
C. Bilirubin GT tăng, Bilirubin TT bình thường.
D. Bilirubin GT tăng, Bilirubin TT giảm.
Câu 166. Vàng da trước gan gây ra bởi, NGOẠI TRỪ:
A. Thiếu men G6DP.
B. Tắc ống dẫn mật.
C. Hồng cầu dễ vỡ.
D. Sốt rét.
Câu 167. Phản ứng Mayer dùng để:
A. Tìm Glucose trong nước tiểu.
B. Tìm Glucose trong máu.
C. Tìm Hemoglobin trong nước tiểu.
D. Tìm Creatinin trong nước tiểu.
Câu 168. Phản ứng Mayer dựa trên nguyên tắc, Hemoglobin có tác dụng như:
A. Peroxydase. B. Oxidase.
C. Lipase. D. Glucose oxidase.
Câu 169. Trong phản ứng Mayer, khi thuốc thử là Phenolphtalein, hiện tượng quan sát được là:
A. Cho phức hợp màu đỏ gạch.
B. Cho kết tủa đỏ gạch.
C. Cho phức hợp màu đỏ.
D. Cho kết tủa màu đỏ.
Câu 170. Trong phản ứng Mayer, sau _____không có hiện tượng thì xem như (-):
A. 1 phút B. 2 phút
C. 3 phút D. 4 phút
Câu 171. Trong phương pháp định lượng ALT/GPT, phương pháp được sử dụng là:
A. Đo động học đa điểm B. Đo điểm cuối
C. Pha loãng dần D. Đo động học 2 điểm
Câu 172. Nguyên tắc của phương pháp định lượng ALT/GPT là xác định hoạt độ men:
A. Guanine Aminotransferase.
B. Cytosine Aminotransferase.
C. Alanin Aminotransferase.
D. Thymin Aminotransferase.
Câu 173. Trong phương pháp định lượng ALT/GPT, nhiệt độ ủ là:

A. 37^0C.
B. Nhiệt độ phòng thí nghiệm.
C. 100^0C.
D. 80^0C.

Câu 174. Trong phương pháp định lượng ALT/GPT, yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm là:

A. Hb > 10 g/L, Bilirubin > 30 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.
B. Hb > 2,5 g/L, Bilirubin > 30 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.
C. Hb > 10 g/L, Bilirubin > 40 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.
D. Hb > 0,75 g/L, Bilirubin > 30 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.

Câu 175. Trong phương pháp định lượng ALT/GPT, tăng hoạt độ _____là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim:

A. Transaminase
B. Hepatopathies
C. Tranferase
D. Oxidase

Câu 176. Trong phương pháp định lượng ALT/GPT, tăng hoạt độ _____là dấu hiệu của loạn dưỡng cơ, tổn thương nội quan:

A. Transaminase
B. Hepatopathies
C. Tranferase
D. Oxidase

Câu 177. Trong định lượng ALT/GPT, nồng độ bình thường ở nam là:

A. ≤ 40 U/L
B. ≤ 34 U/L
C. ≤ 45 U/L.
D. ≤ 50 U/L.

Câu 178. Trong định lượng ALT/GPT, nồng độ bình thường ở nữ là:

A. ≤ 34 U/L
B. ≤ 45 U/L
C. ≤ 50 U/L.
D. ≤ 40 U/L.

Câu 179. Khi nồng độ ALT/GPT tăng > 10 lần là dấu hiệu của:

A. Viêm gan cấp.
B. Hội chứng thận hư
C. Nhồi máu cơ tim..
D. Hội chứng hủy tế bào.

Câu 180. Nhồi máu cơ tim khi:

A. GOT < GPT.
B. GOT = GPT.
C. GOT > GPT.
D. Chỉ liên quan đến GPT

Câu 181. Độ tuyến tính của phản ứng ALT/GPT là:

A. 4,4 -360 U/L
B. 3,3 -360 U/L
C. 4,4 -390 U/L
D. 3,3 -390 U/L

Câu 182. Nguyên tắc của phương pháp định lượng AST/GOT là xác định hoạt độ men:

A. Guanine Aminotransferase.
B. Aspartate Aminotransferase.
C. Alanin Aminotransferase.
D. Thymin Aminotransferase.

Câu 183. Trong phương pháp định lượng AST/GOT, nhiệt độ ủ là:

A. 37^0C.
B. Nhiệt độ phòng thí nghiệm.
C. 100^0C.
D. 80^0C.

Câu 184. AST hầu hết có ở:

A. Gan
B. Cơ bắp
C. Cơ tim
D. Tụy

Câu 185. Trong phương pháp định lượng AST/GOT, yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm là:

A. Hb > 10 g/L, Bilirubin > 30 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.
B. Hb > 2,5 g/L, Bilirubin > 30 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.
C. Bilirubin > 40 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.
D. Bilirubin > 30 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.

Câu 186. Trong định lượng AST/GOT, nồng độ bình thường ở nam là:

A. ≤ 40 U/L
B. ≤ 35 U/L

C. ≤ 45 U/L D. ≤ 50 U/L

Câu 187. Trong định lượng AST/GOT, nồng độ bình thường ở nữ là:

A. ≤ 40 U/L B. ≤ 34 U/L

C. ≤ 31 U/L D. ≤ 50 U/L

Câu 188. Độ tuyến tính của phản ứng AST/GOT là:

A. 3,84 -360 U/L B. 2,84 -360 U/L

C. 3,84 -390 U/L D. 2,84 -390 U/L

Câu 189. Nên xét nghiệm trong vòng ____sau khi lấy nước tiểu:

A. 01 giờ B. 02 giờ

C. 03 giờ D. 04 giờ

Câu 190. Cách lấy mẫu nước tiểu, NGOẠI TRỪ:

A. Bỏ phần nước tiểu đầu.

B. Không làm xét nghiệm cặn lắng với nước tiểu để trong tủ lạnh.

C. Tốt nhất nên lấy nước tiểu vào lúc sáng sớm.

D. Nước tiểu sau khi soi cặn lắng không thể làm xét nghiệm khác được.

Câu 191. Rót nước tiểu vào ống ly tâm tới:

A. ½ ống B. 2/3 ống

C. 3/4 ống D. 1/3 ống

Câu 192. Quay ly tâm với tốc độ bao nhiêu, trong bao lâu:

A. 1000 vòng/phút – 3 phút.

B. 1500 vòng/phút – 5 phút.

C. 1000 vòng/phút – 5 phút.

D. 1500 vòng/phút – 3 phút.

Câu 193. Để nhìn tổng quang trường, ta dùng:

A. Vật kính 10X B. Vật kính 20X

C. Vật kính 30X D. Vật kính 40X

Câu 194. Để xác định loại tế bào, ta dùng:

A. Vật kính 10X B. Vật kính 20X

C. Vật kính 30X D. Vật kính 40X

Câu 195. Bạch cầu có kích thước:

A. Lớn gấp 1,5 đến 2 lần hồng cầu.

B. Lớn gấp 1,5 đến 3 lần hồng cầu.

C. Lớn gấp 2 lần hồng cầu.

D. Lớn gấp 3 lần hồng cầu.

Câu 196. Phương pháp Wohlgemuth dùng để:

A. Định lượng Amylase trong huyết thanh.

B. Định lượng CK-MB trong máu.

C. Định lượng Amylase trong nước tiểu.

D. Xác định hoạt độ Amylase trong nước tiểu.

Câu 197. Định nghĩa 1 đơn vị Wohlgemuth: là lượng amylase tối thiểu có khả năng thủy phân 2 ml dung dịch hồ tinh bột 0,1% ở 37^0C trong 30 phút. Định nghĩa trên: *(1ml)*

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 198. Sau khi khi cho nước tiểu và hồ tinh bột vào ống nghiệm:

A. Đun sôi 100^0C cách thủy 30 phút.

B. Đun sôi 100^0C cách thủy 20 phút.

C. Đun sôi 37^0C cách thủy trong 30 phút.

D. Đun sôi ở 37^0C cách thủy trong 20 phút.

Câu 199. Hoạt độ Amylase trong nước tiểu bình thường:

A. 8 – 64 đơn vị Wohlgemuth.

B. 8 – 32 đơn vị Wohlgemuth.

C. 8 – 16 đơn vị Wohlgenmuth.

D. 8 – 128 đơn vị Wohlgemuth.

Câu 200. Amylase tăng quá 200 đơn vị trong trường hợp:

A. Viêm gan B. Viêm tụy cấp

C. Xơ gan D. Suy thận

Câu 201. Trong phương pháp định lượng Amylase trong huyết thanh, phương pháp được sử dụng là:

A. Đo động học đa điểm B. Đo điểm cuối

C. Pha loãng dần D. Đo động học 2 điểm

Câu 202. Trong phương pháp định lượng Amylase trong huyết thanh, độ tuyến tính là:

A. 10,8 – 1400 U/L B. 9,8 – 1400 U/L

C. 10,8 – 1500 U/L D. 9,8 – 1500 U/L

Câu 203. Amylase trong huyết thanh bình thường:

A. < 50 U/L B. < 60 U/L

C. < 70 U/L D. < 80 U/L

Câu 204. Amylase trong nước tiểu bình thường là:

A. < 300 U/L B. < 400 U/L

C. < 500 U/L D. < 600 U/L

Câu 205. Trong phương pháp định lượng Amylase trong huyết thanh, yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm là:

A. Hb > 10 g/L, Bilirubin > 40 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.

B. Hb > 2,5 g/L, Bilirubin > 40 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.

C. Bilirubin > 40 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.

D. Bilirubin > 30 mg/dL, Triglycerides > 2000 mg/dL.

Câu 206. Trong phương pháp định lượng CK-MB trong máu, độ tuyến tính là:

A. 6,1 – 1400 U/L B. 7,1 – 1400 U/L

C. 6,1 – 1200 U/L D. 7,1 – 1200 U/L

Câu 207. Trong định CK-MB trong máu, giá trị bình thường:

A. ≤ 20 IU/L. B. ≤ 25 IU/L.

C. ≤ 30 IU/L. D. ≤ 35 IU/L.

Câu 208. Thời gian bán hủy của CK-MB trong huyết tương là khoảng:

A. 06 giờ. B. 12 giờ.

C. 24 giờ. D. 32 giờ.

Câu 209. CK-MB dùng để chẩn đoán sớm nhồi máu cơ tim, vì ___CK-MB luôn tăng cao:

A. 2-4 giờ. B. 4-6 giờ.

C. 8-12 giờ. D. 12-24 giờ.

Câu 210. Nguyên tắc của phản ứng Rivalta là:

A. Protein bị đông kết bởi acid sunfuric.

B. Protein bị kết tủa bởi acid sunfuric.

C. Protein bị đông kết bởi acid acetic.

D. Protein bị kết tủa bởi acid sunfuric.

Câu 211. Rivanlta (+) có nghĩa:

A. Dịch tiết – Protein > 30 g/L. B. Dịch thấm – Protein > 30 g/L

C. Dịch tiết – Protein < 30 g/L D. Dịch thấm – Protein < 30 g/L.

Câu 212. Rivanlta (-) có nghĩa:

A. Dịch tiết – Protein > 30 g/L. B. Dịch thấm – Protein > 30 g/L

C. Dịch tiết – Protein < 30 g/L D. Dịch thấm – Protein < 30 g/L.

Câu 213. Cho biết: V_{NT} / 24 giờ = 1400 ml:

- Nồng độ Creatinin / NT: 90 mg /dl.
- Nồng độ Creatinin / HT: 1,2 mg/dl

→ Tính Creatinin Clearance ? $C = \frac{90*1400}{1,2*1440} = 72,916$ ml/phút

Câu 214. Màu của phản ứng Molisd:

A. Xanh B. Đỏ

C. Tím D. Hồng

Câu 215. Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm định lượng amylase huyết thanh, Ngoại trừ:

A. Hb > 0,25 g/dl B. Bilirubin > 40mg/dl

C. Triglycerid > 2mg/dl D. Triglycerid < 2mg/dl

Câu 216. **Cholesterol ester---> cholesterol emzym xúc tác là:**

A. Cholesterol Esterase
B. Glycerol -3-phosphate oxidase
C. Cholesterol Oxydase
D. Peroxydase

Câu 217. **Phương pháp Benedict:**

A. +, glucose < 5g/l -> màu xanh lá
B. ++, glucose < 5-10g/l ->màu vàng sẫm
C. +++, glucose < 10-20g/l-> màu đỏ gạch
D. ++++, glucose > 20g/l ->màu nâu đạm
E. (-) -> màu lam, trong suốt

Câu 218. **Giá trị huyết thanh/huyết tương bình thường Nam: (Chọn nhiều đáp án)**

A. 210-432 umol/l
B. 156-360 umol/l
C. 2,6-6,0 mg/l
D. 3,5-7,2 mg/dl
E. 250-750 mg/24 giờ
F. 1,5-4,5 mmol/24 giờ

Câu 219. **Phản ứng định lượng LDL có bao nhiêu giai đoạn:**

A. 1 giai đoạn
B. 2 giai đoạn
C. 3 giai đoạn
D. 4 giai đoạn

Câu 220. **Thời gian để dung dịch đo protein toàn phần trong huyết thanh:**

A. 10 phút
B. 15 phút
C. 20 phút
D. 25 phút

Câu 221. **Trong viêm tụy cấp amylase niệu có trị số tối đa lúc:**

A. 6-12 giờ
B. 12-24 giờ
C. 24-36giờ
D. 12-36 giờ

Câu 222. **Cholesterol giảm trong:**

A. Hội chứng thận hư
B. Vàng da tắc mật
C. Suy tuyến giáp
D. Cường giáp

Câu 223. **Quinonemine có màu gì:**

A. Xanh
B. Đỏ
C. Tím
D. Hồng

Câu 224. **Giá trị bình thường của amylase trong huyết thanh và nước tiểu:**

A. < 80 U/L, < 500 U/L
B. > 80 U/L, < 500 U/L
C. < 80 U/L, >500 U/L
D. > 80 U/L, > 500 U/L

Câu 225. **Sản phẩm trung gian của quá trình thủy phân tinh bột hoặc glycogen:**

A. Dextrin
B. Dextran
C. Pyurat
D. Asparat

Câu 226. **Giá trị huyết thanh/huyết tương bình thường Nữ: (Chọn nhiều đáp án)**

A. 210-432 umol/l
B. 156-360 umol/l
C. 2,6-6,0 mg/l
D. 3,5-7,2 mg/dl
E. 250-750 mg/24 giờ
F. 1,5-4,5 mmol/24 giờ

Câu 227. **Giá trị bình thường của tryglycerid:**

A. 150-260 mg/dl
B. 150-200 mg/dl
C. < 130 mg/dl
D. 1,9-193 mg/dl

Câu 228. **Nguồn gốc acid Uric:**

A. Base purin
B. Tế bào chết hàng loạt
C. NH3
D. Acid axetic

Câu 229. **Các loại Emzym có trong phản ứng định lượng LDL: (Chọn nhiều đáp án)**

A. Cholesterol Esterase
B. Glycerol -3-phosphate oxidase
C. Cholesterol Oxydase
D. Peroxydase
E. Glycerokinase
F. PVS/PEGME
G. Catalase
H. Lipase LPL

L. CHE+CHO

Câu 230. **Cho các phản ứng:**

* Phản ứng Molish: glucose, fructose, saccharose, hồ tinh bột, lactose
* Phản ứng fehling: glucose, fructose, lactose

Câu 231. **Protein trong huyết thanh phản ứng với Cu++ tạo phức hợp màu gì:**

A. Tím hồng
B. Xanh tím
C. Nâu đỏ
D. Cam

Câu 232. **Các bước sóng:**

A. Cholesterol 500 nm
B. Tryglycerid 505nm
C. LDL 500 nm
D. HDL 578 nm

Câu 233. **Nồng độ protein trong huyết thanh bình thường là:**

A. 50-80 g/L
B. 60-80 g/L
C. 70-80 g/L
D. 80-90 g/L

Câu 234. **Tryglycerid tăng bao nhiêu có thể dẫn đến viêm tụy cấp tính:**

A. 11 mmol/l
B. 11 ml/l
C. 11 mg/dl
D. 11mg/l

Câu 235. **Độ ổn đinh huyết tương/huyết thanh -20^{0}C trong xét nghiệm tryglycerid là:**

A. 3 tháng
B. 6 tháng
C. 9 tháng
D. ít nhất 1 năm

Câu 236. **Glucose tăng khi:** u não, u tủy thượng thận

Câu 237. **Dung dịch để đắp lên vết phỏng do vật nóng:**

A. Acid picric
B. Acid acetic
C. Acid boric
D. Na bicarbonate 1%

Câu 238. **Thuốc thử trong phản ứng nelson:**

A. Naphtol 1%
B. Enediols
C. Arsenomolydat
D. Benedict

Câu 239. **Tăng nhu cầu protein sinh lý gặp trong:** *(Còn lại là tăng bệnh lý)*

A. Tiêu chảy
B. U đa tủy
C. Thai nghén
D. Sốt kéo dài

Câu 240. **Thời gian ủ trong định lượng tryglycerid:**

A. Không cần ủ
B. 1 phút 37^{0}C
C. 5 phút 37^{0}C
D. 10 phút 37^{0}C

Câu 241. **Kết quả của phản ứng fehling:**

A. Dung dịch đỏ gạch
B. Kết tủa đỏ gạch
C. Kết tủa xanh lý
D. Dung dịch xanh dương

Câu 242. **Giá trị Acid Uric nước tiểu bình thường: (Chọn nhiều đáp án)**

A. 210-432 umol/l
B. 156-360 umol/l
C. 2,6-6,0 mg/l
D. 3,5-7,2 mg/dl
E. 250-750 mg/24 giờ
F. 1,5-4,5 mmol/24 giờ

Câu 243. **Bệnh lý lâm sàng làm tăng CK-MB, ngoại trừ:**

A. Nhồi máu cơ tim cấp
B. Loạn dưỡng cơ
C. Bỏng nhiệt
D. Suy thận

Câu 244. **Cholesterol---> cholesterol -3-one emzym xúc tác là:**

A. Cholesterol Esterase
B. Glycerol -3-phosphate oxidase
C. Cholesterol Oxydase
D. Peroxydase

Câu 245. **Thuốc thử phản ứng Wohlgemuth là:**

A. Nacl 9$^0/_{00}$, DD hồ tinh bột 1$^0/_{00}$, Iod N/50
B. Nacl 5$^0/_{00}$, DD hồ tinh bột 1$^0/_{00}$, Iod N/50
C. Nacl 9$^0/_{00}$, DD hồ tinh bột 1$^0/_{00}$, Iod N/10
D. Nacl 7,5$^0/_{00}$, DD hồ tinh bột 1$^0/_{00}$, Iod N/10

Câu 246. **Hóa chất phù hợp với từng loại xử trí là:**

A. Bỏng acid ở da Na carbonate 8% B. Bỏng kiềm ở da Acid picric 3%
C. Bỏng acid ở mắt Na bicarbonate 1% D. Bỏng kiềm ở mắt Acid boric 1%
E. Ngộ độc acid Na bicarbonate 1% F. Ngộ độc kiềm Acid boric 1%

Câu 247. Độ ổn định huyết tương/huyết thanh ở 4-8^{0}C là:
A. 2 ngày B. 5 ngày
C. 7 ngày D. 12 tuần

Câu 248. Endoamylase hay alpha-amylase có nguồn gốc từ:
A. Tuyến thượng thận B. Tuyến tụy
C. Tuyến giáp D. Tuyến cận giáp

Câu 249. Emzym trong định lượng ure:
A. Uricase B. Urecase
C. Urioxydase D. Ureoxydase

Câu 250. Giá trị bình thường glucose trong huyết tương
A. 65-100mg/dl (4,3-6.0 mmol/l) B. 65-100mg/l (4,3-6.0 mmol/l)
C. 75-100mg/dl (4,3-6.0 mmol/l) D. 75-100mg/l (4,3-6.0 mmol/l)

Câu 251. Trong phản ứng wohlgemuth ở ống **số 4** có độ pha loãng là
A. 1/8 B. 1/16
C. 1/32 D. 1/64

Câu 252. Trong phản ứng wohlgemuth ở ống **số 8** có độ pha loãng là
A. 0 B. 1/32
C. 1/64 D. 1/128

Câu 253. Độ ổn định huyết tương/ huyết thanh ở -20 độ c trong xét nghiệm HDL là
A. 2 ngày B. 5 ngày
C. 7 ngày D. 12 tuần

Câu 254. Thuốc thử trong phản ứng Molish:
A. Naphtol 1% B. Enediols
C. Arsenomolyddat D. Benedict

Câu 255. Thuốc thử Lugol 1% có thành phần.....+..... RỒI THÊM 100ML NƯỚC CẤT:
A. IOD 0,1G + 0,2G KI B. IOD 0,2G + 0,1G KI
C. IOD 1G + 2G KI D. IOD 2G + 1G KI

Câu 256. Giá trị bình thường của LDL
A. 150-260mg/dl B. 150-200mg/dl
C. <130 mg/dl D. 1,9-193 mg/dl

Câu 257. Các loại Emzym có trong phản ứng định lượng HDL: (Chọn nhiều đáp án)
A. Cholesterol Esterase B. Glycerol -3-phosphate oxidase
C. Cholesterol Oxydase D. Peroxydase
E. Glycerokinase F. PVS/PEGME
G. Catalase H. Lipase LPL
L. CHE+CHO

Câu 258. Emzym trong định lượng Acid uric
A. Uricase B. Urecase
C. Urioxydase D. Ureoxydase

Câu 259. Thể ceton gặp trong, ngoại trừ:
A. Đái tháo đường nặng B. Nhịn đói, nôn ói nhiều
C. Ăn nhiều đạm D. Cushing

Câu 260. Thuốc thử của phương pháp định lượng amylase huyết thanh
A. MES buffer, Natri chloride, sodium chlorid, potassium thiocyanate, Sodium azide, CNPG
B. NES buffer, cancium chloride, sodium chlorid, potassium thiocyanate
C. MES buffer, cancium chloride, sodium chlorid, potassium thiocyanate
D. MES buffer, cancium chloride, Natri chlorid, potassium thiocyanate

Câu 261. Tryglycerid tăng trong
A. Xơ gan B. Suy kiệt
C. Bệnh mạn tính D. Xơ gan do rượu

Câu 262. Phức hợp quinonemine được tạo thành nhớ xúc tác của emzym

A. Cholesterol Esterase
B. Glycerol -3- phosphate oxidase
C. Cholesterol Oxydase
D. Peroxydase

Câu 263. Nguyên tắc phản ứng xác định hoạt độ amylase trong nước tiểu

A. Phương pháp pha loãng dần nước tiểu để tìm lượng enzym tối thiểu phân hủy hết 2ml dd hồ tinh bột $1^0/_0$ ở 37^0C trong 30p

B. Phương pháp pha loãng dần nước tiểu để tìm lượng enzym tối thiểu phân hủy hết 2ml dd hồ tinh bột $1^0/_{00}$ ở 42^0C trong 30p

C. Phương pháp pha loãng dần nước tiểu để tìm lượng enzym tối thiểu phân hủy hết 2ml dd hồ tinh bột $1^0/_{00}$ ở 37^0C trong 40p

D. Phương pháp pha loãng dần nước tiểu để tìm lượng enzym tối thiểu phân hủy hết 2ml dd hồ tinh bột 10/00 ở 37^0C trong 30p

Câu 264. Để ngăn kết tủa acid uric ta làm:

A. 15ml NAOH 5M để giữ PH >8
B. 15ml NAOH 5M để giữ PH >6
C. 10ml NAOH 5M để giữ PH >8
D. 10ml NAOH 5M để giữ PH >6

Câu 265. Trong nhồi máu cơ tim CK-MB sẽ tăng cao nhất trong khoảng thời gian

A. 6-12 giờ
B. 12-18 giờ
C. 18-24 giờ
D. 23-36 giờ

Câu 266. Tỉ lệ pha loãng ure nước tiểu là

A. 1:9
B. 1:1
C. 1:100
D. 3:97

Câu 267.Tăng acid uric nguyên phát

A. Đa hồng cầu, bạch cầu cấp, u hạch
B. Xạ trị, hóa trị
C. Viêm thận, suy thận
D. Gout

Câu 268. Giá trị bình thường của HDL ở nam

A. 15-26mg/dl
B. 35,2-79,5mg/dl
C. 42-88 mg/dl
D. 1,9-193 mg/dl

Câu 269. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân tinh bột hoặc glycogen là

A. Manto, glucos
B. Sacaro, gluco
C. Manto, fructo
D. Fructo, glucos

Câu 270. Các loại Emzym có trong phản ứng định lượng CHOLESTEROL toàn phần trong máu: (Chọn nhiều đáp án)

A. Cholesterol Esterase
B. Glycerol -3-phosphate oxidase
C. Cholesterol Oxydase
D. Peroxydase
E. Glycerokinase
F. PVS/PEGME
G. Catalase
H. Lipase LPL
L. CHE+CHO

Câu 271. Giá trị bình thường của HDL ở nữ

A. 15-26mg/dl
B. 35,2-79,5mg/dl
C. 42-88 mg/dl
D. 1,9-193 mg/dl

Câu 272. HDL tăng có tác dụng

A. Giảm nguy cơ sơ vữa động mạch và bệnh mạch vành
B. Tăng nguy cơ sơ vữa động mạch và bệnh mạch vành
C. Chưa thấy mối liên hệ

Câu 273. Trong phản ứng wohlgemuth ống còn tinh bột có màu

A. Xanh dương
B. Màu trung gian
C. Không màu
D. Màu tím

Câu 274. QUINONE có màu gì?

A. Xanh tím
B. Hồng cánh sen
C. Đỏ gạch
D. Tím

Câu 275. Bảo quản huyết tương/ huyết thanh -20^0C trong xét nghiệm acid uric là

A. 3 tháng
B. 6 tháng
C.9 tháng
D. ít nhất 1 năm

Câu 276. Nguyên tắc phản ứng Rivalta

A. Protein bị đông kết bởi acid lactic
B. Protein bị đông kết bởi acid acetic

C. Protein bị đông kết bởi acid citrit
D. Protein bị đông kết bởi kiềm yếu

Câu 277.Các loại Emzym có trong phản ứng định lượng Triglycerid: (Chọn nhiều đáp án)

A. Cholesterol Esterase
B. Glycerol -3-phosphate oxidase
C. Cholesterol Oxydase
D. Peroxydase
E. Glycerokinase
F. PVS/PEGME
G. Catalase
H. Lipase LPL
L. CHE+CHO

Câu 278. Độ tuyến tính accid uric

A. 49-250 mg/dl
B. 0,49-25mg/dl
C. 0,49-25g/l
D. 0,49-25mmol/l

Câu 279. Khi nào glucose có trong nước tiểu?

A. Khi vượt ngưỡng 170 mg/dl hay 170mg%
B. Khi vượt ngưỡng 180 mg/dl hay 180mg%
C. Khi thấp hơn 180 mg/dl hay 180mg%
D. Bình thường glucose có trong nước tiểu.

Câu 280. Độ tuyến tính HDL

A. 15-26 mg/dl
B. 35,2-79,5 mg/dl
C. 42-88 mg/dl
D. 1,9-193 mg/dl

Câu 281. Giá trị bình thường của cholesterol

A. 150-260mg/dl
B. 150-200mg/dl
C. <130 mg/dl
D. 1,9-193 mg/dl

Câu 282. Tỉ lệ pha loãng acid uric nước tiểu là

A. 1:9
B. 1:1
C. 1:100
D. 3:97

Câu 283. Cholesterol tăng tiên phát trong:

A. Bệnh tăng lipid gia đình
B. Vàng da tắc mật
C. Suy tuyền giáp
D. Cường giáp

Câu 284. Độ bền màu của phản ứng acid uric là

A. 5 phút
B. 10 phút
C. 15 phút
D. 20 phút

Câu 285. Phương pháp định lượng amylase huyết thanh

A. Đo điểm cuối
B. Động học đa điểm
C. Động học
D. Pha loãng huyết thanh

Câu 286. Đơn vị Wohlgemuth là gì?

A. Là lượng amylase tối thiểu có khả năng thủy phân hết 1ml dd hồ tinh bột $1^0/_{00}$ ở 37^0C trong 30p
B. Là lượng amylase tối đa có khả năng thủy phân hết 1ml dd hồ tinh bột $1^0/_{00}$ ở 37^0C trong 30p
C. Là lượng amylase tối thiểu có khả năng thủy phân hết 1ml dd hồ tinh bột $1^0/_0$ ở 37^0C trong 30p
D. Là lượng amylase tối đa có khả năng thủy phân hết 1ml dd hồ tinh bột $1^0/_0$ ở 37^0C trong 30p

Câu 287. Độ tuyến tính của phương pháp định lượng amylase huyết thanh

A. 10.8-1500 U/L
B. 100.8 – 1500 U/L
C. 20.8- 1600 U/L
D. 18.8 – 1500 U/L

Câu 288. Định lượng amylase trong trường hợp nào sau đây không có giá trị chẩn đoán:

A. Suy gan
B. Viêm tụy cấp
C. Suy thận
D. Suy tim

Câu 289. Độ ổn định huyết tương/ huyết thanh ở 20-25^{0}C là

A. 2 ngày
B. 5 ngày
C. 7 ngày
D. 12 tuần

Câu 290. Phản ứng tìm ceton trong nước tiểu:

A. Ceton + Na nitroprussiat ---OH---> phức chất màu tím
B. Ceton + Na nitroprussiat ---H---> phức chất màu tím
C. Ceton + Na nitroprussiat ---OH---> phức chất màu hồng
D. Ceton + Na nitroprussiat ---H---> phức chất màu hồng

Câu 291. QUINONEMINE bền màu trong?

A. 15 phút
B. 30 phút
C. 60 phút
D. 2 giờ

Câu 292. **Để loại protein khỏi huyết tương ta làm ?**

A. Ly tâm 300 vòng/ phút trong 10 phút.
B. Ly tâm 3000 vòng/ phút trong 1 phút.
C. Ly tâm 3000 vòng/ phút trong 10 phút.
D. Ly tâm 30000 vòng/ phút trong 1 phút.

Câu 293. **Tăng protein gặp trong** *(còn lại là giảm)*

A. Xơ gan, viêm gan
B. Bệnh Addison
C. Hội chứng thận hư
D. Mất máu

Câu 294. **LDL tăng có tác dụng?**


A. Giảm nguy cơ sơ vữa động mạch và bệnh mạch vành
B. Tăng nguy cơ sơ vữa động mạch và bệnh mạch vành
C. Chưa thấy mối liên hệ

Câu 295. **Công thức tính nồng độ protein toàn phần trong huyết thanh**


A. C(g/l) = OD/ODo x 6,25x 10
B. C(g/l) = OD/ODo x 7,25x 10
C. C(g/l) = OD/ODo x 8,25x 10
D. C(g/l) = OD/ODo x 6,25

Câu 296. **Các bước sóng phù hợp:**

A. Protein toàn phần 530 nm
B. Ure 340 nm
C. Acid Uric 505nm
D. Creatinin 505 nm




TẠP TRÙNG, TẾ BÀO BIỂU MÔ THẬN, HỒNG CẦU



TẾ BÀO BIỂU MÔ ÂM ĐẠO




AMORPHOUS PHOSPHATE




TẾ BÀO BIỂU MÔ ÂM ĐẠO, HỒNG CẦU, TRIPLE PHOSPHATE




BẠCH CẦU



TẾ BÀO BIỂU MÔ THẬN-BẠCH CẦU



TRIPLE PHOSPHATE



CYSTINE

