# TRƯỜNG THCS LẠC ĐẠO – HƯNG YÊN


Hồ sơ học tập · Math Lab

| | |
|---|---|
| **Học sinh** | Bùi Minh Ngọc |
| **Lớp** | 8A4 |
| **Ngày chốt** | 02:17:34 17/10/2026 |

| BÀI ĐÃ LÀM | ĐÚNG TỪ ĐẦU | SAI TỪ ĐẦU | HOẠT ĐỘNG |
|---|---|---|---|
| **17** | **70** | **20** | **232** |
| đã nộp / luyện tập | câu / lượt luyện tập | câu / lượt luyện tập | phút ghi nhận |

Đúng/sai tính theo câu trắc nghiệm và lượt luyện tập. Bài tự luận tính theo từng câu được giao; điểm chi tiết ở trang bảng điểm.

## 01 Tổng quan điểm các đề




Thành tích sửa lỗi: Chưa được xếp hạng.

Nhận xét giáo viên: Gia đình cùng con đối chiếu các bài làm trong báo cáo, hoàn thành phần còn thiếu và xem lại các lỗi đã được ghi nhận. Những mục chưa có dữ liệu chưa đủ cơ sở để đánh giá; cần tiếp tục cập nhật bài làm trước khi kết luận về tiến bộ của con.

## 02 Tổng kết kiến thức

Xanh: từ 80% và ít nhất 3 câu; vàng: đang hình thành hoặc chưa đủ mẫu; đỏ: dưới 60% với ít nhất 3 câu. Kết quả sửa câu cũ không thay điểm đúng từ đầu.

| | |
|---|---|
| **Đơn thức** | 3/5 câu |
| **Cộng đa thức** | 4/5 câu |
| **Nhân đa thức** | 5/5 câu |
| **Bình phương một tổng** | 4/5 câu |
| **Hiệu hai bình phương** | 4/5 câu |
| **Phân tích nhân tử** | 4/5 câu |
| **Phân thức đại số** | 4/5 câu |
| **Phương trình bậc nhất** | 3/5 câu |
| **Hàm số bậc nhất** | 4/5 câu |
| **Tứ giác** | 5/5 câu |
| **Định lí Thales** | 4/5 câu |
| **Định lí Pythagore** | 4/5 câu |
| **Dữ liệu và tỉ lệ** | 4/5 câu |
| **Xác suất** | 4/5 câu |
| **Hình chóp tứ giác đều** | 3/5 câu |
| **distribute** | 6/8 câu |
| **combine** | 5/7 câu |

## 03 Bảng điểm các đề đã nộp

| Đề | Điểm /10 | Đúng / tổng | Thời lượng |
|---|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 05 – 30 phút | 8.7 | 13/15 | 25 phút |
| Toán 8 – Đề 04 – 30 phút | 8.7 | 13/15 | 24 phút |
| Toán 8 – Đề 03 – 30 phút | 8.7 | 13/15 | 23 phút |
| Toán 8 – Đề 02 – 30 phút | 6.7 | 10/15 | 22 phút |
| Toán 8 – Đề 01 – 30 phút | 6.7 | 10/15 | 21 phút |

Điểm trung bình thi trắc nghiệm: 7.9/10. Thời lượng là thời gian trôi qua, không phải thời gian tập trung.

| Luyện tập | Đã làm | Điểm |
|---|---|---|
| Ôn tập quy tắc phân phối và thu gọn | 6/6 | 6.7 |
| Củng cố biến đổi biểu thức | 6/6 | 6.7 |

## 04 Học sinh sai ở đâu — chi tiết từng câu

Liệt kê đủ từng câu sai ban đầu, kể cả câu đã sửa đúng. Với trắc nghiệm, hệ thống đối chiếu lựa chọn với đáp án; không khẳng định học sinh sai ở bước suy luận nào khi chưa có cách làm.

Bình phương một tổng · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 05 – 30 phút<br>Câu 4<br>Cần sửa | Khai triển $(x+6)^2$. | Học sinh chọn: A. $x^2-12x+36$<br>Đáp án đúng: D. $x^2+12x+36$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $x^2-12x+36$. Bình phương một tổng phải có hạng tử chéo $2ab$; không chỉ bình phương từng hạng tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $(x+6)^2=x^2+12x+36$.<br>Kiến thức cần dùng: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$.<br>Hướng sửa: Ôn $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Định lí Thales · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 05 – 30 phút<br>Câu 11<br>Cần sửa | Trong tam giác $ABC$, điểm $D\in AB, E\in AC$ và $DE\parallel BC$. Biết $AD=6\,\text{cm}, AB=18\,\text{cm}, AC=42\,\text{cm}$. Tính $AE$. | Học sinh chọn: B. $28\,\text{cm}$<br>Đáp án đúng: A. $14\,\text{cm}$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $28\,\text{cm}$. Tỉ số đúng là $AE/AC=AD/AB$. Cả hai đều lấy đoạn tính từ đỉnh $A$ chia cạnh tương ứng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: Theo Thales, $\frac{AE}{AC}=\frac{AD}{AB}=\frac{1}{3}$. Suy ra $AE=14\,\text{cm}$.<br>Kiến thức cần dùng: Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau.<br>Hướng sửa: Ôn Đường thẳng song song tạo tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Hiệu hai bình phương · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 04 – 30 phút<br>Câu 5<br>Cần sửa | Tính nhanh $25^2 - 23^2$. | Học sinh chọn: A. $92$<br>Đáp án đúng: D. $96$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $92$. Hiệu hai bình phương bằng tích của hiệu và tổng; không bằng bình phương của hiệu. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $25^2 - 23^2 = (25 - 23)(25 + 23) = 96$.<br>Kiến thức cần dùng: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.<br>Hướng sửa: Ôn $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Định lí Pythagore · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 04 – 30 phút<br>Câu 12<br>Cần sửa | Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AB = 8\,\text{cm}$, $BC = 17\,\text{cm}$. Tính $AC$. | Học sinh chọn: C. $25\,\text{cm}$<br>Đáp án đúng: B. $15\,\text{cm}$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $25\,\text{cm}$. Độ dài này không thỏa định lí Pythagore với hai cạnh đã cho. $BC$ là cạnh huyền, nên $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 289 - 64 = 225$. Do $AC > 0$, $AC = 15\,\text{cm}$.<br>Kiến thức cần dùng: $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với $c$ là cạnh huyền.<br>Hướng sửa: Ôn $a^2 + b^2 = c^2$ trong tam giác vuông, với $c$ là cạnh huyền., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Phân tích nhân tử · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 03 – 30 phút<br>Câu 6<br>Cần sửa | Phân tích $x^2 - 10x + 24$ thành nhân tử. | Học sinh chọn: B. $(x + 4)(x - 6)$<br>Đáp án đúng: A. $(x - 4)(x - 6)$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $(x + 4)(x - 6)$. Khi nhân lại hai nhân tử, hệ số của $x$ và hằng số đều phải trùng đa thức ban đầu. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $x^2 - 10x + 24 = x(x - 4) - 6(x - 4) = (x - 4)(x - 6)$.<br>Kiến thức cần dùng: Tách hạng tử, nhóm và đặt nhân tử chung.<br>Hướng sửa: Ôn Tách hạng tử, nhóm và đặt nhân tử chung., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Dữ liệu và tỉ lệ · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 03 – 30 phút<br>Câu 13<br>Cần sửa | Khảo sát 40 học sinh, có 13 bạn chọn bóng đá là môn yêu thích; mỗi bạn chọn một môn. Tỉ lệ học sinh chọn bóng đá là bao nhiêu? | Học sinh chọn: B. $42{,}5\%$<br>Đáp án đúng: A. $32{,}5\%$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $42{,}5\%$. Tỉ lệ cần lấy số bạn chọn bóng đá chia 40 rồi nhân $100\%$. Không dùng số bạn chọn môn khác làm tử. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $\frac{13}{40} \cdot 100\% = 32{,}5\%$.<br>Kiến thức cần dùng: Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N} \cdot 100\%$.<br>Hướng sửa: Ôn Tỉ lệ phần trăm bằng $\frac{n}{N} \cdot 100\%$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Đơn thức · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 02 – 30 phút<br>Câu 1<br>Cần sửa | Bậc của đơn thức $3x^4y^4$ là bao nhiêu? | Học sinh chọn: D. $7$<br>Đáp án đúng: C. $8$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $7$. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $4 + 4 = 8$.<br>Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến.<br>Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |
| Toán 8 – Đề 01 – 30 phút<br>Câu 1<br>Cần sửa | Bậc của đơn thức $2x^3y^3$ là bao nhiêu? | Học sinh chọn: C. $5$<br>Đáp án đúng: B. $6$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $5$. Bậc phải bằng tổng tất cả số mũ của biến, không cộng hệ số đơn thức. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: Cộng các số mũ: $3 + 3 = 6$.<br>Kiến thức cần dùng: Bậc đơn thức là N mũ của các biến.<br>Hướng sửa: Ôn Bậc đơn thức là N mũ của các biến., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Phân thức đại số · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 02 – 30 phút<br>Câu 7<br>Cần sửa | Với $x \neq 3$, cho $F = \frac{x^2-9}{x-3}$. Tính $F$ tại $x = 5$. | Học sinh chọn: C. $16$<br>Đáp án đúng: B. $8$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $16$. Phải phân tích tử thành tích rồi khử nhân tử chung; không khử các hạng tử trong một phép trừ. Giữ điều kiện mẫu khác 0. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: Vì $x \neq 3$, $F = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$. Thay $x = 5$ được $F = 8$.<br>Kiến thức cần dùng: Điều kiện mẫu khác 0; phân tích và khử nhân tử chung.<br>Hướng sửa: Ôn Điều kiện mẫu khác 0; phân tích và khử nhân tử chung., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Phương trình bậc nhất · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 02 – 30 phút<br>Câu 8<br>Cần sửa | Giải phương trình $4x - 2 = 18$. | Học sinh chọn: B. $-5$<br>Đáp án đúng: A. $5$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $-5$. Đáp án này không thỏa phương trình khi thay vào. Chuyển hằng số sang vế phải rồi chia cả hai vế cho hệ số của $x$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $4x = 20$, nên $x = 5$.<br>Kiến thức cần dùng: Chuyển vế đổi dấu và chia hai vế cho hệ số khác 0.<br>Hướng sửa: Ôn Chuyển vế đổi dấu và chia hai vế cho hệ số khác 0., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |
| Toán 8 – Đề 01 – 30 phút<br>Câu 8<br>Cần sửa | Giải phương trình $3x - 1 = 11$. | Học sinh chọn: D. $3$<br>Đáp án đúng: C. $4$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $3$. Đáp án này không thỏa phương trình khi thay vào. Chuyển hằng số sang vế phải rồi chia cả hai vế cho hệ số của $x$. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $3x = 12$, nên $x = 4$.<br>Kiến thức cần dùng: Chuyển vế đổi dấu và chia hai vế cho hệ số khác 0.<br>Hướng sửa: Ôn Chuyển vế đổi dấu và chia hai vế cho hệ số khác 0., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Xác suất · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 02 – 30 phút<br>Câu 14<br>Cần sửa | Túi có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh, cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là bao nhiêu? | Học sinh chọn: D. $\frac{4}{5}$<br>Đáp án đúng: C. $\frac{4}{9}$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $\frac{4}{5}$. Tử số phải đếm bi đỏ, mẫu số phải đếm tất cả bi; mỗi viên là một kết quả đồng khả năng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: Có $9$ kết quả đồng khả năng, $4$ kết quả thuận lợi: $P = \frac{4}{9}$.<br>Kiến thức cần dùng: Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng.<br>Hướng sửa: Ôn Xác suất bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả đồng khả năng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Hình chóp tứ giác đều · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 02 – 30 phút<br>Câu 15<br>Cần sửa | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $4\,\text{cm}$, chiều cao $9\,\text{cm}$. Tính thể tích. | Học sinh chọn: A. $144\,\text{cm}^3$<br>Đáp án đúng: D. $48\,\text{cm}^3$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $144\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $S_{\text{đ}} = 4^2 = 16\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 9 = 48\,\text{cm}^3$.<br>Kiến thức cần dùng: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông.<br>Hướng sửa: Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |
| Toán 8 – Đề 01 – 30 phút<br>Câu 15<br>Cần sửa | Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy $3\,\text{cm}$, chiều cao $6\,\text{cm}$. Tính thể tích. | Học sinh chọn: C. $21\,\text{cm}^3$<br>Đáp án đúng: B. $18\,\text{cm}^3$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $21\,\text{cm}^3$. Thể tích hình chóp bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao; diện tích đáy vuông là bình phương cạnh đáy. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $S_{\text{đ}} = 3^2 = 9\,\text{cm}^2$. $V = \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6 = 18\,\text{cm}^3$.<br>Kiến thức cần dùng: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông.<br>Hướng sửa: Ôn $V = \frac{1}{3} S_{\text{đ}} h$, đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Cộng đa thức · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 01 – 30 phút<br>Câu 2<br>Cần sửa | Cho $P = 3x^2 + 3x - 4$, $Q = 2x^2 - 5x + 6$. Tính $P + Q$. | Học sinh chọn: C. $5x^2 + 8x + 2$<br>Đáp án đúng: B. $5x^2 - 2x + 2$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $5x^2 + 8x + 2$. Cần cộng riêng hệ số của $x^2$, hệ số của $x$ và hằng số; giữ nguyên dấu âm khi cộng. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: Gộp hạng tử đồng dạng: $P + Q = 5x^2 - 2x + 2$.<br>Kiến thức cần dùng: Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng.<br>Hướng sửa: Ôn Cộng hệ số của các hạng tử đồng dạng., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

Hàm số bậc nhất · 1 câu sai ban đầu · 1 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Toán 8 – Đề 01 – 30 phút<br>Câu 9<br>Cần sửa | Cho $y = 2x - 3$. Khi $x = 3$ thì $y$ bằng bao nhiêu? | Học sinh chọn: A. $9$<br>Đáp án đúng: D. $3$<br>Phân tích: Đáp án đã chọn: $9$. Thay $x = 3$ vào hàm số và thực hiện phép nhân trước phép trừ; giữ dấu của hằng số. Đây là đối chiếu đáp án; cần xem cách làm để xác nhận nguyên nhân.<br>Cách giải đúng: $y = 2 \cdot 3 - 3 = 3$.<br>Kiến thức cần dùng: Thay giá trị biến vào $y = ax + b$.<br>Hướng sửa: Ôn Thay giá trị biến vào $y = ax + b$., tự giải lại và ghi cách làm trước khi chọn đáp án. |

combine · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Bài luyện tập<br>Cần sửa | Thu gọn 2(x + 3) + x. | Đáp án ban đầu: 3x + 3<br>Cách làm ban đầu: 2(x + 3) + x = 3x + 3<br>Dẫn chứng: 2(x + 3) + x = 3x + 3<br>Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: Phân phối trước: 2x + 6 + x, rồi gộp 2x + x.<br>Cách giải đúng: Phân phối trước: 2x + 6 + x, rồi gộp 2x + x.<br>Kiến thức cần dùng: combine<br>Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể. |

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Bài luyện tập<br>Cần sửa · chờ giáo viên duyệt | Thu gọn 2x + 3 + x − 5. | Đáp án ban đầu: 3x + 2<br>Cách làm ban đầu: 2x + 3 + x − 5 = 3x + 2<br>Dẫn chứng: 2x + 3 + x − 5 = 3x + 2<br>Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: Gộp 2x + x = 3x và 3 − 5 = −2.<br>Cách giải đúng: Gộp 2x + x = 3x và 3 − 5 = −2.<br>Kiến thức cần dùng: combine<br>Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể.<br>Bản sửa gần nhất: Gộp 2x + x = 3x và 3 − 5 = −2.<br>Bản sửa / kết quả AI đang chờ giáo viên duyệt, chưa tính thành tích. |

distribute · 2 câu sai ban đầu · 2 câu cần tiếp tục sửa

| Đề / câu và trạng thái | Đề bài | Đối chiếu lỗi và cách sửa |
|---|---|---|
| Bài luyện tập<br>Cần sửa · chờ giáo viên duyệt | Bỏ ngoặc trong 4 − (2x − 3). | Đáp án ban đầu: 1 − 2x<br>Cách làm ban đầu: 4 − (2x − 3) = 4 − 2x − 3 = 1 − 2x<br>Dẫn chứng: 4 − (2x − 3) = 4 − 2x − 3 = 1 − 2x<br>Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: Đổi dấu cả hai số hạng sau dấu trừ: 4 − 2x + 3.<br>Cách giải đúng: Đổi dấu cả hai số hạng sau dấu trừ: 4 − 2x + 3.<br>Kiến thức cần dùng: distribute<br>Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể.<br>Bản sửa gần nhất: Đổi dấu cả hai số hạng sau dấu trừ: 4 − 2x + 3.<br>Bản sửa / kết quả AI đang chờ giáo viên duyệt, chưa tính thành tích. |
| Bài luyện tập<br>Cần sửa · chờ giáo viên duyệt | Bỏ ngoặc trong −(x + 4). | Đáp án ban đầu: −x + 4<br>Cách làm ban đầu: −(x + 4) = −x + 4<br>Dẫn chứng: −(x + 4) = −x + 4<br>Phân tích: Bước biến đổi chưa giữ đúng quy tắc: Dấu trừ trước ngoặc làm đổi dấu tất cả số hạng trong ngoặc.<br>Cách giải đúng: Dấu trừ trước ngoặc làm đổi dấu tất cả số hạng trong ngoặc.<br>Kiến thức cần dùng: distribute<br>Hướng sửa: Viết lại từng bước, đối chiếu quy tắc rồi kiểm tra kết quả bằng một giá trị cụ thể.<br>Bản sửa gần nhất: Dấu trừ trước ngoặc làm đổi dấu tất cả số hạng trong ngoặc.<br>Bản sửa / kết quả AI đang chờ giáo viên duyệt, chưa tính thành tích. |

## 05 Bài chưa hoàn thành và xác nhận

| Bài cần hoàn thành | Bài cần hoàn thành |
|---|---|
| Toán 8 – Đề 06 – 30 phút<br>Chưa làm | Toán 8 – Đề 07 – 30 phút<br>Chưa làm |
| Toán 8 – Đề 08 – 30 phút<br>Chưa làm | Toán 8 – Đề 09 – 30 phút<br>Chưa làm |
| Toán 8 – Đề 10 – 30 phút<br>Chưa làm | Tự luận Toán 8 – Bộ 01<br>Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 02<br>Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28 | Tự luận Toán 8 – Bộ 03<br>Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28 |
| Tự luận Toán 8 – Bộ 04<br>Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28 | Tự luận Toán 8 – Bộ 05<br>Chưa nộp · 4 câu chưa hoàn thành · Hạn 2026-10-28 |

| | |
|---|---|
| **Giáo viên** | Giáo viên Toán |
| **Xác nhận** | Đã xác nhận trên ứng dụng lúc 02:17:34 17/10/2026 |
| **Mã báo cáo** | 2339b6e0-e8e8-4fb3-adb7-94fdbda31ace |

Bản tổng hợp dành cho phụ huynh. Hồ sơ chi tiết và ảnh bài làm được giữ trên hệ thống. Xác nhận tài khoản không phải chữ ký số có chứng thư; không thay thế việc duyệt điểm AI.