

## D - Hypotesetesting

### Nødvendige data

Rådata, lest fra den minuttfordelte fila (skal få levert rådata på et tidspunkt)

Trenger forventningsverdier for f.eks. en splitt på  $t=5$  minutter istedenfor 30, for å få et fornuftig antall forsøk.

```
B = textscan(fopen('statistics/minutes.csv'), '%d %d', 'Delimiter',' ');
minute = B{1};
minute_bikes = B{2};
totals = zeros(6, 1);
for i = 1:6
    totals(i) = sum(minute_bikes(((i-1)*5+1):(i*5)));
end
totals
```

```
totals = 6x1
    20
    13
     9
    11
    14
    11
```

```
average = sum(totals) / 6
```

```
average = 13
```

```
average_rate = sum(totals ./ 5) / 6
```

```
average_rate = 2.6000
```

Får altså samme gjennomsnittlige estimat for raten  $\lambda$  som tidligere.

Estimatoren for standardavviket vil nok bli noe annerledes siden  $t$  er forskjellig.

### Testobservator

Antall observasjoner,  $n$ , er 6.  $n - 1 = 5$  frihetsgrader.

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{6}}}$$

```
N = 6
```

```
N = 6
```

```
X = average
```

```
X = 13
```

```
S = sqrt(average_rate * 5)
```

```
S = 3.6056
```

```
T = @ (mu) (X - mu) / (S / sqrt(N))
```

```
T = function_handle with value:  
@(mu) (X-mu) / (S/sqrt(N))
```

## P-verdier

$$z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

P-verdien sier noe om hvor lurt det er å forkaste nullhypotesen - den angir sannsynligheten for forkastningsfeil.

I vårt tilfelle ser det ut til at  $z_0$  kan beregnes med samme funksjon som  $T$ .

Trenger normalfordeling:

```
normal = makedist("Normal");  
G = @(z) cdf(normal, z);
```

## Høyresidig test

Med signifikansnivå 0.05 og 5 frihetsgrader:

$$t_\alpha = t_{0.05} = 2.015$$

Hypotesene:

$$H_0: \mu \leq 12, H_1: \mu > 12$$

Testobservator:

```
t = T(12)
```

```
t = 0.6794
```

Signifikans:

```
kvantil = 2.015
```

```
kvantil = 2.0150
```

Da er  $T < t_\alpha$  og den originale hypotesen bør *ikke* forkastes.

## P-verdi

$$P(Z > z_0) = 1 - P(Z < z_0)$$

```
pz = G(t)
```

```
pz = 0.7515
```

```
p = 1-pz
```

```
p = 0.2485
```

Altså en betydelig sannsynlighet for forkastningsfeil.  $> \alpha$  så vi bør ikke forkaste.

## Venstresidig test

Med signifikansnivå 0.01 og 5 frihetsgrader:

$$t_{\alpha} = t_{0,01} = 3.365$$

Hypotesene:

$$H_0 : \mu \geq 18, H_1 : \mu < 18$$

Testobservator:

$$t = T(18)$$

$$t = -3.3968$$

Signifikans:

$$\text{kvantil} = 3.365$$

$$\text{kvantil} = 3.3650$$

Da er  $T < -t_{\alpha}$  og den originale hypotesen *kan forkastes*.

**P-verdi**

$$P(Z < z_0)$$

$$p = G(t)$$

$$p = 3.4086e-04$$

Når signifikanssannsynligheten er såpass lav er det lite tenkelig at vi begår type I-feil ved å forkaste  $H_0$ .

## Tosidig test

Med signifikansnivå 0.05 og 5 frihetsgrader:

$$t_{\alpha/2} = t_{0,025} = 2.571$$

Hypotesene:

$$H_0 : \mu = 12, H_1 : \mu \neq 12$$

Testobservator:

$$t = T(12)$$

$$t = 0.6794$$

Signifikans:

$$\text{kvantil} = 2.571$$

$$\text{kvantil} = 2.5710$$

Da er  $|T| < t_{\alpha/2}$  og den originale hypotesen kan *ikke* forkastes.

**P-verdi:**

$$\begin{aligned} &P(Z < -|z_0| \cup Z > |z_0|) \\ &= P(Z < -|z_0|) + P(Z > |z_0|) \\ &= P(Z > -(-|z_0|)) + P(Z > |z_0|) \\ &= 2P(Z > |z_0|) \\ &= 2(1 - P(Z < |z_0|)) \end{aligned}$$

$$p_z = G(t)$$

$$p_z = 0.7515$$

$$p = 2 * (1 - p_z)$$

$$p = 0.4969$$

Fra tabellen i boka får jeg at  $P(Z < 0.68) = 0.7517$  som stemmer godt med MATLABs verdi.

Det er nesten 50% sannsynlighet for at vi gjør en forkastningsfeil hvis vi forkaster denne  $H_0$  i  $H_1$ s favør.

Det gir spesielt mye mening når testobservatøren er såpass langt innenfor kvantilet.