

FYS3150 Prosjekt 1

tobias

September 2017

1 Introduction

2 Metode/Fremgangsmåte

Differensialligningen vi vil løse ser slik ut:

$$-u''(x) = f(x) \quad (1)$$

Differensialligningen vår (Poisson-ligningen) kan omgjøres til et lineært ligningssett, som deretter kan løses ved Gauss-eliminasjon. Først diskretiserer vi (1). Den andrederiverte av u kan da tilnærmes som:

$$-\frac{v_{i+1} + v_{i-1} - 2v_i}{h^2} = f_i \quad (2)$$

hvor $i = 1, \dots, n$, $f_i = f(x_i)$ og vi har definert steglengden $h = \frac{1}{n+1}$ (fra oppgaveteksten). Ligning (2) kan da skrives som matriseligningen

$$\mathbf{A}\vec{v} = \vec{b} \quad (3)$$

hvor $b_i = h^2 f_i$.

2.1 Gauss eliminasjon

Ligning (3) gir oss følgende system (gitt et 4x4-tilfelle):

$$a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + a_{13}v_3 + a_{14}v_4 = b_1$$

$$a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + a_{23}v_3 + a_{24}v_4 = b_2$$

$$a_{31}v_1 + a_{32}v_2 + a_{33}v_3 + a_{34}v_4 = b_3$$

$$a_{41}v_1 + a_{42}v_2 + a_{43}v_3 + a_{44}v_4 = b_4$$

Den generelle ideen bak Gauss eliminasjon er så å bruke den første ligningen til å eliminere den første ukjente v_1 fra de siste $n-1$ ligningene, for så å bruke den nye (andre) ligningen til å eliminere den andre ukjente v_2 fra de gjenværende $n-2$ ligningene. Med $n-1$ slike eliminasjoner vil man sitte igjen med et såkalt øvre triangulært ligningssett (bare nuller under hoveddiagonalen). Dette kalles også en framover-substitusjon. Det andre trinnet i metoden er en bakoversubstitusjon som vil gi oss løsningen.

2.2 Generell framover-substitusjon

Algoritmen vår for framover-substitusjon (for et generelt system) er altså basert på Gauss eliminasjon, og blir implementert i koden vår med en for loop over elementene i . For hver i oppdateres så diagonalelementene b_i med de nye diagonalelementene \tilde{b}_i :

$$\tilde{b}_i = b_i - \frac{a_i c_{i-1}}{\tilde{b}_{i-1}} \quad (4)$$

Den nye høyresiden \tilde{f}_i er da gitt ved:

$$\tilde{f}_i = f_i - \frac{a_i \tilde{f}_{i-1}}{\tilde{b}_{i-1}} \quad (5)$$

2.3 Generell bakover-substitusjon

Bakover-substitusjonen gir oss så den endelige løsningen:

$$u_{i-1} = \frac{\tilde{f}_{i-1} - c_{i-1} u_i}{\tilde{b}_{i-1}} \quad (6)$$

hvor $u_n = \tilde{f}_n / \tilde{b}_n$ når $i = n$.

2.4 Spesiell framover-substitusjon

Som nevnt tidligere så svarer ligning (nummer) for den andrederiverte av u til matrisen A i (3). Denne matrisen har identiske elementer langs hele hoveddiagonalen samt identiske (men forskjellige) elementer både på diagonalen rett ovenfor og rett nedenfor hoveddiagonalen. Dette faktum kan brukes til å lage en algoritme spesifikt for A , som også består av en framover- og bakover-substitusjon henholdsvis. Framover-substitusjonen gir oss matrisens nye diagonalelementer \tilde{d}_i :

$$\tilde{d}_i = 2 - \frac{1}{\tilde{d}_{i-1}} = \frac{i+1}{i} \quad (7)$$

samt den nye høyresiden \tilde{f}_i av ligningen:

$$\tilde{f}_i = f_i + \frac{(i-1)\tilde{f}_{i-1}}{i} \quad (8)$$

2.5 Spesiell bakover-substitusjon

Bakover-substitusjonen gir oss nok en gang den endelige løsningen:

$$u_{i-1} = \frac{i-1}{i} (\tilde{f}_{i-1} + u_i) \quad (9)$$

med $u_n = \tilde{f}_n / \tilde{b}_n$.

2.6 Relativ feil

Vi er også interesserte i å kalkulere den relative feilen i resultatene for å kunne sammenligne den numeriske løsningen vår v med den analytiske løsningen $u(x)$. Den relative feilen er gitt ved:

$$\epsilon_i = \log_{10} \left(\left| \frac{v_i - u_i}{u_i} \right| \right) \quad (10)$$

hvor $u(x) = 1 - (1 - e^{-10})x - e^{-10x}$.