C. TeX Gyre Termes + TeX Gyre Termes Math XeLaTeX, unicode-math, GUST licence

Ein Zustand ist ein positives, normiertes lineares Funktional; im spurklassigen Fall schreiben wir ihn als Dichteoperator $\rho \geq 0$ mit $\operatorname{tr}\rho = 1$. Für einen Effekt $0 \leq E \leq \mathbb{1}$ liefert die Bornsche Regel die Wahrscheinlichkeit $p = \operatorname{tr}(\rho E)$. Die Energie des Wasserstoffatoms ist „gequantelt“, $E_n = -13{,}6\,\mathrm{eV}/n^2$.

$$\Big(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\Big)\psi_{n\ell m} = E_n\,\psi_{n\ell m}, \qquad \int_{\mathbb{R}^3} |\psi_{n\ell m}(\mathbf{x})|^2\,\mathrm{d}^3x = 1. \tag{1}$$

$$[L_j, L_k] = \mathrm{i}\hbar\,\varepsilon_{jkl}L_l, \quad \langle\varphi|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}|\psi\rangle, \quad Z = \sum_k \mathrm{e}^{-\beta E_k}, \quad \mathscr{H} = \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathscr{H}^{\otimes_s N}, \quad \mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3). \tag{2}$$

Inline: $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2$, $\sigma_x\sigma_y = \mathrm{i}\sigma_z$, $\partial_t\rho = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H,\rho]$, $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\vartheta\kappa\lambda\xi\phi\varphi\omega\,\Gamma\Lambda\Omega$, $x_i^2, f'(x)$.