

Magsjuka – diarré och kräkningar

Magsjuka kommer ofta snabbt med kräkningar, diarréer och illamående. Trots att du kan må mycket dåligt brukar magsjuka sällan vara allvarlig. Det räcker oftast med att vila och att dricka mycket. Du blir ofta bättre inom ett till tre

dygn. **Symtom LÄTTLÄST OTHER LANGUAGES** Vad kan jag göra själv? Drick lite och ofta

Ät mat när du känner dig bättre

Lindra sveda

Använd läkemedel om du behöver stoppa diarrén tillfälligt
När och var ska jag söka vård?
•
•
•
•
Om det är bråttom
•
•
Ring mottagningen innan du åker dit
Så länge ska barn och vuxna stanna hemma

Hur länge ska barn stanna hemma?	
Hur smittar magsjuka?	
•	
•	
•	
Hur kan jag förebygga magsjuka?	
•	
•	
•	
•	
•	
När du är magsjuk	
•	
•	
•	

•				
•				
•				
•				
Undersökningar och utrednir	ngar			
Du får berätta				
•				
•				
•				
		-	_	
Du kan behöva lämna prover				
Behandling				
Antibiotika kan gära att dat tar li	ängra tid att bli frials			
Antibiotika kan göra att det tar lä	angre ud att bli frisk			

Prata med din läkare om du använder vissa läkemedel

•	
•	
•	
V-11." - 111	
Vad händer i kroppen?	
Magsjuka och graviditet	
Vad beror magsjuka på?	
Virus som orsakar magsjuka	
•	
Bakterier som orsakar magsjuka	
Bakterier som orsakar magsjuka	
•	
•	

Smittad utomlands	
Exempel på bakterier som du kan bli magsjuk av	
•	
•	
Bakterier kan bilda gift som orsakar magsjuka	
Parasiter som orsakar magsjuka	
Annat som kan orsaka diarré och kräkningar	-
Påverka och delta i din vård	
Du ska förstå informationen	

1177 – tryggt om din hälsa och vård
1177 på flera språk I
Om 1177
Kontakt I