

Prostata

Prostatit innebär att det blir en inflammation i prostatakörteln. Akut prostatit är ovanligt, men om du får det behöver du behandling. Besvären kan komma snabbt. Då är det vanligt att ha feber, ont i magen och svårt att kissa. Ibland gör det ont i nedre delen av ryggen eller underlivet.

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret. Vid akut prostatit har det kommit in bakterier i urinvägarna. Du behöver få behandling med antibiotika om du har akut prostatit. Då läker inflammationen och du blir oftast helt återställd.

Det finns också kronisk prostatit.

Akut prostatit kommer ofta plötsligt. Då får du ofta ett eller flera av de här besvären:

- Du får ont i magen, ofta nedre delen eller i ryggslutet. Det kan göra ont ner mot ljumskarna, ut <u>pungen, penisen</u> eller området mellan pungen och ändtarmsöppningen. Det kan också göra ont när du sitter.
- Det är svårt att kissa. Det kan svida eller göra ont. Du kan också behöva kissa oftare.
- Du får hög <u>feber</u> och frossa.
- Det g\u00f6r ont i samband med utl\u00f6sning.
- Du känner dig rejält sjuk i hela kroppen.

Kontakta genast en <u>vårdcentral</u> eller en <u>jouröppen mottagning</u> om du har ont i magen, ryggslutet eller underlivet och samtidigt har feber eller frossa. Det gäller också om du har svårt att kissa och får feber.

Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha <u>sjukvårdsrådgivning</u>. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du behöver få behandling med <u>antibiotika</u> om du har akut prostatit. Ibland kan det vara nödvändigt att få antibiotika direkt i blodet på ett sjukhus. Du får antibiotika som tablett när du mår bättre, eller om du inte har så stora besvär.

Du kan få en <u>kateter i urinblåsan</u> om du har svårt att kissa eller inte kan kissa alls. Den sätts in när du är på sjukhuset. Katetern gör att urinen kan passera fritt.

Akut prostatit läker efter behandling med antibiotika. Det blir oftast inga fortsatta besvär. Men ibland kan du få akut prostatit igen. Det kan ibland bli så kallad <u>kronisk prostatit</u>, men det är ovanligt.

Läkaren gör först en <u>kroppsundersökning</u>. Då känner hen på magen, penisen och pungen för att bedöma om du har ont och om det finns några förändringar. Det är för att se om det kan finnas andra orsaker till besvären.

Läkaren <u>undersöker prostatan</u>. Då tar hen på sig en plasthandske och för in ett finger i ändtarmsöppningen. Undersökningen kan kännas obehaglig och göra ont. Det gäller speciellt om prostatakörteln är inflammerad och förstorad. Du kan känna obehag cirka fem till tio minuter efter undersökningen.

Du får alltid <u>lämna ett urinprov</u> för att se om det finns bakterier eller spår av röda eller vita blodkroppar i urinen.

Du får lämna särskilda urinprov för gonorré och klamydia om läkaren tror att du har en könssjukdom.

Du kan få lämna ett nytt urinprov ett par veckor efter att behandlingen med antibiotika är avslutad. Det gäller om det första urinprovet innehöll bakterier.

Du får <u>lämna blodprover</u> om du har akut prostatit med hög feber och svåra besvär. Det är för att läkaren vill kontrollera att de inre organen fungerar som de ska, till exempel levern och njurarna. Du kan också få lämna ett blodprov för att undersöka om det finns bakterier i blodet.

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret vid urinblåsan.

Prostatit innebär att prostatakörteln blir <u>inflammerad</u>. Då blir den öm och svullen. Ibland kan även musklerna i bäckenbotten bli inflammerade.

Prostatan är en körtel som ligger runt urinröret, precis där det lämnar urinblåsan och går ut i penisen. Prostatan bildar transportvätska för spermierna. Strax under prostatan finns flera lager med muskler och bindväv som bildar en böjlig bottenplatta. Den kallas bäckenbotten och håller upp organen i nedre delen av bäckenet.

Akut prostatit beror oftast på att bakterier som finns i underlivet kommer in i urinvägarna, till exempel tarmbakterier.

Bakterierna som orsakar akut prostatit kan också komma från sexuellt överförbara sjukdomar, som<u>klamydia</u>eller gonorré.

Du kan också få prostatit efter en så kalladprostatabiopsi.

Du kan <u>söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning</u>du vill i hela landet. Ibland krävs det <u>remiss</u> till den öppna specialiserade vården.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du<u>förstå informationen</u> som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och <u>hur länge du kan behöva vänta på vård</u>.

Du har möjlighet att <u>få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska</u>. Du har också <u>möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning</u>.

Senast uppdaterad: