



Blodpropp i lungan

Blod som har stelnat kan bilda en så kallad blodpropp. Blodproppar i benet eller andra delar av kroppen kan ibland följa med blodet till lungan. Där kan blodproppen fastna och hindra blodflödet. Blodproppar i lungorna kan i enstaka fall vara livshotande och måste därför alltid behandlas så fort som möjligt.

Symtom

-
-
-
-
-
-
-

Större proppar märks tydligt

-
-
-
-

Hög puls, snabb andning och oregelbundna hjärtslag

När och var ska jag söka vård?

Om det är bråttom

-
-
-

Hur kan jag minska risken för blodpropp?

Undersökningar och utredningar

Behandling

Propplösande läkemedel används vid stora blodproppar

Vanligt att få blodförtunnande läkemedel

Olika sorters blodförtunnande läkemedel

Andra blodförtunnande läkemedel

Ibland behöver du vårdas på sjukhus

Risken för blödningar ökar

Nya proppar kan bildas

Graviditet och amning

Vad beror en blodpropp i lungan på?

-
-
-
-
-
-

Vissa får blodpropp lättare än andra

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vad händer i kroppen?

Proppen kan följa med blodet till lungan

I lungorna tar blodet upp syre

Proppen hindrar blodflödet

Andra typer av blodproppar

Hur vanligt är blodpropp?

Påverka och delta i din vård

Du ska förstå informationen

LÄS MER PÅ 1177.SE



mer på 1177.se

[Så loggar du in på 1177](#)

1177 – tryggt om din hälsa och vård

1177 på flera språk

|

Om 1177

|

Kontakt

|

[Inställningar för kakor](#)
