



[Livmoder och äggstockar](#)

Äggledarinflammation gör ofta att du får ont i magen, rikligare flytningar och ibland feber. Den vanligaste orsaken är könssjukdomar, till exempel klamydia och gonorré. Du behöver få behandling med antibiotika om du har äggledarinflammation.

Det är vanligt att äggledarinflammation ger ett eller flera av följande symtom:

- Du har rikligare, ibland illaluktande [flytningar](#) som kan vara vita, gula eller gröna.
- Du har väldigt [ont i nedre delen av magen](#).
- Du upplever en tyngdkänsla i underlivet.
- Det svider när du kissar.
- Du känner dig kissnödig fast du har kissat nyligen.
- Du kan också ha [feber](#) och känna dig trött.

Du kan också få mer otydliga symtom som kommer då och då och är lindriga. Symtomen kan vara en lätt molande värk i nedre delen av magen och ibland även [ont i korsryggen](#).

Äggledarinflammation kan alltså ge väldigt otydliga symtom, bara ett av ovanstående symtom eller flera av de här symtomen.

Kontakta en [gynekologisk mottagning](#) eller [vårdcentral](#) om du har symtom som kan tyda på äggledarinflammation.

Kontakta genast en [gynekologisk mottagning](#), [vårdcentral](#) eller [jouröppen mottagning](#) om du har ett eller flera av följande symtom:

- Du har väldigt ont i nedre delen av magen.
- Du har kraftiga flytningar och feber.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring [telefonnummer 1177](#) om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Äggledarna är två tunna rör som går från övre delen av livmodern. Längst ut är äggledarna flikiga för att kunna fånga upp ägg från äggstockarna vid ägglossning.

Den vanligaste orsaken till äggledarinflammation är [könssjukdomar](#), till exempel [klamydia](#) och [gonorré](#).

Du kan också få äggledarinflammation efter en [abort](#) eller om du har fått en [kopparspiral](#) eller en [hormonspiral](#) insatt, men det är ovanligt.

Du kan få en infektion i livmodern om du har fått ett [missfall](#). Den infektionen kan sedan sprida sig till äggledarna och orsaka en äggledarinflammation, men det är mycket ovanligt.

Äggledarinflammation är en vanlig infektion hos unga personer. Sjukdomen är mindre vanlig efter [klimakteriet](#).

Du kan inte förebygga själva äggledarinflammationen, men du kan förebygga infektionen som ger äggledarinflammationen. Det kan du göra genom att ha säkrare sex, som att använda [kondom](#) vid vaginala samlag och [slicklapp](#) om du har munsex.

Du som har väldigt ont i magen, kraftiga flytningar och eventuellt feber behöver bli undersökt genom en [gynekologisk undersökning](#). I samband med den undersökningen kan prover från underlivet tas. Ibland kan du också få lämna blodprov för att läkaren ska kunna se om du har någon könssjukdom, som hiv eller hepatit B.

Du som har molande värk i nedre delen av magen eller ont i musklerna eller skelettet får testa dig för könssjukdomar. Ibland behöver du lämna ett urinprov, och därför kan det vara bra om du väntar med att kissa tills du träffar barnmorskan eller läkaren.

Det är ovanligt, men ibland kan det även vara nödvändigt att göra en [titthålsundersökning](#) för att utesluta andra sjukdomar.

Äggledarinflammation behandlas med [antibiotika](#). Du som har väldigt ont i magen kan få [receptfria smärtstillande läkemedel](#). Du kan också få receptfria inflammationsdämpande läkemedel.

Vissa personer får varbölder i äggledarna av inflammationen. Då kan du behöva bli opererad.

Ha inte vaginala samlag, anala samlag eller munsex under tiden som du behandlas med antibiotika. Den du har sex med behöver testas och eventuellt behandlas om hen har någon könssjukdom. Annars kan sjukdomen överföras fram och tillbaka mellan er.

Äggledarinflammation kan öka risken för [utomkvedshavandeskap](#). Utomkvedshavandeskap innebär att det befruktade ägget börjar växa utanför livmodern.

Äggledarinflammation kan också göra det svårare att bli gravid. Det beror på att inflammationen skapar ärr i äggledarna. De här ärren kan göra att ett befruktat ägg inte kan ta sig genom äggledaren för att komma till livmodern och kunna växa där. Ärren kan också göra att spermier inte kan komma fram till ägget och befrukta det.

Snabb behandling med antibiotika minskar de här riskerna.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du [förstå informationen](#) som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och [hur länge du kan behöva vänta på vård](#).

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att [få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska](#). Du har också [möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning](#).

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Senast uppdaterad:

2022-05-09

Redaktör:

Ida Friedmann, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:

Helena Kopp Kallner, gynekolog och förlossningsläkare, Danderyds sjukhus

Illustratör:

Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör

Könssjukdomar är infektioner som du kan få genom att ha sex. Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen. Det betyder att du måste testa dig om du misstänker att du har någon av dem.

En kondom är ett skydd av mycket tunt gummi eller plast som du kan sätta på en penis eller en dildo om du ska ha samlag. Kondom är ett enkelt sätt att minska risken för överföring av könssjukdomar vid samlag. Det är även ett enkelt sätt att undvika graviditet vid samlag som kan leda till graviditet.

En slicklapp är gjord av latex eller plast och kan användas som extra skydd vid slicksex. Slicklappar finns i olika färger och smaker.

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 ger dig råd när du vill må bättre.

I

I

I

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).