



[Leder](#)

En Bakercysta är en svullnad i knävecket. Den bildas när den slem säck som sitter på baksidan av knät innehåller mer vätska än vanligt. Cystan försvinner oftast av sig själv, men ibland behövs behandling.

En Bakercysta hos vuxna beror vanligtvis på överbelastning av knät i kombination med problem i knäleden. Det kan till exempel vara [artros](#), en ledinflammation eller en [meniskskada](#).

Barn kan ibland få Bakercystor. Det är oklart varför cystorna bildas, men de brukar inte ge några större besvär. Cystorna brukar minska eller försvinna av sig själv när barnet blir större.

Läs mer om [knäbesvär hos barn och tonåringar](#).

Bilden till vänster visar en knäled utan Bakercysta. Bilden till höger visar en knäled med Bakercysta. Där syns hur slem säcken på baksidan av knät är fylld med extra mycket vätska.

Knävecket blir svullet om du får en Bakercysta. Svullnaden kan vara allt från liten som en hasselnöt till stor som en tennisboll.

En Bakercysta brukar inte göra ont, men det kan kännas spänt om cystan är stor. Då kan det också vara svårare att böja knäleden.

Det kan hända att cystan spricker, men det är ovanligt. Då brukar det göra ont och du får en blödning inuti vaden, som blir öm, svullen och varm.

Kontakta en [vårdcentral](#) om du har en svullnad på baksidan av knät som gör ont och inte försvinner på två veckor. Många mottagningar kan du kontakta genom att [logga in](#).

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha [sjukvårdsrådgivning](#) och hjälp med var du kan söka vård.

Bakercystor kan försvinna av sig själv, men om du har [artros i knäleden](#) finns det risk för att cystorna kommer tillbaka.

Barn med Bakercysta brukar inte behöva någon behandling eftersom svullnaden minskar eller försvinner av sig själv med tiden.

Vuxna med Bakercystor som inte gör ont brukar inte heller behöva någon behandling. Blödningar brukar läka av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Om din Bakercysta beror på ett problem i knäleden får du behandling mot det.

Cystan kan punkteras om den blivit så stor att den värker och spänner i knävecket. Samtidigt sprutas kortison in, vilket kan göra att cystan drar ihop sig.

Du kan ta [receptfria smärtstillande läkemedel](#) om du har mycket ont.

Bakercystan kan behöva opereras bort om du har svåra besvär.

Du kan [söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning](#) du vill i hela landet. Ibland krävs det [remiss](#) till den öppna specialiserade vården.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du [förstå informationen](#) som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och [hur länge du kan behöva vänta på vård](#).

Du har möjlighet att [få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska](#). Du har också [möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning](#).

Senast uppdaterad:

2024-07-31

Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm

Illustratör:

Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 ger dig råd när du vill må bättre.

I

I

I

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).