



[Pung och testiklar](#)

Testikelinflammation kan göra att du får ont i pungen, får feber och känner dig sjuk. Sök vård på en vårdcentral eller akutmottagning om du plötsligt får ont i pungen. Det är viktigt att du blir undersökt för att få reda på vad smärtan beror på.

Det är ovanligt, men att det gör ont i pungen kan bero på att testikeln har vridit sig. [Testikelvridning](#) händer oftare hos yngre personer än hos vuxna.

Det är vanligt att ha ett eller flera av följande symtom om du har testikelinflammation:

- Pungen har svullnat och gör ont.
- Du känner dig ordentligt sjuk.
- Du får [feber](#).

Ibland kan inflammationen bero på en [urinvägsinfektion](#). Då kan du även ha besvär när du kissar.

Du kan minska risken genom att skydda dig mot de sjukdomar som kan leda till testikelinflammation:

- Skydda dig mot [bitestikelinflammation](#) genom att använda [kondom](#) vid samlag.
- Skydda dig mot [påssjuka](#) genom att vaccinera dig.

Kontakta en [vårdcentral](#) om du får en svullnad eller ömhet i pungen som kommer gradvis, eller har andra symtom på testikelinflammation. Många mottagningar kan du kontakta genom att [logga in](#).

Sök vård direkt på en vårdcentral eller [jouröppen mottagning](#) om du plötsligt får ont i pungen och det inte går över inom några minuter. Det kan i så fall vara symtom på [testikelvridning](#).

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha [sjukvårdsrådgivning](#) och hjälp med var du kan söka vård.

Läkaren undersöker om ömheten och svullnaden sitter i testiklarna eller bitestiklarna. Det gör hen genom att känna på pungen.

Du får oftast lämna prov som ger svar på om du har [gonorré](#), [klamydia](#) eller [urinvägsinfektion](#). Det är sjukdomar som kan leda till testikelinflammation.

En del prov ger svar direkt, medan andra prover kan behöva skickas till ett laboratorium. Du brukar få svar inom en

vecka.

Du kan också få lämna ett [blodprov för att mäta CRP-värdet](#). Det provet kallas även snabbsänka. Provet visar om du har en inflammation. Provsvaret brukar ta några minuter.

Du kan behöva bli undersökt med [ultraljud](#), till exempel om läkaren har svårt att avgöra om värken beror på en inflammation i testikeln, eller på något annat.

Du får då en [remiss](#).

Du kan [söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning](#) du vill i hela landet. Ibland krävs det [remiss](#) till den öppna specialiserade vården.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du [förstå informationen](#) som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och [hur länge du kan behöva vänta på vård](#).

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att [få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska](#). Du har också [möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning](#).

Det finns ingen behandling om inflammationen beror på ett virus. Inflammationen får då läka av sig själv. Det finns sådant som lindrar under tiden. Du kan till exempel pröva att använda suspensoar, det kan hjälpa om pungen värker och tynger. Du kan också lindra värken med receptfria tabletter som innehåller paracetamol.

Du behandlas med [antibiotika](#) om testikelinflammation orsakas av bakterier. Du kan också få [smärtstillande läkemedel](#).

Oftast får du ta antibiotika i två till tre veckor. De flesta brukar må bättre efter tre dygn. Men det är viktigt att inte sluta ta antibiotika, även om symtomen försvinner.

Det kan hända att du blir väldigt sjuk om inflammationen har börjat med en urinvägsinfektion. Då kan du till en början behöva sjukhusvård under några dagar och få antibiotika direkt i blodet.

Du får komma på återbesök efter ett par veckor. Då undersöker läkaren att inflammationen har läkt som den ska. Ofta är pungen då mindre svullen och då behöver du inte komma tillbaka för fler undersökningar.

Ibland kan bitestikeln eller testikeln vara lite svullen, fast och öm en lång tid efter inflammationen. Då kan du behöva undersökas igen, men det är sällsynt.

Testiklarna är två körtlar i pungen. De producerar spermier och könshormoner. En inflammation i testiklarna beror nästan alltid på att en inflammation i bitestiklarna har spridit sig.

[Inflammation i bitestiklarna](#) beror oftast på att bakterier, till exempel klamydia har spridits från urinröret via sädesledaren till testikel eller bitestikel.

Testikelinflammation kan också bero på [påssjuka](#), som orsakas av ett virus. Du är skyddad mot den typen av testikelinflammation om du är vaccinerad mot påssjuka.

Det finns en liten risk för testikelinflammation om du opererats för [ljumskbräck](#).

Testikelinflammation som beror på bakterier leder sällan till några komplikationer. Testikelinflammation som beror på virus kan ibland leda till sterilitet.

[Infektion och inflammation](#)

[Killens underliv](#)

[Könssjukdomar](#)

Senast uppdaterad:

2024-07-31

Redaktör:

Ida Friedmann, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:

Jan-Erik Damber, professor i urologi, Sahlgrenska Akademin, Universitetssjukhuset, Göteborg

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 ger dig råd när du vill må bättre.

I

I

I

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).