



## [Armar och händer](#)

Triggerfinger är vanligast hos vuxna. Men nyfödda barn kan också få triggerfinger. Även äldre barn kan få triggerfinger.

Triggerfinger märks oftast som att barnet inte kan sträcka på tummen.

Andra fingrar kan också påverkas på samma sätt, men det är ovanligt.

Ibland kan tummen fastna i ett läge och då går det inte att röra eller böja på tummen. Det beror på att senan som böjer tummens ytterled har blivit tjockare än den ska. Då kan senan fastna.

Besvären med den tjocka ytterleden försvinner av sig själv hos mer än hälften av barnen som har triggerfinger.

Besvären går ofta över av sig själv. Därför är det oftast bra att vänta med operation.

Ibland går besvären inte över och då behövs oftast en mindre operation. Barnet kommer att kunna sträcka ut tummen som vanligt efter operationen. Det gäller även om barnet inte kunnat sträcka på tummen under ett års tid.

---

 [Skelett och leder](#)

 [Muskler och senor](#)

Senast uppdaterad:

2023-02-24

Redaktör:

Louise Engström, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 ger dig råd när du vill må bättre.

I

I

I

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).