



[Klåda och smärta i underlivet](#)

Bartolinit innebär att det har blivit en infektion i en körtel som finns i slidans öppning. Det bildas var, blir svullet och gör ont. Ibland går det över av sig själv, men ofta behövs behandling.

Sjukdomen har fått sitt namn från två körtlar som finns på varsin sida av slidans nedre del. De kallas för Bartholinis körtlar.

Infektionen uppstår vid slidöppningen.

Det är vanligt att få något av dessa besvär:

- Det blir rött, gör ont och svullnar i och utanför slidöppningen på ena sidan. Det kan också bli svullet intill de yttre blygdläpparna. Det röda syns inte lika mycket på mörk hud.
- Det gör ont när du sitter eller går.

Du kan också få feber.

Kontakta en [gynekologisk mottagning](#) eller en [vårdcentral](#) om du har ont och är svullen vid slidöppningen och det inte går över efter några dagar.

Många mottagningar kan du kontakta genom att [logga in](#).

Kontakta genast en [gynekologisk mottagning](#), en [vårdcentral](#) eller en [jouröppen mottagning](#) om du har mycket ont och det är mycket svullet.

Om det inte går eller är stängt, sök vård på en gynekologisk akutmottagning eller en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha [sjukvårdsrådgivning](#). Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du får berätta om dina besvär och undersöks sedan när du ligger i en gynstol.

Den som undersöker dig tittar och känner försiktigt på området kring slidans öppning.

Du får remiss till en gynekologisk mottagning om inte vårdcentralen kan undersöka dig.

Ofta behöver varet i körteln komma ut. Du genomgår då en kort operation på en gynekologisk mottagning.

Du ligger ner i en gynstol. Först får du [lokalbedövning](#). Sedan tömmer läkaren körteln genom att göra en liten öppning med en smal, tunn kniv. I samma öppning lägger hen sedan in en tunn plastslang för att öppningen inte ska stängas igen direkt och fyllas med sekret och var igen. Den tunna slangen kallas för en kateter.

Katetern behöver sitta kvar i tre till fyra veckor så att körteln kan tömmas ordentligt och det kan bildas en ny körtelöppning.

Det kan skava och vara obekvämt när du sitter och går. Det kan hjälpa om du för upp slangen i slidan, om det är möjligt.

Det är olika hur rörlig man känner dig efteråt. Du kan behöva ta det lugnt i ett par dagar.

Du kan duscha och gå på toaletten som vanligt. Du ska däremot inte bada, använda tampong eller ha slidsamlag.

När katetern ska tas bort är det vanligt att du får göra det själv. Det går också att få hjälp på mottagningen där operationen gjordes.

Du får mer information om operationen och om hur du sköter och tar ut katetern från mottagningen.

Du kan använda [smärtstillande läkemedel](#) om du har ont under tiden. Ibland behövs behandling med [antibiotika](#).

Körtlarna vid slidans öppning bildar en kladdig vätska som kallas sekret. Den rinner ut ur körteln genom en öppning och håller slemhinnorna i underlivet fuktiga och ger extra fukt vid sexuell upphetsning.

Ibland kan körtelns öppning täppas igen. Då samlas sekret i körteln och den svullnar. Kommer det in bakterier bildas det var. Bartolinit orsakas oftast av bakterier som finns i slidan, tarmen eller på huden.

Det är oklart varför bartolinit uppstår.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du [förstår informationen du får](#) av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn och unga ska vara [delaktiga i sin vård](#). Ju äldre de är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få [hjälp av en tolk om du inte pratar svenska](#). Du har också möjlighet att få [hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning](#).

LÄS MER PÅ 1177.SE

- [Gynekologisk undersökning](#)
- [Könsorgan och fortplantning](#)
- [Infektion och inflammation](#)

Senast uppdaterad:

2021-05-10

Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:

Christina Rydberg, gynekolog, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus, Varberg

Illustratör:

Kari Toverud, certifierad medicinsk illustratör

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 ger dig råd när du vill må bättre.

I

I

I

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).