



[Bölder, knölar och akne](#)

En pilonidalcysta sitter i mitten av ryggslutet, precis där skinkorna delar sig. Det kan göra ont och rinna vätska från området. En pilonidalcysta kan vara besvärlig, men det finns behandling som hjälper.

En pilonidalcysta sitter i mitten av ryggslutet, precis där skinkorna delar sig.

Det är inte helt känt hur en pilonidalcysta uppstår. Förmodligen beror den på att ett hårstrå har tryckts tillbaka in i sin hårsäck och att det då har uppstått en inflammation.

Ibland brister den inflammerade hårsäcken. Då kan det bildas en liten kanal under huden, en så kallad [fistel](#). Fisteln kan tränga igenom huden så att det blir en öppning. Då rinner det ofta lite vätska eller var ur den öppningen. Med tiden kan det bildas flera fistlar.

Det kan komma bakterier in i cystan. Då kan det bildas en böld.

Risken för att få en pilonidalcysta är större om man sitter ner ofta och länge. Det gäller särskilt om man sitter så att det trycker mot ryggslutet.

Pilonidalcystor kommer ofta i tjugoårsåldern.

Det här kan vara symtom på en pilonidalcysta:

- Du är svullen och öm över ryggslutet.
- Det kommer lite illaluktande vätska från området vid ryggslutet.
- Du får en böld i ryggslutet som gör ont.

Besvären kan komma och försvinna av sig själv.

Kontakta en [vårdcentral](#) om du får en böld eller om det kommer vätska eller var från ryggslutet.

Många mottagningar kan du kontakta genom att [logga in](#).

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha [sjukvårdsrådgivning](#). Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Det är bra om du rakar bort hår och håller rent i området där pilonidalcystan sitter.

En böld som gör mycket ont kan behöva tömmas på var. Det görs genom ett litet ingrepp och du får lokalbedövning innan. Läkaren skär ett snitt i bölden för att tömma ut varet. Sedan får du gå regelbundet till en distriktssköterska under någon vecka för att få såret omskött.

Du kan behöva genomgå en större operation om besvären ofta kommer tillbaka. Under operationen får du [ryggbedövning](#) eller är [sövd](#). Det kan göra ont och kännas stramt i ett par veckor efter operationen. Du kan också ha svårt att sitta. Det tar ungefär en månad innan såret har läkt.

Du kan [söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning](#) du vill i hela landet. Ibland krävs det [remiss](#) till den öppna specialiserade vården.

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du [förstå informationen](#) som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och [hur länge du kan behöva vänta på vård](#).

Även [barn ska få vara delaktiga i sin vård](#)

Du har möjlighet att [få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska](#). Du har också [möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning](#).

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Senast uppdaterad:

2021-12-10

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 ger dig råd när du vill må bättre.

I

I

I

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).