





## Hjärtbesvär och hjärtfel

Blåsljud från hjärtat upptäcks oftast vid en läkarundersökning och är vanligast i åldern två till fyra år. De flesta som har blåsljud har inget fel på hjärtat, får inga besvär och behöver ingen behandling. Men ibland är ett kraftigare blåsljud tecken på ett hjärtfel som behöver behandlas.







Drygt hälften av alla barn har ett blåsljud från hjärtat som går att höra med stetoskop.

Ett blåsljud från hjärtat känns inte och går oftast inte att höra. Men en läkare som lyssnar på hjärtat med stetoskop kan höra ett brummande eller brusande ljud hos den som har ett blåsljud.

Du kan bli andfådd, trött och få svullna underben om orsaken till blåsljudet är ett medföddt [hjärtfel](#) eller en [hjärtmuskelsjukdom](#). Du kan också bli blå om läpparna, få ont i bröstet eller svimma när du anstränger dig.

Kontakta en [vårdcentral](#) om du misstänker att du eller ditt barn har ett blåsljud från hjärtat. Många mottagningar kan du kontakta genom [attogga.in](#).

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha [sjukvårdsrådgivning](#) och hjälp att bedöma symtom.

Blåsljud från hjärtat brukar upptäckas vid en vanlig läkarundersökning. Drygt hälften av alla barn har ett blåsljud från hjärtat och det är vanligast när barnet är mellan två och fyra år.

När läkaren lyssnar på hjärtat med stetoskop går det ofta att höra om det är ett vanligt blåsljud eller om ljudet är tecken på något hjärtfel.

Ibland behöver ett blåsljud undersökas noggrannare. Då skriver läkaren [remiss](#) till en hjärtmottagning som bland annat gör en [ultraljudsundersökning](#) av hjärtat.

Blåsljud hos barn brukar försvinna av sig själv när barnet har vuxit klart. Men ibland finns blåsljudet kvar hela livet.

Behandling med läkemedel eller en operation kan behövas om blåsljudet beror på något [hjärtfel](#). Då är det inte själva blåsljudet som behandlas, utan hjärtfelet som gör att blåsljudet uppstår.

Blåsljud kan skapas av de virvlande blodströmmarna när blodet passerar genom hjärtat, så kallad turbulens. Men det typiska vanliga blåsljudet hos barn beror på det fysiska fenomenet resonans, som ger ett speciellt ljud.

Ibland beror blåsljud på att hjärtat pumpar blodet snabbare än vanligt, till exempel vid [feber](#). Det påverkar inte hjärtat och märks inte på något sätt.

Blåsljud hörs ofta hos barn än hos vuxna. Antagligen beror det på att bröstkorgsväggen är tunnare hos barn och att blåsljuden därför hörs bättre för läkaren vid en undersökning.

Kraftigare blåsljud kan bero på medfödda [hjärtfel](#), till exempel hål mellan [hjärtats förmak eller kamrar](#). En annan orsak kan vara trånga eller läckande hjärtklaffar.

Du kan [söka vård](#) på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs [detremiss](#) till den öppna specialiserade vården.

Du ska vara delaktig i ditt barns vård. Därför är det viktigt att du [förstår informationen](#) som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och [hur länge barnet kan behöva vänta på vård och behandling](#)

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk [om du inte pratar svenska](#). Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om [du har en hörselnedsättning](#).

- 
- [Så fungerar hjärtat och blodomloppet](#)
  - [Medfödda hjärtfel hos barn](#)

Redaktör:  
Peter Tuominen, 1177.se, nationella redaktionen

Granskare:  
Ulf Ergander, barnläkare, specialist på hjärtsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm  
Fotograf:  
Emmali Anséus, 1177.se, nationella redaktionen

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.  
1177 ger dig råd när du vill må bättre.

[Behandling av personuppgifter](#)

[Hantering av kakor](#)

[Inställningar för kakor](#)

1177 – en tjänst från [Inera](#).