

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Механико-математический факультет

Кафедра теории вероятностей

СИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Работа студенток 509 группы

Акбар Екатерины
Кузнецовой Анастасии
Токаевой Александры

Преподаватель:
Е.А. Бадерко

Москва — 2022

Содержание

1	Непрерывность по Гёльдеру	2
2	Интегральный оператор Коши	4
3	Задача Римана	7
4	Интегральные уравнения с ядром Коши	9
5	Интеграл Коши и логарифмический потенциал	13
6	Логарифмический потенциал простого слоя на дуге	17
	Список литературы	18

Аннотация

В этой главе мы рассмотрим одномерные сингулярные интегральные уравнения, включающие главные значения Коши, которые возникают из краевых задач для голоморфных функций. Исследования этих интегральных уравнений с ядрами Коши Гаховым, Мухелишвили, Векуа и другими оказали большое влияние на дальнейшее развитие общей теории сингулярных интегральных уравнений. Для нашего введения в интегральные уравнения они обеспечат применение общей идеи регуляризации сингулярных операторов, как описано в главе 5. Мы предполагаем, что читатель знаком с базовым комплексным анализом.

1 Непрерывность по Гёльдеру

Для нашего исследования сингулярного интеграла нам сначала нужно ввести понятие непрерывности по Гёльдеру.

Определение 1 (7.1). *Вещественная или комплекснозначная функция φ , определенная на множестве $G \subset \mathbb{R}^m$, называется равномерно непрерывной по Гёльдеру с показателем $0 < \alpha \leq 1$, если существует постоянная C такая, что*

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

для всех $x, y \in G$. Через $C^{0,\alpha}(G)$ мы обозначаем линейное пространство всех функций, определенных на G , которые ограничены и равномерно непрерывны по Гёльдеру с показателем α . Пространство $C^{0,\alpha}(G)$ называется пространством Гёльдера.

Заметим, что каждая равномерно непрерывная функция Гёльдера равномерно непрерывна, но обратное неверно. Мы проиллюстрируем на двух примерах, что равномерно непрерывные функции Гёльдера находятся между непрерывными и дифференцируемыми функциями. Функция $\varphi : [0, \frac{1}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$, заданная $\varphi(x) = \frac{1}{\ln x}$ для

$x \in (0, \frac{1}{2}]$ и $\varphi(0) = 0$, является равномерно непрерывной, но не равномерно непрерывной по Гёльдеру. Функция $\psi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, заданная $\psi(x) = \sqrt{x}$, равномерно непрерывна по Гёльдеру с показателем степени $\frac{1}{2}$, но не непрерывно дифференцируемая на $[0, 1]$. В общем случае, согласно теореме о среднем значении, непрерывно дифференцируемая функция на выпуклом множестве с ограниченными производными равномерно непрерывна по Гёльдеру с показателем степени 1.

Теорема 1 (7.2). *Пространство Гёльдера $C^{0,\alpha}(G)$ является банаховым пространством с нормой*

$$\|\varphi\|_\alpha := \sup_{x \in G} |\varphi(x)| + \sup_{x, y \in G, x \neq y} \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\alpha} = \|\varphi\|_\infty + |\varphi|_\alpha.$$

Заметим, что произведение двух равномерно непрерывных функций Гёльдера φ и ψ снова равномерно непрерывно по Гёльдеру

$$\|\varphi\psi\|_\alpha \leq \|\varphi\|_\infty \|\psi\|_\infty + \|\varphi\|_\infty |\psi|_\alpha + |\varphi|_\alpha \|\psi\|_\infty \leq \|\varphi\|_\alpha \|\psi\|_\alpha.$$

Лемма 1 (7.3). *Предположим, что функция φ удовлетворяет $|\varphi(x)| \leq M$ для всех $x \in G$ и*

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

для всех $x, y \in G$ с $|x - y| \leq a$ и некоторыми константами a, C, M и $0 < \alpha \leq 1$. Тогда $\varphi \in C^{0,\alpha}(G)$ с

$$\|\varphi\|_\alpha \leq M + \max\left(C, \frac{2M}{a^\alpha}\right).$$

В частности, из леммы 1 мы видим, что для $\alpha < \beta$ любая функция $\varphi \in C^{0,\beta}(G)$ также содержится в $C^{0,\alpha}(G)$. Для этого вложения у нас есть следующее свойство компактности.

Теорема 2 (7.4). *Пусть $0 < \alpha < \beta \leq 1$ и пусть G компактно. Тогда операторы вложения*

$$I^\beta : C^{0,\beta}(G) \rightarrow C(G)$$

и

$$I^{\alpha,\beta} : C^{0,\beta}(G) \rightarrow C^{0,\alpha}(G)$$

компактны.

2 Интегральный оператор Коши

Пусть D — ограниченная и односвязная область в комплексной плоскости. Мы обозначим его границу через $\Gamma := \partial D$ и предположим, что он относится к классу C^2 . Вектор нормали ν направлен вовне D . Для комплексного интегрирования по контуру Γ мы предполагаем, что направление интегрирования против часовой стрелки.

Интеграл Коши

$$f(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$$

с плотностью $\varphi \in C(\Gamma)$ определяет функцию, голоморфную в $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$ и в D . Очевидно, что для z , изменяющегося в открытой области, не пересекающейся с Γ , подынтегральное выражение непрерывно относительно ζ и непрерывно дифференцируемо относительно z . Следовательно, мы можем дифференцировать, чтобы проверить уравнения Коши-Римана для f . Иногда мы будем называть функцию, которая голоморфна в $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$ и в D , *кусочно-голоморфной*.

В оставшейся части этой главы мы всегда будем предполагать, что $\alpha \in (0, 1)$ для показателя Гёльдера, несмотря на то, что часть наших результатов остается действительной для $\alpha = 1$.

Теорема 3 (7.5). *Для плотности $\varphi \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$, $0 < \alpha < 1$ интеграл Коши существует как главное значение Коши*

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{\Gamma \setminus \Gamma(z;\rho)} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

для всех $z \in \Gamma$. Здесь $\Gamma(z;\rho) := \{\zeta \in \Gamma : |\zeta - z| \leq \rho\}$.

Теорема 4 (Сохоцкий–Племель, 7.6). *Для плотности $\varphi \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$ голоморфная функция f , определяемая интегралом Коши*

$$f(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma, \quad (1)$$

можно продолжить равномерно непрерывно по Гёльдеру из D в \bar{D} и из $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$ в $\mathbb{C} \setminus D$ с предельным значением

$$f_{\pm}(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \mp \frac{1}{2} \varphi(z), \quad z \in \Gamma, \quad (2)$$

где $f_{\pm}(z) = \lim_{h \rightarrow +0} f(z \pm h\nu(z))$. Кроме того, выполняются неравенства

$$\|f\|_{\alpha, D} \leq C \|\varphi\|_{\alpha}, \quad \|f\|_{\alpha, \mathbb{C} \setminus D} \leq C \|\varphi\|_{\alpha}$$

для некоторой константы C , зависящей от α и Γ .

Следствие 1 (7.7). *Интегральный оператор Коши $A : C^{0,\alpha}(\Gamma) \rightarrow C^{0,\alpha}(\Gamma)$, определенный следующим образом*

$$(A\varphi)(z) := \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in \Gamma,$$

ограничен.

В качестве первого применения теоремы Сохоцкого-Племеля⁴ мы решаем задачу нахождения кусочно-голоморфной функции с заданным разрывом вдоль контура Γ .

Теорема 5 (7.8). *Пусть $\varphi \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$. Тогда существует единственная функция f , голоморфная в D и $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$, которую можно продолжить непрерывно из D в \bar{D} и из $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$ в $\mathbb{C} \setminus D$, удовлетворяющая граничному условию*

$$f_- - f_+ = \varphi \quad \text{на } \Gamma,$$

и для которой $f(z) \rightarrow 0$, $z \rightarrow \infty$, равномерно для всех направлений. Эта функция задается формулой (1)

В качестве второго применения теоремы⁴ мы сформулируем необходимые и достаточные условия существования голоморфной функции в D или в $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$ с заданными граничными значениями.

Теорема 6 (7.9). Для заданной функции $\varphi \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$, существует функция f , голоморфная в D и непрерывная в \bar{D} с граничными значениями $f = \varphi$ на Γ тогда и только тогда, когда φ является решением однородного интегрального уравнения второго рода

$$\varphi - A\varphi = 0.$$

Решение задается формулой (1).

Теорема 7 (7.10). Интегральный оператор Коши A удовлетворяет

$$A^2 = I.$$

Заметим, что теорема 7 является еще одним указанием на то, что интегральный оператор Коши A не может быть компактным.

Напомним (см. стр. 40), что два нормированных пространства X и Y с невырожденной билинейной формой $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ называются **двойственной системой** и обозначаются $\langle X, Y \rangle$.

Теорема 8 (7.11). Операторы A и $-A$ сопряжены относительно двойственная системы $\langle C^{0,\alpha}(\Gamma), C^{0,\alpha}(\Gamma) \rangle$ с невырожденной билинейной формой

$$\langle \varphi, \psi \rangle := \int_{\Gamma} \varphi(z) \psi(z) dz, \quad \varphi, \psi \in C^{0,\alpha}(\Gamma).$$

Пример 1 (7.12). Пусть Γ — единичная окружность. Затем, подставляя $z = e^{it}$, $\zeta = e^{i\tau}$, находим

$$\frac{d\zeta}{\zeta - z} = \frac{1}{2} \left(\cot \frac{\tau - t}{2} + i \right) d\tau,$$

т. е. оператор A может быть выражен в виде

$$(A\varphi)(e^{it}) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \left\{ \cot \frac{\tau - t}{2} + i \right\} \varphi(e^{i\tau}) d\tau, \quad t \in [0, 2\pi],$$

с интегралом, который следует понимать как главное значение Коши. Рассмотрим интегральное уравнение первого рода

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cot \frac{\tau - t}{2} \tilde{\varphi}(\tau) d\tau = \tilde{\psi}(t), \quad t \in [0, 2\pi], \quad (3)$$

в пространстве $C^{0,\alpha}[0, 2\pi]$. C

$$\int_0^{2\pi} \cot \frac{t}{2} dt = 0,$$

интегрируя (3) относительно t и меняя порядок интегрирования (используем теорему 8 для $\psi(z) = 1/z$ и преобразуем интегралы), мы находим, что

$$\int_0^{2\pi} \tilde{\psi}(t) dt = 0, \quad (4)$$

является необходимым условием разрешимости (3). Этого также достаточно, потому что, используя $A^2 = I$, мы видим, что при выполнении (3) общее решение (3) задается

$$\tilde{\varphi}(t) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cot \frac{\tau - t}{2} \tilde{\psi}(\tau) d\tau + c, \quad t \in [0, 2\pi], \quad (5)$$

где c — произвольная константа. \square

3 Задача Римана

Задача Римана Найти функцию, голоморфную в D и в $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$, которая может быть продолжена равномерно непрерывно по Гельдеру из D в \bar{D} и из $\mathbb{C} \setminus \bar{D}$ в $\mathbb{C} \setminus D$ так, чтобы удовлетворять граничному условию

$$f_- = g f_+ + h \text{ на } \Gamma \quad (7.17)$$

и

$$f(z) \rightarrow 0, z \rightarrow \infty \quad (7.18)$$

равномерно по всем направлениям. Здесь g и h — заданные равномерно непрерывные по Гельдеру функции на Γ .

Напомним, что $f_{\pm}(z) = \lim_{h \rightarrow +0} f(z \pm h\nu)$, ν — внешняя нормаль.

Перед тем, как дать решение задачи Римана в случае, когда g нигде не обращается в ноль на Γ , мы покажем связь этой задачи с

интегральными уравнениями.

Теорема 7.13 Пусть $a, b, h \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$. Тогда интеграл Коши (7.11)

$$f(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$$

отображает решения $\varphi \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$ интегрального уравнения

$$a\varphi + bA\varphi = h \quad (7.19)$$

линейно и биективно в решения f задачи Римана с граничными условиями

$$(a + b)f_- = (a - b)f_+ + h \text{ на } \Gamma \quad (7.20)$$

Определение 7.14 Пусть g — комплекснозначная и нигде не обращающаяся в ноль функция, определенная на контуре Γ . Индексом функции g называется целое число $\text{ind } g$, равное приращению аргумента функции вдоль контура при движении против часовой стрелки, деленному на 2π :

$$\text{ind } g := \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} d \arg g.$$

Также индекс кривой g можно выразить через логарифм g по формуле:

$$\text{ind } g := \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} d \ln g.$$

Теперь с помощью теоремы Сохоцкого-Племеля мы найдем явное решение однородной задачи Римана.

Теорема 7.15 Пусть $g \in C^{0,\alpha}$ — нигде не обращающаяся в ноль функция с $\text{ind } g = \kappa$. Тогда существует единственная кусочно-голоморфная функция f_0 , удовлетворяющая однородному граничному условию

$$f_{0-} = g f_{0+} \text{ на } \Gamma$$

и

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z^{\kappa} f_0(z) = 1$$

равномерно по всем направлениям. Она называется каноническим решением однородной задачи Римана, обладает свойством $f_0(z) \neq 0$ для всех $z \in \mathbb{C}$, и равномерно непрерывна по Гёльдеру вплоть до границы.

Из доказательства мы замечаем, что произвольная кусочно-голоморфная функция, удовлетворяющая граничному условию $f_- = gf_+$ на Γ получается из канонической функции f_0 умножением на произвольную целую функцию.

Теорема 7.16 В условиях теоремы 7.15, однородная задача Римана допускает $\max(\kappa, 0)$ линейно независимых решений.

4 Интегральные уравнения с ядром Коши

Для $0 < \alpha, \beta \leq 1$ за $C^{0,\beta,\alpha}$ обозначим множество всех функций k , определенных на $\Gamma \times \Gamma$, удовлетворяющих условию

$$|k(z_1, \zeta_1) - k(z_2, \zeta_2)| \leq M(|z_1 - z_2|^\beta + |\zeta_1 - \zeta_2|^\alpha) \quad (7.21)$$

для всех точек $z_1, z_2, \zeta_1, \zeta_2 \in \Gamma$ и некоторой константы M , зависящей от функции k .

Пусть $0 < \alpha < \beta \leq 1$ и предположим, что $a \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$ и $k \in C^{0,\beta,\alpha}(\Gamma \times \Gamma)$. Тогда оператор $K : C^{0,\alpha}(\Gamma) \rightarrow C^{0,\alpha}(\Gamma)$, определенный по формуле

$$(K\varphi)(z) := a(z)\varphi(z) + \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{k(z, \zeta)}{\zeta - z} \varphi(\zeta) d\zeta, \quad z \in \Gamma$$

называется **сингулярным интегральным оператором с ядром Коши**.

Оператор $K^0 : C^{0,\alpha}(\Gamma) \rightarrow C^{0,\alpha}(\Gamma)$, определенный по формуле

$$(K^0\varphi)(z) := a(z)\varphi(z) + \frac{b(z)}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in \Gamma,$$

где $b(z) := k(z, z)$, $z \in \Gamma$, называется **доминантной частью оператора K** . Относительно коэффициентов a и b доминантной части

мы будем предполагать, что $a^2 - b^2$ не обращается в ноль нигде на Γ . Доминантная часть может быть записана в короткой форме $K^0 = aI + bA$, и она ограничена по предложению 7.7. Разбиение оператора K на доминантную часть K^0 и остаток $K - K^0$ справедливо по следующей теореме.

Теорема 7.17 Сингулярный интегральный оператор K ограничен, а разность $K - K^0$ — компактный оператор из $C^{0,\alpha}(\Gamma)$ в $C^{0,\alpha}(\Gamma)$.

Теорема 7.18 Операторы $K^0 = aI + bA$ и $K^{0'} := aI - Ab$ сопряжены относительно двойственной системы $\langle C^{0,\alpha}(\Gamma), C^{0,\alpha}(\Gamma) \rangle$ с билинейной формой $\langle \varphi, \psi \rangle := \int_{\Gamma} \varphi(z)\psi(z)dz$, $\varphi, \psi \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$. Они оба имеют конечномерные ядра, и индекс оператора K^0 дается формулой

$$\text{ind } K^0 = \text{ind } \frac{a - b}{a + b}.$$

Начиная с этого момента, для симметрии будем считать, что $k \in C^{0,\beta,\beta}(\Gamma \times \Gamma)$ с $0 < \alpha < \beta \leq 1$. Сингулярные операторы с ядрами Коши

$$(K\varphi)(z) := a(z)\varphi(z) + \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{k(z, \zeta)}{\zeta - z} \varphi(\zeta) d\zeta, \quad z \in \Gamma$$

и

$$(K'\varphi)(z) := a(z)\varphi(z) - \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{k(z, \zeta)}{\zeta - z} \varphi(\zeta) d\zeta, \quad z \in \Gamma$$

являются сопряженными.

Напомним (см. стр. 55), что если X_1, X_2 — нормированные пространства, а $K : X_1 \rightarrow X_2$ — ограниченный линейный оператор, то ограниченный линейный оператор $R : X_2 \rightarrow X_1$ называется **регуляризатором** K , если $RK = I - A_l$ и $KR = I - A_r$, где $A_l : X_1 \rightarrow X_2$ и $A_r : X_2 \rightarrow X_1$ — компактные.

Теорема 7.19 Оператор $(a^2 - b^2)^{-1} K'$ является регуляризатором K .

Теперь мы готовы вывести классические теоремы Нётер.

Теорема 7.20 (Первая теорема Нётер) Сингулярный интегральный оператор с ядром Коши имеет конечномерное ядро.

Теорема 7.21 (Вторая теорема Нётер) Индекс сингулярного интегрального оператора K с ядром Коши дается формулой

$$\text{ind } K = \text{ind } \frac{a - b}{a + b}.$$

Теорема 7.22 (Третья теорема Нётер) Неоднородное сингулярное интегральное уравнение

$$K\varphi = h$$

имеет решение тогда и только тогда, когда условие

$$\langle h, \psi \rangle = 0$$

выполняется для всех $\psi \in N(K')$.

Теорема 7.23 Пусть $0 < \alpha < \beta \leq 1$, $a \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$, и $k \in C^{0,\beta,\beta}(\Gamma \times \Gamma)$, и предположим, что $a^2 - b^2$ не обращается в ноль нигде на Γ , где $b(z) := k(z, z)$, $z \in \Gamma$.

Тогда, в Гёльдеровом пространстве $C^{0,\alpha}(\Gamma)$, число линейно независимых решений однородного сингулярного интегрального уравнения

$$a(z)\varphi(z) + \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{k(z, \zeta)}{\zeta - z} \varphi(\zeta) d\zeta = 0, \quad z \in \Gamma$$

и его сопряженного уравнения

$$a(z)\varphi(z) - \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{k(z, \zeta)}{\zeta - z} \varphi(\zeta) d\zeta = 0, \quad z \in \Gamma$$

оба конечны, и их разность равна индексу

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} d \ln \frac{a - b}{a + b}.$$

Неоднородное сингулярное интегральное уравнение

$$a(z)\varphi(z) + \frac{1}{\pi i} \int_{\Gamma} \frac{k(z, \zeta)}{\zeta - z} \varphi(\zeta) d\zeta = h(z), \quad z \in \Gamma$$

имеет решение тогда и только тогда, когда условие

$$\int_{\Gamma} h(z)\psi(z)dz = 0$$

выполнено для всех решений ψ однородного сопряженного уравнения.

Для уравнений первого типа, то есть для уравнений с $a = 0$, выполнено следующее предложение.

Предложение 7.24 Сингулярные интегральные операторы первого типа с ядром Коши имеют индекс ноль.

С помощью примера 7.12, выбирая в качестве Γ — единичную окружность, мы получаем следующее предложение, которое содержит равенства, ради которых Фриц Нетер доказывал названные в честь него теоремы.

Предложение 7.25 Пусть a и k — действительнoзначные и 2π -периодические функции, и пусть $a^2 + b^2$ строго положительно, где $b(t) := k(t, t)$ для $t \in [0, 2\pi]$. Тогда для сингулярного интегрального уравнения с ядром Гильберта

$$a(t)\varphi(t) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t, \tau) \cot \frac{\tau - t}{2} \varphi(\tau) d\tau = h(t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

и для его сопряженного уравнения

$$a(t)\psi(t) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(t, \tau) \cot \frac{\tau - t}{2} \psi(\tau) d\tau = g(t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

три теоремы Нётер верны, то есть количества линейно независимых решений однородного уравнения и однородного сопряженного уравнения оба конечны, и их разность равна индексу

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} d \arctan \frac{a}{b}.$$

Неоднородное уравнение имеет решения тогда и только тогда, когда условие

$$\int_0^{2\pi} h(t)\psi(t)dt = 0$$

выполнено для всех решений ψ однородного сопряженного уравнения.

Теорема 7.26 Интегральный оператор Коши A является ограниченным оператором из $L^2(\Gamma)$ в $L^2(\Gamma)$.

В частности, как следствие теоремы 7.26, свойство $A^2 = I$ из теоремы 7.10 остается верным в $L^2(\Gamma)$ и может быть использовано для построения регуляризаторов, как в теореме 7.19.

5 Интеграл Коши и логарифмический потенциал

В интеграл Коши для фиксированного $z \in \mathbb{C}$ подставим $\zeta - z = re^{i\vartheta}$, где $r = |\zeta - z|$ и $\vartheta = \arg(\zeta - z)$. Тогда

$$\int_{\Gamma} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = \int_{\Gamma} d \ln(\zeta - z) = \int_{\Gamma} d(\ln r + i\vartheta) = \int_{\Gamma} \left(\frac{\partial \ln r}{\partial s} + i \frac{\partial \vartheta}{\partial s} \right) ds.$$

Из условий Коши-Римана, примененным к $\ln(\zeta - z) = \ln r + i\vartheta$, мы имеем

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial s} = \frac{\partial \ln r}{\partial \nu} = -\frac{\partial}{\partial \nu} \ln \frac{1}{r}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= -\frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\partial}{\partial \nu(\zeta)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) - \\ &- \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\partial}{\partial s(\zeta)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta). \end{aligned} \quad (7.35)$$

Эта формула показывает, что для вещественных плотностей действительная часть интеграла Коши совпадает с логарифмическим потенциалом двойного слоя

$$v(z) := \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\partial}{\partial \nu(\zeta)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta), \quad z \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma.$$

Следовательно, из теоремы 7.6 и формулы Сохоцкого-Племеля (7.12) можно вывести следующую теорему.

Теорема 7.27 Логарифмический потенциал двойного слоя v с непрерывной по Гёльдеру плотностью φ может быть продолжен равномерно непрерывно по Гельдеру из D в \overline{D} и из $\mathbb{R}^2 \setminus \overline{D}$ в $\mathbb{R}^2 \setminus D$ с предельными значениями

$$v_{\pm}(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\partial}{\partial \nu(\zeta)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) \pm \frac{1}{2} \varphi(z), \quad z \in \Gamma. \quad (7.36)$$

Градиент логарифмического потенциала простого слоя

$$u(z) := \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta), \quad z \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma$$

равен

$$\nabla u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\zeta - z}{|\zeta - z|^2} ds(\zeta), \quad z \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma.$$

Можно видеть, что градиент потенциала простого слоя u соответствует комплексному сопряжению голоморфной функции f , заданной интегралом Коши. Тогда снова пользуясь теоремой 7.6, можно доказать следующую теорему.

Теорема 7.28 Первые производные логарифмического потенциала простого слоя u с непрерывной по Гёльдеру плотностью могут быть продолжены равномерно непрерывно по Гёльдеру из D в \overline{D} и из $\mathbb{R}^2 \setminus \overline{D}$ в $\mathbb{R}^2 \setminus D$ с предельными значениями

$$\nabla u_{\pm}(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \nabla \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) \mp \frac{1}{2} \nu(z) \varphi(z), \quad z \in \Gamma. \quad (7.39)$$

Определим логарифмический интегральный оператор простого слоя S :

$$(S\varphi)(z) := \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta), \quad z \in \Gamma,$$

из $C^{0,\alpha}(\Gamma)$ в $C^{1,\alpha}(\Gamma)$. Через $C^{1,\alpha}(\Gamma)$ мы обозначаем нормированное пространство всех функций, определенных на Γ и имеющих равномерно непрерывную по Гёльдеру первую производную, снабженное нормой

$$\|\varphi\|_{1,\alpha} := \|\varphi\|_{\infty} + \|\varphi'\|_{0,\alpha},$$

где простое число указывает дифференцирование по длине дуги.

Из Теоремы 7.28 можно получить следующий результат.

Теорема 7.29 Первые производные логарифмического потенциала двойного слоя v с плотностью $\varphi \in C^{1,\alpha}(\Gamma)$ могут быть продолжены равномерно непрерывно по Гёльдеру из D в \overline{D} и из $\mathbb{R}^2 \setminus \overline{D}$ в $\mathbb{R}^2 \setminus D$. При этом нормальная производная задается через

$$\frac{\partial v_{\pm}}{\partial \nu}(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{ds(z)} \int_{\Gamma} \frac{d\varphi}{ds}(\zeta) \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta), \quad z \in \Gamma, \quad (7.41)$$

а тангенциальная производная через

$$\frac{\partial v_{\pm}}{\partial s}(z) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \frac{d\varphi}{ds}(\zeta) \frac{\partial}{\partial \nu(z)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) \pm \frac{1}{2} \frac{d\varphi}{ds}(z), \quad z \in \Gamma \quad (7.42)$$

Это означает, что оператор T , определяемый нормальной производной логарифмического потенциала двойного слоя

$$(T\varphi)(z) := \frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial \nu(z)} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\partial}{\partial \nu(\zeta)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta), \quad z \in \Gamma, \quad (7.43)$$

может быть выражен через интегральный оператор простого слоя в виде

$$T\varphi = \frac{d}{ds} S \frac{d\varphi}{ds}. \quad (7.44)$$

Теперь продемонстрируем, как двумерные задачи Дирихле и Неймана для гармонических функций могут быть решены с помощью интегральных уравнений первого рода. Для краткости обозначения введем оператор $M : C^{0,\alpha}(\Gamma) \rightarrow C^{0,\alpha}(\Gamma)$, так что

$$M\psi := \psi - \frac{1}{|\Gamma|} \int_{\Gamma} \psi ds.$$

Потенциал простого слоя

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} (M\psi)(\zeta) \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) + \frac{1}{|\Gamma|} \int_{\Gamma} \psi ds, \quad z \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma, \quad (7.45)$$

решает внутреннюю и внешнюю задачи Дирихле с граничным условием $u = f$ на Γ при условии, что плотность $\psi \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$ решает интегральное уравнение

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} (M\psi)(\zeta) \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) + \frac{1}{|\Gamma|} \int_{\Gamma} \psi ds = f(z), \quad z \in \Gamma \quad (7.46)$$

Сократим (7.46) до формы $S_0\psi = f$, где

$$S_0\psi := SM\psi + \frac{1}{|\Gamma|} \int_{\Gamma} \psi ds \quad (7.47)$$

Поскольку S отображает $C^{0,\alpha}(\Gamma)$ в $C^{1,\alpha}(\Gamma)$, уравнение (7.46) может быть решено только для $f \in C^{1,\alpha}(\Gamma)$.

Теорема 7.30 Модифицированный оператор простого слоя $S_0 : C^{0,\alpha}(\Gamma) \rightarrow C^{1,\alpha}(\Gamma)$ является биективным с ограниченным обратным $S_0^{-1} : C^{1,\alpha}(\Gamma) \rightarrow C^{0,\alpha}(\Gamma)$.

Обратимся теперь к задаче Неймана. Потенциал двойного слоя

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\partial}{\partial \nu(\zeta)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta), \quad z \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma, \quad (7.51)$$

решает внутреннюю и внешнюю задачу Неймана с граничным условием $\partial u / \partial \nu = g$ на Γ при условии, что плотность $\varphi \in C^{1,\alpha}(\Gamma)$ решает интегральное уравнение

$$\frac{1}{2\pi} \frac{\partial}{\partial \nu(z)} \int_{\Gamma} \varphi(\zeta) \frac{\partial}{\partial \nu(\zeta)} \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) = g(z), \quad z \in \Gamma. \quad (7.52)$$

Теорема 7.31 Для любого $g \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$, удовлетворяющего условию разрешимости

$$\int_{\Gamma} g ds = 0 \quad (7.53)$$

внутренней и внешней двумерной задачи Неймана, существует решение $\varphi \in C^{1,\alpha}(\Gamma)$ интегрального уравнения первого рода (7.52). Два различных решения могут отличаться друг от друга только константой.

6 Логарифмический потенциал простого слоя на дуге

В заключительном разделе этой главы мы хотели бы показать, как модификации интегральных уравнений первого рода из раздела 5, возникающих из задачи Дирихле или Неймана для внешней стороны дуги, могут быть сведены к случаю замкнутого граничного контура с помощью косинусной подстановки, предложенной Мультхоппом. Для краткости ограничимся случаем потенциала простого слоя для задачи Дирихле.

Предположим, что $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ является дугой из класса C^3 , т.е.

$$\Gamma = \{x(s) : s \in [-1, 1]\},$$

где $x : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ является инъективной и трижды непрерывной функцией с $x'(s) \neq 0$ для всех $s \in [-1, 1]$.

Рассмотрим задачу Дирихле для уравнения Лапласа во внешней части дуги Γ : При заданной функции $f \in C^{1,\alpha}(\Gamma)$ найти ограниченное решение $u \in C^2(\mathbb{R}^2 \setminus \Gamma) \cap C(\mathbb{R}^2)$ уравнения Лапласа

$$\Delta u = 0 \text{ в } \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma, \quad (7.54)$$

удовлетворяющее граничному условию Дирихле

$$u = f \text{ на } \Gamma. \quad (7.55)$$

Отметим, что помимо непрерывности мы явно не предполагаем никаких условий для поведения решения в двух конечных точках $z_1 := x(1)$ и $z_{-1} := x(-1)$ дуги Γ .

Теорема 7.32 Задача Дирихле для внешней части дуги имеет не более одного решения.

Можно показать, что потенциал простого слоя

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} (M\psi)(\zeta) \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) + \frac{1}{|\Gamma|} \int_{\Gamma} \psi ds, \quad z \in \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma, \quad (7.56)$$

решает задачу Дирихле (7.54)-(7.55) при условии, что плотность удовлетворяет интегральному уравнению

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} (M\psi)(\zeta) \ln \frac{1}{|\zeta - z|} ds(\zeta) + \frac{1}{|\Gamma|} \int_{\Gamma} \psi ds = f(z), \quad z \in \Gamma. \quad (7.58)$$

Предполагается, что плотность ψ имеет вид

$$\psi(z) = \frac{\overline{\psi}(z)}{\sqrt{|z - z_1||z - z_{-1}|}}, \quad z \in \Gamma \setminus \{z_1, z_{-1}\}, \quad (7.57)$$

где $\overline{\psi} \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$.

Сделаем подстановку $s = \cos t$ в параметризацию $\Gamma = \{x(s) : s \in [-1, 1]\}$, чтобы преобразовать интегральное уравнение (7.58) к виду

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \{-\ln(4[\cos t - \cos \tau]^2) + p(t, \tau)\} \varphi(\tau) d\tau = g(t), \quad t \in [0, \pi]. \quad (7.59)$$

Здесь

$$\varphi(t) := |\sin tx'(\cos t)|\psi(x(\cos t)), \quad g(t) := f(x(\cos t)), \quad t \in [0, \pi],$$

а ядро p задается через

$$\begin{aligned} p(t, \tau) := & \ln \frac{4[\cos t - \cos \tau]^2}{|x(\cos t - x(\cos \tau))|^2} + \frac{4\pi}{|\Gamma|} - \\ & - \frac{1}{|\Gamma|} \int_0^\pi \ln \frac{1}{|x(\cos t - x(\cos \sigma))|^2} |x'(\cos \sigma)| \sin \sigma d\sigma \end{aligned}$$

для $t \neq \tau$. Решение интегрального уравнения (7.58) для функции на ψ на Γ эквивалентно решению интегрального уравнения (7.59) для четной 2π -периодической функции φ .

Теорема 7.33 Для каждого $f \in C^{1,\alpha}(\Gamma)$ интегральное уравнение простого слоя (7.58) имеет единственное решение ψ вида (7.57) с $\overline{\psi} \in C^{0,\alpha}(\Gamma)$.

Теорема 7.34 Задача Дирихле (7.54)-(7.55) для внешней части дуги однозначно разрешима.

Список литературы

[1] R.Kress, *Linear Integral Equations*, pp 94-124