

$$\mu_{t+1}(\omega; A) = \sum_n \frac{\int_A \text{Pr}_n(s) \mu_t(ds)}{\int \text{Pr}_n(s) d\mu_t(ds)} X_{t+1}^n(\omega)$$

Здесь $\text{Pr}_n : S \rightarrow \mathbb{R}$ - n -я координата.

Пусть $\varphi(s) = \sum_i \varphi_i I_{A_i}(s)$. Тогда

$$\begin{aligned} \int \varphi(s) \mu_{t+1}(ds) &= \sum_i \varphi_i \mu_{t+1}(A_i) = \sum_i \varphi_i \sum_n \frac{\int_{A_i} \text{Pr}_n(s) \mu_t(ds)}{\int \text{Pr}_n(s) d\mu_t(ds)} X_{t+1}^n(\omega) = \\ &= \sum_n X_{t+1}^n(\omega) \frac{\int \varphi(s) \text{Pr}_n(s) \mu_t(ds)}{\int \text{Pr}_n(s) d\mu_t(ds)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \int \varphi(s) \mu_{t+1}(ds) \right| &\leq \sum_n X_{t+1}^n(\omega) \frac{\int |\varphi(s)| \text{Pr}_n(s) \mu_t(ds)}{\int \text{Pr}_n(s) d\mu_t(ds)} \leq \\ &= \sum_n X_{t+1}^n(\omega) \frac{\left(\int \text{Pr}_n(s)^2 \mu_t(ds) \right)^{1/2}}{\int \text{Pr}_n(s) d\mu_t(ds)} \|\varphi\|_{L_2(\mu_t)} \end{aligned}$$

Из теоремы Рисса следует

$$\int \varphi(s) \mu_{t+1}(ds) = \int \varphi(s) b_{t+1}(s) \mu_t(ds)$$

Тогда $\mu_t(ds) = b_t(s) \cdots b_1(s) \mu_0(ds)$. Тем самым доказано следующее утверждение

Предложение 1. Если $\mu_0(ds) = \rho_0(s)ds$, то $\mu_t(ds) = \rho_t(s)ds$.

$$W_2^2(\mu, \sigma) = \inf_{\pi \in \Pi(\mu, \sigma)} \int |x - y|^2 \pi(dxdy)$$

Теорема 1. Для любых $\mu_0, \mu_1 \in P_2(\mathbb{R}^d)$ существует геодезическая постоянной скорости, соединяющая их. Более того, если μ_t - геодезическая постоянной скорости, то существует оптимальный план $\pi \in \Pi(\mu_0, \mu_1)$ такой, что $\mu_t = \pi \circ ((1-t)x + y)^{-1}$.

В качестве примера рассмотрим $\mu_0 = \delta_0, \mu_1 = \lambda_{[-1,1]}$. Тогда $\Pi(\mu_0, \mu_1) = \{\delta_0 \otimes \lambda_{[-1,1]}\}$. Тем самым, геодезическая постоянной скорости имеет вид $\mu_t = \delta_0 \otimes \lambda_{[-1,1]} \circ ((1-t)x + ty)^{-1}$. Тогда

$$\int \varphi(z) \delta_0 \otimes \lambda_{[-1,1]} \circ ((1-t)x + ty)^{-1}(dz) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \int \varphi((1-t)x + ty) \delta_0(dx) dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \varphi(ty) dy$$

То есть

$$\int \varphi d\mu_t = \frac{1}{2t} \int_{-t}^t \varphi(x) dx$$

Значит, $\mu_t = \lambda_{[-t,t]}$.

Аналогично в случае $\mu_0 = \delta_1, \mu_1 = \lambda_{[-1,1]}$ геодезическая постоянной скорости имеет вид $\mu_t = \lambda_{[1-2t,1]}$.

Вернемся к изначальной задаче. Обозначим $\mu_0(ds) = \rho(s)ds$. Построим оптимальный план $\pi \in \Pi(\lambda_S, \mu_0)$, где λ_S - мера Лебега на симплексе S .

В данном случае в силу теоремы Бренье существует оптимальное отображение $T(u) = \nabla\psi(u)$, то есть $\mu_0 = \lambda \circ T^{-1}$. Тогда

$$\int \varphi(s) \rho(s) ds = \int \varphi \lambda \circ T^{-1} = \int \varphi(T(u)) du = \int \varphi(s) \frac{du}{ds} ds = \int \varphi(s) \left(\frac{dT}{du} \right)^{-1} ds$$

Получаем уравнение типа Монжа-Ампера

$$\rho(\nabla\psi(u)) \frac{d^2\psi}{du^2} = E$$

В этом случае геодезическая имеет вид

$$\mu_t = \lambda \circ ((1-t)x + t\nabla\psi(x))^{-1}$$

Как найти плотность $\rho_t(s)$?

$$\int \varphi(s) \mu_{t+1}(ds) = \int \varphi(s) b_{t+1}(s) \rho_t ds = \sum_n X_{t+1}^n(\omega) \frac{\int \varphi(s) \Pr_n(s) \rho_t(s) ds}{\int \Pr_n(s) \rho_t(s) ds}$$

Тем самым плотность $\rho_{t+1} = b_{t+1} \rho_t$ можно вычислить индуктивно

$$b_{t+1}(s) = \sum_n X_{t+1}^n(\omega) \frac{\Pr_n(s)}{\int \Pr_n(s) \rho_t(s) ds}$$

$$b_1(s) = \sum_n X_1^n(\omega) \frac{\Pr_n(s)}{\int \Pr_n(s) \rho_0(s) ds}$$