

ЭКЗАМЕН 2021

Во всех задачах w — винеровский процесс, $\Lambda_t = t$.

1. Покажите, что процесс $B_t = w_1 - w_{1-t}$ — винеровский на отрезке $[0, 1]$.
2. Выпишите решение СДУ $dX_t = -(1/2)X_t dt + w_t$, $X_0 = 0$, и покажите, что $X_{\ln(t+1)}\sqrt{t+1}$ — винеровский процесс. Пользуясь законом повторного логарифма вычислите $\limsup_{t \rightarrow \infty} X_t/\sqrt{t}$.
3. Докажите, что w — мартингал относительно фильтрации (\mathcal{F}_{t+}^o) , где $\mathcal{F}_t^o := \sigma\{w_s, s \leq t\}$.
4. Пусть (w, \mathcal{F}) — измеримое пространство с фильтрацией $\mathbf{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$. На множестве $w \times \mathbb{R}_+$ определены σ -алгебры $\mathcal{P} := \sigma\{A \times]s, \infty[, A \in \mathcal{F}_s, s \geq 0, B \times \{0\}, B \in \mathcal{F}_0\}$ (предсказуемая) и $\mathcal{O} := \sigma\{A \times [s, \infty[, A \in \mathcal{F}_s, s \geq 0\}$ (опциональная). Какая из них включает другую?
5. Пусть $M^n \in \mathcal{M}_0^{2,c}$, $\langle M^n \rangle \leq C = \text{const}$ и $\langle M^n \rangle_t \rightarrow t$ при $n \rightarrow \infty$. Показать, что распределения случайных величин M_t^n слабо сходятся к гауссовскому распределению с нулевым средним и дисперсией t .
6. Пусть X^x — решение СДУ $dX_t^x = f(X_t^x)dt + g(X_t^x)dw_t$, $X_0^x = x$, где $f, g \in C^1$, f' и g' ограничены, и пусть Y — решение СДУ $dY_t = f'(X_t^x)Y_t dt + g(X_t^x)Y_t dw_t$, $Y_0 = 1$. Показать, что Y_t — производная функции $x \mapsto X_t^x$.
7. По теореме о предсказуемом представлении $w_1^4 = Ew_1^4 + \varphi \cdot w_1$, где $\varphi \in L^{2,2}$. Найти φ .
8. Пусть динамика управляемого процесса задаётся СДУ $dX_t = (u_t - \rho X_t)dt + \sigma X_t dw_t$, где управление $(u_t)_{t \leq T}$ — предсказуемый процесс со значениями в $[0, M]$. Цель: при заданном начальном условии максимизировать

$$\mathbb{E}\left(\gamma X_T - \int_0^T e^{-ct} u_t dt\right).$$

Записать уравнение Беллмана.

9. Цена рискового актива $S = x + a\Lambda + \sigma w$. Процентная ставка равна нулю. Получить формулу для цены опциона колл.
10. Определить цену опциона колл с погашением через 180 дней по модели BS. Цена акции 95, страйк 105, волатильность 11, процентная ставка 2.

1 Решения

1.1 Задача 1

Отметим, что процесс B согласован с фильтрацией $\mathcal{G}_t = \sigma(w_1 - w_{1-s} : s \leq t)$. Также для $0 < t \leq 1$ выполнено

$$B_t - B_s = w_{1-s} - w_{1-t}$$

и так как винеровский процесс w имеет независимые приращения, нетрудно проверить, что $B_t - B_s$ независим с \mathcal{G}_s . Очевидно, что $B_t - B_s$ имеет Гауссово распределение $\mathcal{N}(0, t - s)$ и $B_0 = 0$, значит, по определению заключаем, что B есть винеровский процесс.

1.2 Задача 2

Ищем такую замену, чтобы в правой части X_t не было и мы смогли проинтегрировать.

а) Пусть $Y_t = f(x, t) = xe^{\frac{t}{2}}$, следовательно $f'_t = \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}x$, $f'_x = e^{\frac{t}{2}}$, $f''_{xx} = 0$.

Получаем

$$\begin{aligned} dY_t &= f'_t dt + f'_x dX_t + \frac{1}{2} f''_{xx} (dX_t)^2 \\ dY_t &= \left(\frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}X_t\right)dt + e^{\frac{t}{2}}\left(-\frac{1}{2}X_t dt + dw_t\right) \\ dY_t &= \left(\frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}X_t - \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}X_t\right)dt + e^{\frac{t}{2}}dw_t = e^{\frac{t}{2}}dw_t \end{aligned}$$

Получили, что $d(e^{\frac{t}{2}}X_t) = e^{\frac{t}{2}}dw_t$, следовательно $e^{\frac{t}{2}}X_t - e^0X_0 = \int_0^t e^{\frac{s}{2}}dw_s$

Ответ: $X_t = \int_0^t e^{\frac{s-t}{2}}dw_s$

b.1) Первый способ:

$$Z_t = X_{\ln(t+1)}\sqrt{t+1} \Rightarrow Z_t = \sqrt{t+1}X_{\ln(t+1)} = \sqrt{t+1}e^{-\ln \frac{(t+1)}{2}} \int_0^{\ln(t+1)} e^{s/2}dw_s = \int_0^{\ln(1+t)} e^{\frac{u}{2}}dw_u = f \cdot w_{\ln(1+t)}, \text{ где } f = e^{\frac{u}{2}}.$$

Посчитаем $\langle Z_t \rangle = \int_0^{\ln(t+1)} e^u du = t \Rightarrow$ по теореме Леви Z_t — винеровский процесс.

b.2) Второй способ:

Покажем, что $Z_t = X_{\ln(t+1)}\sqrt{t+1}$ винеровский процесс.

Мы уже знаем, что

$$X_t = e^{-\frac{t}{2}} \int_0^t e^{\frac{s}{2}} dw_s$$

Значит

$$Z_t = \sqrt{t+1} X_{\ln(t+1)} = \sqrt{t+1} e^{-\frac{\ln(t+1)}{2}} \int_0^{\ln(t+1)} e^{\frac{s}{2}} dw_s = \int_0^{\ln(t+1)} e^{\frac{u}{2}} dw_u$$

Пусть $s < t$

Тогда $Z_t - Z_s$ Гауссовский процесс, ведь Z_t Гауссовский как предел гауссовских величин.

Итак:

$$E(Z_t - Z_s) = 0$$

Далее по свойству изометрии Ито:

$$E(Z_t - Z_s)^2 = \int_{\ln(s+1)}^{\ln(t+1)} e^u du = t - s$$

Значит

$$Law(Z_t - Z_s) = N(0, t - s)$$

Итак, Z_t винеровский процесс.

с) Найти $\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{X_t}{\sqrt{t}}$

Имеем: $\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{w_t}{\sqrt{2t \ln \ln t}} = 1$ верно п.н. в силу закона повторного логарифма.

$$w_t = X_{\ln(t+1)} \sqrt{t+1} \Rightarrow w_{e^t-1} = X_{\ln e^t} \sqrt{e^t} = X_t e^{\frac{t}{2}} \Rightarrow X_t = \frac{w_{e^t-1}}{e^{\frac{t}{2}}}$$

Получается, что нужно найти: $\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{w_{e^t-1}}{\sqrt{te^{\frac{t}{2}}}}$. Сделаем замену $s = e^t - 1 \Rightarrow t = \ln(s+1)$.

Получаем

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{w_{e^t-1}}{\sqrt{te^{\frac{t}{2}}}} = \limsup_{s \rightarrow \infty} \frac{w_s}{\sqrt{s+1} \sqrt{\ln(s+1)}} = \limsup_{s \rightarrow \infty} \frac{w_s}{\sqrt{2s \ln \ln s}} \sqrt{\frac{2s \ln \ln s}{(s+1) \ln(s+1)}} \rightarrow 0$$

Так как $\limsup_{s \rightarrow \infty} \frac{w_s}{\sqrt{2s \ln \ln s}} \rightarrow 1$, а $\frac{2s \ln \ln s}{(s+1) \ln(s+1)} \rightarrow 0$ п.н.

Ответ: $\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{X_t}{\sqrt{t}} = 0$

1.3 Задача 3

$\mathcal{F}_t^o = \cap_{m \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_{t+\frac{1}{m}}^o$, где $\mathcal{F}_t^o := \sigma\{w_s, s \leq t\}$.

$$E(w_t | \mathcal{F}_{s+}) = E(w_t - w_s | \mathcal{F}_{s+}) + E(w_s | \mathcal{F}_{s+}) = E(w_t - w_s | \mathcal{F}_{s+}) + w_s.$$

Т.е. достаточно доказать, что $E(w_t - w_s | \mathcal{F}_{s+}) = 0$

$E(w_t - w_s | \mathcal{F}_{s+}) = E(w_t - w_{s+\frac{1}{n}} | \mathcal{F}_{s+}) + E(w_{s+\frac{1}{n}} - w_s | \mathcal{F}_{s+}) = E(w_{s+\frac{1}{n}} - w_s | \mathcal{F}_{s+})$ т.к. первое УМО равно 0 в силу независимости $w_t - w_{s+\frac{1}{n}}$ и \mathcal{F}_{s+} .

$E(w_{s+\frac{1}{n}} - w_s | \mathcal{F}_{s+}) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ по теореме Лебега.

1.4 Задача 4

Покажем, что любой порождающий элемент \mathcal{P} можно составить из порождающих элементов \mathcal{O} .

Порождающие элементы \mathcal{P} бывают двух типов:

1) $A \times]s, \infty[= \cap_{n \in \mathbb{N}} A \times [s + \frac{1}{n}, \infty[$, при этом $A \in \mathcal{F}_s \Rightarrow A \in \mathcal{F}_{s+\frac{1}{n}} \forall n \Rightarrow A \times]s, \infty[\in \mathcal{O}$.

2) $B \times \{0\} = B \times [0, \infty] \setminus B \times]0, \infty[$. Они оба принадлежат \mathcal{O} , первое по определению, а про второе доказали в пункте 1, следовательно разность принадлежит \mathcal{O} .

1.5 Задача 5

Имеем:

$$e^{i\lambda M_t^n} = 1 + i\lambda \int_0^t e^{i\lambda M_s^n} dM_s^n - \frac{1}{2}\lambda^2 \int_0^t e^{i\lambda M_s^n} d\langle M_s^n \rangle$$

$$\phi_t^n = 1 - \frac{1}{2}\lambda^2 \mathbf{E} \int_0^t e^{i\lambda M_s^n} d\langle M_s^n \rangle$$

$$\phi_0^n = 1$$

По определению стохастического интеграла

$$\int_0^t e^{i\lambda M_s^n} d < M_s^n > = \lim_{\max_i |t_{i+1} - t_i| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k e^{i\lambda M_{t_j}^n} (< M_{\min(t_{j+1}, t)}^n > - < M_{\min(t_j, t)}^n >)$$

где $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{k+1} = T$.

Перейдем к пределу $n \rightarrow \infty$: Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t e^{i\lambda M_s^n} d < M_s^n > = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{\max_i |t_{i+1} - t_i| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k e^{i\lambda M_{t_j}^n} (< M_{\min(t_{j+1}, t)}^n > - < M_{\min(t_j, t)}^n >)$$

Так как $< M_s^n > \leq C$ и сумма конечная, то внутренний предел существует, значит имеем право поменять пределы местами.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t e^{i\lambda M_s^n} d < M_s^n > = \lim_{\max_i |t_{i+1} - t_i| \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^k e^{i\lambda M_{t_j}^n} (< M_{\min(t_{j+1}, t)}^n > - < M_{\min(t_j, t)}^n >) =$$

Возьмем МО от обеих частей и перейдем к пределу по n.

$$= \lim_{\max_i |t_{i+1} - t_i| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^k \phi_{t_j} (\min(t_{j+1}, t) - \min(t_j, t)) = \int_0^t \phi_s ds$$

$$\phi_t = 1 - \frac{1}{2} \lambda^2 \int_0^t \phi_s ds$$

Это верно, так как $< M_s^n > \rightarrow s$ и $< M_s^n > \leq C$

$$\phi_0 = 1$$

Следовательно $\phi_t = e^{-\frac{1}{2} \lambda^2 t}$, то есть получили характеристическую функцию Гауссовского распределения с нулевым средним и дисперсией t.

1.6 Задача 6

Остается для следующих поколений.

1.7 Задача 7

Пишем формулу Ито для $f(x) = x^4$.

$$f'_x = 4x^3, \quad f''_{xx} = 12x^2$$

Следовательно $d(w_t^4) = 4X_t^3 dw_t + 6w_t^2 dt$.

Хотим что-то вычесть так, чтобы получился мартингал. Нужно вычесть $f = 6 \int_0^t W_s^2 ds$.

Рассмотрим $M_t = w_t^4 - 6 \int_0^t W_s^2 ds$. – это мартингал, поэтому у него коэффициента при dt не будет, а коэффициент при dw_t то, что нам нужно и это $4w_t^3$.

Ответ: $\phi = 4w_t^3$.

1.8 Задача 8

Данное СДУ $dX_t = (\mu_t - \rho X_t)dt + \sigma X_t dw_t$, а мы хотим:

$$E(\gamma X_T - \int_0^T e^{-ct} u_t dt) \rightarrow \max.$$

Пусть $W(t, X) = \sup_{X_t=x, \pi \in A(x,t)} E(\gamma X_T - \int_t^T e^{-cs} u_s ds)$. Пусть $f \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}_+)$ и $f(T, x) = \gamma x$. Рассмотрим $Y_t = f(t, X_t) - \int_0^t e^{-cs} u_s ds$ и $X_0 = x$.

Если для всех стратегий это супермартингал, то

$$EY_T = E(\gamma X_T - \int_0^T e^{-ct} u_t dt) \leq f(0, x) = EY_0$$

Если для какой-то стратегии это мартингал, то для неё

$$E(\gamma X_T - \int_0^T e^{-ct} u_t dt) = f(0, x) \Rightarrow W(0, x) = f(0, x)$$

По формуле Ито:

$$dY_t = \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \sigma^2 X_t^2 + \frac{\partial f}{\partial x} (u_t - \rho X_t) - e^{-ct} u_t \right)}_{=: L^{u_t} f(t, X_t)} dt + \frac{\partial f}{\partial x} \sigma X_t dw_t$$

В итоге, уравнение Беллмана имеет вид:

$$\sup_u \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \sigma^2 x^2 + \frac{\partial f}{\partial x} (u - \rho x) - e^{-ct} u \right) = 0$$

1.9 Задача 9

$$\xi = p + H \cdot S_t$$

$$H \cdot S_t = H(a \cdot \Lambda_T + \sigma \cdot w_T) = Ha \cdot \Lambda_T + H\sigma \cdot w_T$$

$\tilde{w}_t := w_t + \frac{a}{\sigma} \cdot \Lambda_t \Rightarrow \phi_t = H_t \cdot \sigma \Rightarrow \xi = p + \phi \cdot \tilde{w}_T \Rightarrow \tilde{W}$ — винеровский по теореме Гирсанова
 \Rightarrow по теореме о предсказуемом представлении $p = \tilde{E}\xi$, по мере $\tilde{P} = Pe^{\frac{-a}{\sigma} \cdot W - \frac{1}{2} \frac{a^2}{\sigma^2} \cdot \Lambda}$.

Свели задачу к случаю, когда

$$dS_t = S_t(adt + \sigma dw_t)$$

Далее получаем цену опциона в момент t

$$C(t, x, \sigma) = x\Phi(d) - K\Phi(d - \sigma\sqrt{T-t}),$$

$$d = d(t, x, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \ln \frac{x}{K} + \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T-t}.$$

1.10 Задача 10

Решение: Для того, чтобы определить цену опциона “колл” с дисконтированным платежом воспользуемся формулой

$$C(0, T, \sigma) = x\Phi(d_1(0, x)) - Ke^{-rT}\Phi(d_2(0, x)), \text{ где}$$

$$d_1(0, x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T}} \ln \frac{x}{K} + \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T} + \frac{r}{\sigma}\sqrt{T}, \quad d_2(0, x) = d_1(0, x) - \sigma\sqrt{T}$$

Вычислим сначала d_1 и d_2 :

$$d_1(0, x) = \frac{1}{0,11\sqrt{\frac{180}{365}}} \ln \frac{95}{105} + \frac{1}{2}0,11\sqrt{\frac{180}{365}} + \frac{0,02}{0,11}\sqrt{\frac{180}{365}} \approx -1,295626431 + 0,16630483 \approx -1,129321601$$

$$d_2(0, x) = -1,129321601 - 0,11\sqrt{\frac{180}{365}} \approx -1,206568759$$

Следовательно,

$$C(0, \frac{180}{365}, 0,11) = 95\Phi(-1,129321601) - 105e^{-\frac{360}{365}}\Phi(-1,206568759) \approx 0,459568194$$

Также приведем программный код, подтверждающий наши выкладки

```
In [55]: r=0.02
          sigm=0.11
          tau=180/365
          S=95
          K=105

          def Phi(x):
              return 0.5*(1+scipy.special.erf(x/np.sqrt(2)))

          def N1():
              a=np.log(S/K) + (r+sigm*sigm/2)*tau
              a=a/(sigm*np.sqrt(tau))
              return Phi(a)

          def N2():
              a=np.log(S/K) + (r-sigm*sigm/2)*tau
              a=a/(sigm*np.sqrt(tau))
              return Phi(a)

          def price():
              return S*N1()-K*N2()*np.exp(-r*tau)

          price()

Out [55]: 0.45956819386863046
```

Figure 1: Численные выкладки в 10 задаче.