

# Задачи на интегралы

4 сентября 2022 г.

## Базовые правила интегрирования и табличные интегралы

**Табличные интегралы.**

1.  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, (n \neq -1)$
2.  $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$
3.  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
4.  $\int e^x dx = e^x + C$
5.  $\int \sin x dx = -\cos x + C$
6.  $\int \cos x dx = \sin x + C$
7.  $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
8.  $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$
9.  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C = -\arccos \frac{x}{a} + C, (x < a)$
10.  $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C = -\frac{1}{a} \operatorname{arcctg} \frac{x}{a} + C$
11.  $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, (x \neq a)$
12.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$

Здесь перечислены базовые трюки для нахождения неопределенных интегралов.

**Интегрирование по частям.** Если функции  $u, v$  гладкие, то

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

**Замена переменной и занесение под дифференциал.** Если на некотором

промежутке  $I_x$ :

$$\int f(x)dx = F(x) + c,$$

а  $\varphi(t)$  – гладкое отображение  $I_t \rightarrow I_x$ , то на  $I_t$ :

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + c,$$

Т.е. можно производить замену  $x = \varphi(t)$ :

$$\begin{aligned} \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt &= \int f(\varphi(t))d\varphi(t) = [x = \varphi(t)] = \\ &= \int f(x)dx = F(x) + c = [x = \varphi(t)] = F(\varphi(t)) + c. \end{aligned}$$

Прием можно использовать в обе стороны, вводя  $\varphi$ , либо избавляясь от него.

**Рациональные функции.** Если  $P(x)$  и  $Q(x)$  – многочлены с действительными коэффициентами и

$$Q(x) = (x - x_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - x_l)^{k_l} (x^2 + p_1x + q_1)^{m_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_nx + q_n)^{m_n},$$

то существует единственное представление правильной дроби  $P(x)/Q(x)$  (если дробь неправильная, надо добавить частное от деления):

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{j=1}^l \left( \sum_{k=1}^{k_j} \frac{a_{jk}}{(x - x_j)^k} \right) + \sum_{j=1}^n \left( \sum_{k=1}^{m_j} \frac{b_{jk}x + c_{jk}}{(x^2 + p_jx + q_j)^k} \right)$$

Интегрировать слагаемые справа мы умеем: первые интегрируются сразу же, а трехчлены сводятся к рекуррентным выражениям через интегрирование по частям.

Само разложение можно искать методом неопределенных коэффициентов (ну или выверты вроде подсчета в конкретных точках).

**Метод Остроградского выделения рациональной части интеграла от правильной рациональной дроби.** Пусть  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  – правильная рациональная дробь;  $q(x)$  – многочлен, имеющий те же корни, что и  $Q(x)$ , но кратности 1,  $Q_1(x) = \frac{Q(x)}{q(x)}$ .

Тогда

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{p(x)}{q(x)} dx,$$

где все дроби – правильные рациональные.

*P.S.* Кстати, находить  $p(x)$  (и  $q(x)$ ) легко (но это вроде над  $\mathbb{C}$ , хотя и для многочленов над  $\mathbb{R}$  вроде в  $\mathbb{R}$  и останемся).

- Найдите  $\tilde{p}(x) = \gcd(P(x), P'(x))$ , например, алгоритмом Евклида.
- $p(x) = \frac{P(x)}{\tilde{p}(x)}$ .

**Интегралы  $\int R(\cos x, \sin x)dx$ , где  $R$  – рациональная функция.** В каком же вы отчаянии, раз дошли сюда. Делаем замену  $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ .

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$dt = \frac{dx}{2 \cos^2 \frac{x}{2}},$$

$$dx = \frac{2dt}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

То есть:

$$\int R(\cos x, \sin x)dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2}dt.$$

## Задачи

### INT-1

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2-3)}$$

**Решение:**

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2-3)} = \int \left( \frac{ax+b}{(x^2+1)} + \frac{cx+d}{(x^2-3)} \right) dx = \dots$$

$a=c=0$ ,  $b=-\frac{1}{4}$ ,  $d=\frac{1}{4}$ , см. про рациональные многочлены  $\frac{P}{Q}$ .

$$\dots = -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x^2+1)} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(3-x^2)} = (\text{табличные}) =$$

$$-\frac{1}{4} \operatorname{arctg} x + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}+x}{\sqrt{3}-x} \right| + C =$$

$$\frac{1}{8\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}-x}{\sqrt{3}+x} \right| - \frac{1}{4} \operatorname{arctg} x + C$$

**Ответ:**

$$\frac{1}{8\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}-x}{\sqrt{3}+x} \right| - \frac{1}{4} \operatorname{arctg} x + C$$

### INT-2

$$\int \frac{x-4}{\sqrt{x^2-2}} dx$$

**Решение.**

$$\int \frac{x-4}{\sqrt{x^2-2}} dx = \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-2}} - 4 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-2)}{\sqrt{x^2-2}} - 4 \ln |x + \sqrt{x^2-2}| =$$

$$\sqrt{x^2-2} - 4 \ln |x + \sqrt{x^2-2}| + C.$$

Здесь мы воспользовались табличным интегралом  
 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$ .  
**Ответ:**  $\sqrt{x^2-2} - 4 \ln |x + \sqrt{x^2-2}| + C$ .

## INT-3

$$\int \frac{dx}{x^4-1}$$

**Решение.**

$$\int \frac{dx}{x^4-1} = \int \frac{dx}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \int \left( \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \right) dx$$

Находим коэффициенты:

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = 0, \quad D = -\frac{1}{2}.$$

$$\int \frac{1}{x^4-1} = \int \left( \frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{2(x^2+1)} \right) dx =$$

$$\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$$

**Ответ:**  $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$ .

## INT-4

$$\int \frac{e^x + e^{2x}}{1 - e^x} dx$$

**Решение.**

$$\int \frac{e^x + e^{2x}}{1 - e^x} dx = \int \frac{e^x(1 + e^x)}{1 - e^x} dx \stackrel{y=e^x}{=} \int \frac{1+y}{1-y} dy =$$

$$= -\ln |1-y| - \int \frac{1-y-1}{1-y} dy = -\ln |1-y| - y - \ln |1-y| + C.$$

**Ответ:**  $-e^x - 2 \ln |e^x - 1| + C$

## INT-5

$$\int (5^x - 2^x)^2 dx$$

**Решение.**

$$(5^x - 2^x)^2 = 25^x - 2 \cdot 10^x + 4^x,$$

$$\int a^x dx = \int e^{x \ln a} dx = \frac{e^{x \ln a}}{\ln a} + C = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

**Ответ:**  $\frac{25^x}{\ln 25} - \frac{2 \cdot 10^x}{\ln 10} + \frac{4^x}{\ln 4} + C$

## INT-6

$$\int \frac{dx}{\cos x}.$$

**Решение.** Воспользуемся тем, что

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}' \frac{x}{2} &= \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}, \\ \cos x &= \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos x} &= 2 \int \frac{\frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = 2 \int \frac{d(\operatorname{tg} \frac{x}{2})}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \left[ \operatorname{tg} \frac{x}{2} = y \right] = 2 \int \frac{dy}{1 - y^2} = \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \ln \left| \frac{1+y}{1-y} \right| + C = \ln \left| \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

Можно еще вспомнить

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

Тогда

$$\frac{1 + \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2}} = \operatorname{tg} \left( \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right).$$

**Ответ:**  $\ln \left| \operatorname{tg} \left( \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C.$

**Решение покороче:**

$$\int \frac{dx}{\cos x} = (u = \sin x) = \int \frac{du}{1 - u^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right|$$

**Ответ:**  $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C.$  Он эквивалентный, если что.

## INT-7

$$\int x(x-2)^5 dx.$$

**Решение.**

$$\begin{aligned} \int x(x-2)^5 dx &= \int (x-2)^6 dx + 2 \int (x-2)^5 dx = [t = x-2] = \int t^6 dt + 2 \int t^5 dt = \\ &= \frac{t^7}{7} + 2 \frac{t^6}{6} + C = [t = x-2] = \frac{(x-2)^7}{7} + \frac{(x-2)^6}{3} + C. \end{aligned}$$

**Ответ:**  $\frac{(x-2)^7}{7} + \frac{(x-2)^6}{3} + C.$

## INT-8

$$\int x\sqrt{1-2x} dx.$$

**Решение.**

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{1-2x} dx &= \frac{1}{2} \int (2x-1)\sqrt{1-2x} dx + \frac{1}{2} \int \sqrt{1-2x} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \int (1-2x)^{\frac{3}{2}} dx + \frac{1}{2} \int \sqrt{1-2x} dx = \left[ \begin{array}{l} y = -2x, \\ dx = -\frac{dy}{2} \end{array} \right] = \frac{1}{4} \int (1+y)^{\frac{3}{2}} dy - \frac{1}{4} \int \sqrt{1+y} dy = \\ &= \frac{1}{4} \frac{(1+y)^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{1}{4} \frac{(1+y)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = [y = -2x] = \frac{(1-2x)^{\frac{5}{2}}}{10} - \frac{(1-2x)^{\frac{3}{2}}}{6} + C. \end{aligned}$$

**Ответ:**  $\frac{(1-2x)^{\frac{5}{2}}}{10} - \frac{(1-2x)^{\frac{3}{2}}}{6} + C.$

## INT-9

$$\int \frac{2x-7}{\sqrt{3x+1}} dx$$

**Решение.**

Заметим, что  $(\sqrt{3x+1})' = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$ , то есть  $\frac{1}{\sqrt{3x+1}} = \frac{2}{3} d(\sqrt{3x+1})$ . Значит,

$$\int \frac{2x-7}{\sqrt{3x+1}} dx = \frac{2}{3} \int (2x-7) d(\sqrt{3x+1}) = \frac{2}{3} \int \left( \frac{2}{3} t^2 - \frac{23}{3} \right) dt = \frac{4}{27} t^3 - \frac{46}{9} t + C =$$

$$= \left( \frac{4}{27} (3x+1) - \frac{46}{9} \right) \sqrt{3x+1} + C = \left( \frac{4}{9} x - \frac{134}{27} \right) \sqrt{3x+1} + C.$$

**Ответ:**  $\left( \frac{4}{9} x - \frac{134}{27} \right) \sqrt{3x+1} + C$

## INT-10

$$\int \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}} dx$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}} dx &= \int \left( \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) dx = \\ &= \arcsin x + \ln \left| x + \sqrt{x^2+1} \right| + C \end{aligned}$$

**Ответ:**  $\arcsin x + \ln \left| x + \sqrt{x^2+1} \right| + C$

## INT-11

$$\int \frac{d x}{x(\ln^2 x + 2)}$$

**Решение.**

$$\int \frac{d x}{x(\ln^2 x + 2)} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left( \frac{\ln x}{\sqrt{2}} \right) + C.$$

Здесь мы использовали табличный интеграл  $\int \frac{d t}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \left( \frac{x}{a} \right) + C$ .

**Ответ:**  $\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left( \frac{\ln x}{\sqrt{2}} \right) + C$ .

## INT-12

$$\int \ln^2 x dx.$$

**Решение.**

Интегрируем по частям

$$\begin{aligned} \int \ln^2 x dx &= \left[ \begin{array}{l} u = \ln^2 x \\ dv = dx \end{array} \right] = x \ln^2 x - \int x \frac{2 \ln x}{x} dx = x \ln^2 x - 2 \int \ln x dx = \\ \left[ \begin{array}{l} u = \ln x \\ dv = dx \end{array} \right] &= x \ln^2 x - 2 \left( x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx \right) = \\ x \ln^2 x - 2 \left( x \ln x - \int dx \right) &= x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C. \end{aligned}$$

**Ответ:**  $x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x + C$ .

### INT-13

$$\int \frac{dx}{1 + \cos x}.$$

**Решение.**

Воспользуемся тем, что

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}' \frac{x}{2} &= \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}, \\ \cos x &= 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1.\end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{1 + \cos x} = \int \frac{dx}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = \operatorname{tg} \frac{x}{2} + C.$$

**Ответ:**  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} + C$ .

### INT-14

$$\int \operatorname{tg}^2 x dx$$

**Решение.**

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^2 x dx &= \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int 1 dx = \operatorname{tg} x - x + C.\end{aligned}$$

**Ответ:**  $\operatorname{tg} x - x + C$ .

### INT-15

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x (1 + \operatorname{tg} x)}.$$

**Решение.** Воспользуемся тем, что

$$\operatorname{ctg}' x = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sin^2 x (1 + \operatorname{tg} x)} &= - \int \frac{d \operatorname{ctg} x}{1 + \frac{1}{\operatorname{ctg} x}} = [y = \operatorname{ctg} x] = - \int \frac{dy}{1 + \frac{1}{y}} = - \int \frac{y dy}{y + 1} = \\ &= - \left( \int dy - \int \frac{dy}{1 + y} \right) = -y + \ln |1 + y| + C = \\ [y = \operatorname{ctg} x] &= -\operatorname{ctg} x + \ln |1 + \operatorname{ctg} x| + C.\end{aligned}$$

**Ответ:**  $-\operatorname{ctg} x + \ln |1 + \operatorname{ctg} x| + C$ .



## INT-16

$$\int \frac{x^2}{1-x^2} dx.$$

**Решение.**

$$\int \frac{x^2}{1-x^2} dx = \int \frac{x^2-1+1}{1-x^2} dx = - \int dx + \int \frac{dx}{1-x^2} = -x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C.$$

**Ответ:**  $-x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C.$

## INT-17

$$\int x \sin x dx.$$

**Решение** Интегрируем по частям:  $dv = \sin x dx$ .

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

**Ответ:**  $-x \cos x + \sin x + C.$

## INT-18

$$\int \sqrt{2-x^2} dx$$

**Решение (I способ)**

Произведем замену  $x = \sqrt{2} \sin(t)$

Тогда  $dx = \sqrt{2} \cos(t) dt$

Интеграл после замены примет вид

$$\begin{aligned}\int 2 \sin(t) \cos(t) dt &= \int 2 \cos^2(t) dt = \int (\cos(2t) + 1) dt = \frac{1}{2} \sin(2t) + t + C = \\ &= \sin(t) \cos(t) + t + C = \frac{x\sqrt{2-x^2}}{2} + \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C.\end{aligned}$$

**Решение (II способ)** интегрируем по частям

$$\begin{aligned}\int \sqrt{2-x^2} dx &= x\sqrt{2-x^2} - \int x d(\sqrt{2-x^2}) = x\sqrt{2-x^2} + \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{2-x^2}} = \\ [\text{выделяем целую часть у дроби}] &= x\sqrt{2-x^2} - \int \frac{2-x^2}{\sqrt{2-x^2}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = \\ x\sqrt{2-x^2} - \int \sqrt{2-x^2} dx &+ 2 \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C.\end{aligned}$$

Переносим красные интегралы в левую часть равенства и делим всё на 2:

$$\int \sqrt{2-x^2} dx = \frac{x\sqrt{2-x^2}}{2} + \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$$

**Ответ:**  $\frac{x\sqrt{2-x^2}}{2} + \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$ .

## INT-19

$$\int x \cot^2 x dx$$

**Решение** Поскольку  $\cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1$ , имеем:

$$\int x \cot^2 x dx = \int \left( \frac{x}{\sin^2 x} - x \right) dx = \int \frac{x}{\sin^2 x} dx - \frac{x^2}{2}.$$

Посчитаем оставшийся интеграл по частям. Пусть  $u = x$ ,  $dv = \frac{dx}{\sin^2 x}$ . Тогда  $du = dx$  и  $v = -\cot x$ . Получим:

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sin^2 x} dx &= -x \cot x + \int \cot x dx = -x \cot x + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \\ &= -x \cot x + \int \frac{1}{\sin x} d(\sin x) = -x \cot x + \ln |\sin x|.\end{aligned}$$

**Ответ:**  $-x \cot x + \ln |\sin x| - \frac{x^2}{2} + C$ .

## INT-20

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx$$

**Решение** Интегрируем по частям

$$\begin{aligned} \int \operatorname{arctg} x \, dx &= x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x dx}{1+x^2} = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{1+x^2} = \\ &= x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C \end{aligned}$$

**Ответ:**  $x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$