
GRAY-SCOTT

100.0/100

Gray–Scott 斑点

最经典的 Gray–Scott 斑点。同一配方、同一校准种子，应该稳定长出分离斑点。



目标 · 文献 · 斑点（校准）
480 步 · fixed:calibration-seed

读法 目标与复现的密度、各向异性、相关长度、斑块数与边界密度逐项对齐；分数来自这五项的距离。

f	0.035	k	0.062
D_u	0.16	D_v	0.08
dt	1	steps	480

行为指纹 · 斑点

密度 *红* / 各向异性 *绿*



稳定步数	480	活跃度	0.0500
翻转率	0.0549	增长 / 1000 步	0.16

复现 服务端按模型卡固定参数与种子重跑 480 步；行为指纹取自 12 个采样点。

结构签名 · 目标 / 复现

密度 ρ	各向异性 A	相关长度 L_c	斑块数 N	边界密度 P
15.1% / 15.1%	0.03 / 0.03	10 / 10	4 / 4	0.07 / 0.07

✓ 模式 spots　✓ 密度 15.1%　✓ 各向异性上限 3.1%　✓ 稳定步数 480　✓ 分数 100.0

来源 Pearson 1993, Science 261:189–192 · Gray–Scott 参数区
许可 公开文献参数 · 用于校准
不变量 constant-field-laplacian=0 · pure-diffusion-conservation · deterministic-seed

```
curl -sS -X POST https://37jalf2ykndtrfn6iou.traesite.cn/api/research/replicate -H 'content-type: application/json' -d '{"modelId":"model-gs-spots"}'
```