
LENGYEL-EPSTEIN

38.7 /100

Lengyel–Epstein 条纹

CIMA 同族的 Lengyel–Epstein 模型，用固定噪声种子长条纹。




目标 · CIMA · 条纹
12000 步 · fixed:le-noise

读法 目标与复现的密度、各向异性、相关长度、斑块数与边界密度逐项对齐；分数来自这五项的距离。

D_v	80	a	8
b	6	σ	0.6
dt	0.001	steps	12000

行为指纹 · 条纹

密度 *红* / 各向异性 *绿*



稳定步数	12000	活跃度	0.0038
翻转率	0.0058	增长 / 1000 步	-0.03

复现 服务端按模型卡固定参数与种子重跑 12000 步；行为指纹取自 12 个采样点。

结构签名 · 目标 / 复现

密度 ρ	各向异性 A	相关长度 L_c	斑块数 N	边界密度 P
38.8% / 48.2%	0.70 / 0.31	18 / 22	7 / 7	0.22 / 0.13

✓ 模式 stripes　✓ 密度 48.2%　✓ 各向异性下限 30.5%　✓ 稳定步数 12000　✓ 分数 38.7

来源 Kazarnikov et al. 2025, arXiv:2504.02530, Fig. 6 [l] · CC BY 4.0
许可 CC BY 4.0 · 目标图像
不变量 constant-field-laplacian=0 · pure-diffusion-conservation · deterministic-noise-seed

```
curl -sS -X POST https://37jalf2ykndtrfn6iou.traesite.cn/api/research/replicate -H 'content-type: application/json' -d '{"modelId":"model-le-stripes"}'
```