

Katangian at Benepisyo:

- ✓ Matatag laban sa Bacterial Leaf Blight
- ✓ Matibay laban sa Lodging
- ✓ Early maturing
- ✓ High yielding
- ✓ Long grain
- ✓ Superior milling recovery
- ✓ Masarap ang kanin

Average Yield /ha	170–190 cavans
Base sa aktwal na ani ng 2023	220 cavans pataas
Maturity	110 DAS
Plant Height	112 cm
Milling recovery	75%



LEADS AGRIVENTURES CORPORATION
KM 70 National Highway, Brgy. Bangyas,
Calauan, Laguna
Customer Service Support: +63 945 170 9401
leadsagriventurescorporation@gmail.com

LAV 777
NSIC Rc 656h

GABAY SA PAGTATANIM

LEADS AGRIVENTURES
LAV 777
NSIC 2021 Rc 656H
HYBRID RICE SEEDS
NET WT. 3KG

SAPAT NA ALAGA, 200 KABAN KADA EKTARYA ANG BIYAYA!

Timing ng Pag-aabono	Uri ng abono	Dami
Basal	14-14-14 (Complete)	15kg
7 araw matapos ipunla	46-0-0 (Urea)	3kg
14 araw matapos ipunla	46-0-0 (Urea)	3 kg

Rekomendasyon ng Abono sa PALAYAN*

Timing ng Pag-abono	Uri ng Abono	Dami tuwing tag-araw	Dami tuwing Tag-ulan
4 - 6 araw matapos maglipat-tanim	14-14-14 (Complete) 46-0-0 (Urea)	3 sako 2 sako	3 sako 1 sako
14 -16 araw matapos maglipat-tanim	14-14-14 (Complete) 46-0-0 (Urea)	2 sako 2 sako	2 sako 0.5 sako
35 - 40 araw matapos maglipat-tanim	46-0-0 (Urea) 0-0-60 (Muriate of Potash)		0.5 sako 1 sako
40 - 45 araw matapos maglipat-tanim	46-0-0 (Urea) 0-0-60 (Muriate of Potash)	1 sako 1 sako	
	Kabuuang Dami	11 sako	8 sako

Para sa aplikasyon sa taniman, siguraduhing suriin muna ang lupa para sa wastong sukat o dami ng rekomendadong fertilizer. Sakaling hindi masusuri ang palayan, gumamit lamang ng mas mababang sukat o dami ng rekomendadong fertilizer.

PAANO ITANIM

- Paghahanda ng binhi
 - Ibabad ang binhi ng 18-24 oras. Sa huling 6 na oras napagbabad ng binhi, mag-lagay ng 50ml ng iSmart Ceres kada 30L ng tubig kada pakete, o 250ml ng iSmart Ceres para sa 1 drum ng tubig. TANDAAN: Ang mga binhing lumutang ay tutubo pa rin.
 - Ikulob ang binhi ng 24-36 oras
- Maglipat-tanim makalipas ang 18-21 na araw pagkatapos magpunla
Rekomendadong distansya sa pagtatanim:
 - Tag-ulan: 20 cm x 20 cm
 - Tag-araw: 15 cm x 20 cm
- Sundin ang karaniwang ginagawa sa pagpapatubig
- Sa pagsugpo ng peste at sakit, sundin ang Leads Agri Rice Management Solutions Package of Technology
- Maaani na ang LAV 777 Hybrid Rice 100-112 na araw mula sa pagpupunla, o kapag ang mga butil ay 90-95% golden yellow na ang kulay.