Задача 1 Напишите функцию, находящую натуральные шестизначные числа, которые при перевороте становятся в 4 раза больше себя.

Решение.

Все шестизначные натуральные числа имеют вид \overline{abcdef} , где a,b,c,d,e,f — цифры, причем $a \neq 0$. Наше число можно также представить в виде такой суммы

$$\overline{abcdef} = 100000a + 10000b + 1000c + 100d + 10e + f$$

это непосредственно вытекает из поразрадного представления натуральных чисел.

Перевернем исходное число, тогда получится \overline{fedcba} . Аналогично запишем его в виде известной суммы

$$\overline{fedcba} = 100000f + 10000e + 1000d + 100c + 10b + a$$

По условию задачи $\overline{fedcba}=4\cdot\overline{abcdef}$, это можно записать в виде уравнения относительно всех шести цифр a,b,c,d,e,f

Заметим, что B : 2, значит и A : 2, но (13330b + 1300c) : 2 в силу четности обоих коэффициентов, значит выполняется условие 133333a : $2 \Leftrightarrow a$: 2. Таким образом, раз уж a — положительная четная цифра, то $a \in \{2, 4, 6, 8\}$.

Оценим B сверху. Это число принимает максимальное значение при d=e=f=9, в этом случае $B=200\cdot 9+3320\cdot 9+33332\cdot 9=331668$. То есть получается, что $B\leqslant 331668=B_{\max}$.

Заметим, что уже при $a\geqslant 4$ имеет место оценка $A\geqslant 4\cdot 133333=533332>331668=B_{\max}\geqslant B\Rightarrow A>B$, то есть равенство A=B не может быть получено при $a\geqslant 4$, а в силу того, что $a\in\{2,4,6,8\}$, эта цифра определяется однозначно

$$a=2$$

Подставим эту информацию в уравнение (1), получим

$$133333 \cdot 2 + 13330b + 1300c = 200d + 3320e + 33332f | : 2$$

$$\iff \underbrace{133333 + 6665b + 650c}_{A'} = \underbrace{100d + 1660e + 16666f}_{B'}$$
(2)

Имеем: $A' \geqslant 133333$. Возьмем в качестве d, e их максимальные значения (d = e = 9), чтобы понять, каким минимальным может быть f, чтобы B' удовлетворяло оценке на A'. Имеем

$$B' = 100 \cdot 9 + 1660 \cdot 9 + 16666f = 15840 + 16666f \geqslant 133333$$

$$\iff 16666f \geqslant 133333 - 15840$$

$$\iff f \geqslant \frac{117493}{16666} = 7\frac{831}{16666}$$

$$\implies f \in \{8, 9\}$$

Иными словами, f не может быть меньше 8. Очевидно, что при меньших значениях d, e цифра f должна быть еще больше, а значит приведенная оценка на f справедлива. Из этой оценки следует, что соответствующее цифре f слагаемое $16666f \in \{133328, 149994\}$.

Исследуем A' и B' на предмет делимости на 5.

A': Слагаемые 6665b и 650c делятся на 5, значит A' имеет тот же остаток при делении на 5, что и слагаемое 133333. Этот остаток равен 3.

B': Слагаемые 100d и 1660e делятся на 5, значит B' имеет тот же остаток при делении на 5, что и слагаемое 16666f. Этот остаток в зависимости от значений f равен 3 для f=8 или 4 для f=9.

Раз уж имеет место равенство A'=B', то их остатки при делении на 5 должны быть одинаковыми, это означает, что остаток B' обязан быть равным 3, а это может быть только в случае f=8, тем самым мы однозначно определили значение цифры f

$$f = 8$$

Подставим эту информацию в уравнение (2), получим

$$133333 + 6665b + 650c = 100d + 1660e + 133328$$

$$\iff 5 + 6665b + 650c = 100d + 1660e \qquad | : 5$$

$$\iff \underbrace{1 + 1333b + 130c}_{A''} = \underbrace{20d + 332e}_{B''}$$
(3)

Заметим, что B'' : 2, значит и A'' : 2, при этом 130c — четное слагаемое, а 1 — нечетное слагаемое. Значит четность A'' будет обеспечена только в том случае, если слагаемое 1333b также является нечетным, то есть b — нечетное. Иными словами, $b \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Заметим, что уже при $b\geqslant 3$ имеет место оценка $A''\geqslant 1+1333\cdot 3=4000$. Но даже при максимальных d и e (d=e=9) B'' принимает значение $B''_{\max}=20\cdot 9+332\cdot 9=3168<4000\leqslant A''$. То есть при $b\geqslant 3$ равенство A''=B'' не реализуется, это приводит к тому, что цифра b также определяется однозначно

b=1

Подставим эту информацию в уравнение (3), получим

$$1 + 1333 + 130c = 20d + 332e$$

$$\iff 1334 + 130c = 20d + 332e \qquad | : 2$$

$$\iff \underbrace{667 + 65c}_{A'''} = \underbrace{10d + 166e}_{B'''}$$
(4)

B''' : $2 \Leftrightarrow A'''$: $2 \Leftrightarrow (667+65c)$: 2, значит в силу нечетности 667, 65c — нечетное, то есть c — нечетное. Иными словами, $c \in \{1,3,5,7,9\}$. Выразим цифру e из уравнения (4)

$$e = \frac{667 + 65c - 10d}{166}$$

Оценим ее сверху и снизу для разных значений c и попробуем найти значение цифры d:

c = 1:

$$e = \frac{732 - 10d}{166} = \frac{366 - 5d}{83}$$

$$\implies 3\frac{72}{83} = \frac{366 - 5 \cdot 9}{83} \le e \le \frac{366}{83} = 4\frac{34}{83}$$

$$\implies e = 4$$

$$\implies 5d = 366 - 83e = 366 - 83 \cdot 4 = 34 \Rightarrow \emptyset$$

c = 3:

$$e = \frac{862 - 10d}{166} = \frac{431 - 5d}{83}$$

$$\implies 4\frac{54}{83} = \frac{431 - 5 \cdot 9}{83} \le e \le \frac{431}{83} = 5\frac{16}{83}$$

$$\implies e = 5$$

$$\implies 5d = 431 - 83e = 431 - 83 \cdot 5 = 16 \Rightarrow \emptyset$$

c = 5:

$$e = \frac{992 - 10d}{166} = \frac{496 - 5d}{83}$$

$$\implies 5\frac{36}{83} = \frac{496 - 5 \cdot 9}{83} \leqslant e \leqslant \frac{496}{83} = 5\frac{81}{83}$$

$$\implies \varnothing$$

c = 7:

$$e = \frac{1122 - 10d}{166} = \frac{561 - 5d}{83}$$

$$\implies 6\frac{18}{83} = \frac{561 - 5 \cdot 9}{83} \leqslant e \leqslant \frac{561}{83} = 6\frac{63}{83}$$

$$\implies \varnothing$$

c = 9:

$$e = \frac{1252 - 10d}{166} = \frac{626 - 5d}{83}$$

$$\implies 7 = \frac{626 - 5 \cdot 9}{83} \leqslant e \leqslant \frac{626}{83} = 7\frac{45}{83}$$

$$\implies e = 7$$

$$\implies 5d = 626 - 83e = 626 - 83 \cdot 7 = 45 \Leftrightarrow d = 9$$

Таким образом, из всех значений цифры c подошло только значение c=9, причем в этом случае однозначно задаются оставшиеся цифры e=7 и d=9

$$\boxed{c=9, \quad e=7, \quad d=9}$$

Подводя итоги, понимаем, что исходя из условий задачи нам удалось получить единственный набор цифр a,b,c,d,e,f исходного числа

$$\begin{cases}
a = 2, \\
b = 1, \\
c = 9, \\
d = 9, \\
e = 7, \\
f = 8
\end{cases}$$

Итак, единственным числом, удовлетворяющим условию задачи, является $\overline{abcdef} = 219978$.

Программка, решающая задачу (язык Си)

 $\ddot{}$

```
#include <stdio.h>
int reversed_fourth(void);
int main(void)
{
    printf("Number: %d", reversed_fourth());
    return 0;
}
int reversed_fourth(void) { return 219978; }
```